

ہومیوپیتھک لکچرین و تجربیہ

یعنے  
چالیس ادویات کامل

جس میں عام متعل چالیس ادویات کے خواص و افعال کی عمومیات  
و خصوصیات ظاہری و باطنی کیفیات و تاثرات کا مختصر مگر مکمل مفید موز  
اور سلیس و جامع اور بیان درج ہے

۲۲ ہتیشی

یہ کتاب ہومیوپیتھک لچر ہسپتال - ۹ مال روڈ لاہور کے نصاب تعلیم میں شامل ہے

تقدرا ایک ہزار

قیمت دو روپے (دو)

طبع سوم

نوٹ :- قیمت جو اندر درج ہے وہ صرف ایک حصہ کی ہے



# فہرست مضامین

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱	علامات	۲۲	۵	۳۵	۴۶
۲	چند ضروری ہدایات	۲۳	۵	۳۶	۴۹
۳	ادویات	۲۴	۶	۳۷	۵۱
۴	برودت و شتاد و مرض بوجہ حرکت	۲۵	۷	۳۸	۵۲
۵	حرارت و شتاد و مرض بوجہ حرکت	۲۶	۸	۳۹	۵۳
۶	بے چینی و اضطراب	۲۷	۹	۴۰	۵۴
۷	غصہ و ری	۲۸	۱۰	۴۱	۵۵
۸	خوف	۲۹	۱۱	۴۲	۵۶
۹	ریشک آلودگی	۳۰	۱۲	۴۳	۵۷
۱۰	اشتداد مرض بوجہ سکون	۳۱	۱۳	۴۴	۵۸
۱۱	اشتداد مرض بوجہ حرکت	۳۲	۱۴	۴۵	۵۹
۱۲	صعود مرض بعد از دوپہر	۳۳	۱۵	۴۶	۶۰
۱۳	صعود مرض بعد از نیم شب	۳۴	۱۶	۴۷	۶۱
۱۴	صعود مرض بعد از خواب	۳۵	۱۷	۴۸	۶۲
۱۵	صعود مرض بوجہ دباؤ	۳۶	۱۸	۴۹	۶۳
۱۶	انقطاع مرض بوجہ دباؤ	۳۷	۱۹	۵۰	۶۴
۱۷	تشنگی	۳۸	۲۰	۵۱	۶۵
۱۸	خوارک بعد از خوراک شتاد و مرض	۳۹	۲۱	۵۲	۶۶
۱۹	جلن والے درد	۴۰	۲۲	۵۳	۶۷
۲۰	چیرتا ہوا درد	۴۱	۲۳	۵۴	۶۸
۲۱	درد جن میں مقام درد و ہونٹ	۴۲	۲۴	۵۵	۶۹
۲۲	ہوا یا دھن والا معلوم ہو	۴۳	۲۵	۵۶	۷۰
۲۳	پتکن والے درد	۴۴	۲۶	۵۷	۷۱



DR. K. C. HITESHI,  
The Pioneer of Homoeopathy  
in Punjab.



ڈاکٹر کرم چند صاحب ہتیشی ایم ڈی (ہومیو) ایل ایم ای ایچ ڈنسٹن، لاہور

Printed at the Arorbans Press, Anarkali, Lahore.







## دیباچہ طبع دوم

ثنا لعین طب ہومیو پتھی نے عموماً اور طبابت پیشہ اصحاب نے خصوصاً جس فراخ دلی سے ہماری اس تصنیف موسومہ ہومیو پتھک تشخیص و تجویز دوا کی طبع اول کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے۔ کہ ہم اس مختصر مگر نہایت مفید کتاب کی طبع ثانی پیش کریں۔ یہ تصنیف بذاتہ اس قدر مکمل ہے کہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ لہذا یہ طبع ثانی کسی ترمیم و تمشیح اضافہ و اختصار کی محتاج نہیں اور نہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی ضرورت ہے۔ طب ہومیو پتھی میں علم الادویہ اس قدر وسیع مگر مکمل۔ ذوق مگر صحیح پیچیدہ مگر صادق ہے۔ کہ اس کے مطالعہ کے لئے ایک زندگی درکار ہے۔ مگر اس کتاب میں دریا کو کوزہ میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور ریپرٹری انیلیسٹر "یعنی مجموعی تشخیص دوا بذریعہ ہر جداگانہ علامت ایسے مشکل ترین عمل کو اس کتاب میں تبدیل کے لئے سہل ترین اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ امتیاز الادویات اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے جس کے بغیر طب ہومیو پتھی میں تشخیص و تجویز و امثل ہی نہیں بلکہ ایک نامکن امر ہے۔ حقیقت یہ کتاب اسم باسم ہے۔ جس میں پالیس ضروری عام متعل ادویات کا حل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ مطالعہ ہر ایک طالب العلم ہومیو پتھی کیلئے نہایت ضروری ہے۔

تنبیہ

"ماہنامہ ہوم"

۹ پال روڈ۔ لاہور۔ مورخہ ۱۱ ماہ جولائی ۱۹۲۹ء

## دیباچہ طبع سوم

یہ امر میرے لئے موجب مسرت ہے کہ مجھے اس مختصر مگر نہایت مفید تصنیف کی طبع سوم کو شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ طبابت پیشہ اصحاب نے عموماً اور ہومیو پتھک پریکٹیشنروں نے خصوصاً جس ہلکری سے اس کتاب کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ شاید ہی کسی دوسری کتاب کو نصیب ہوا ہوگا۔ درحقیقت یہ کتاب ہے بھی اس قدر مفید کہ اس کے بغیر تشخیص و تجویز واکرنا ہی مشکل ہے۔ لہذا ہر ایک طبیب کی میز پر اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔



اتفاق کی بات دیکھئے۔ کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن عرصہ پندرہ سال کا گزرا۔ جبکہ شائع ہوا تھا۔ اس وقت  
یہ کتاب کیا بلحاظ نام نفیس مضمون۔ اور کیا بلحاظ تقطیع و حجم علامہ مخدوم شہر امرکین موجودہ سن ۱۹۳۳ء  
سی۔ ایم۔ بکر ایم۔ ڈی۔ کی اس معرکہ انار تہذیب سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ جبکہ نام جنرل لے نے سر  
GENERAL ANALYSIS ہے۔ جگا چو تھا ایڈیشن حال میں ہی شائع ہوا ہے۔ اور یہ کتاب  
ڈاکٹر بلاگر کے حیرت انگیز ریپریٹری کارڈوں کے ساتھ آتی ہے جن کی قیمت تقریباً ایک سو پچیس روپیہ ہے  
ان کارڈوں کی مدد سے شخص سے شکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ امراض مزمنہ و قابل عمل جہاں میں تحقیق  
تجزیہ و تالیفی اور خود بخود ہو جاتی ہے اور ہر مرض کا ہومیوپیتھک علاج نہایت کامیابی سے کیا جاسکتا  
ہے۔

کتاب ہذا کو زیادہ مکمل بنانے کے لئے ادویات کے ضروری خواص و افعال۔ مدت اثر۔ ممد و  
معاون ادویات فادر ہر اور متعل طاقت وغیرہ نہایت اہم اور ضروری مضامین کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو  
انتخاب دوا میں ہر مبتدی و طبیب کو خاص مدد دے گا۔  
امید ذاتی ہے کہ اس کتاب کی طبع سوئم کا عوام الناس کی طرف سے عموماً اور طبابت پیشہ اصحاب  
کی طرف سے خصوصاً اسی تپاک سے خیر مقدم کیا جادیکجا جس کی کہ یہ مستحق ہے۔ جو مصنف و پبلشر ہر دو  
کی مزید جو صلہ افزائی کا باعث ہوگا۔

متنشی

”ہامن ہوم“  
۹ ہال روڈ۔ لاہور۔ مورخہ یکم جنوری ۱۹۳۳ء

۱۔ یہ عجیب و غریب ریپریٹری کارڈ متنشی ہومیوپیتھک ہال۔ ہال روڈ لاہور سے مل سکتے ہیں



# ہومیوپیتھک تشخیص و تجویز دوا

یعنی

## چالیس ضروری ادویات کا حل

ہومیوپیتھک مخزن الادویہ میں علامات ادویہ کا علم اور انہیں استعمال میں لانے کا فن جو دیکھنا گناہ محبتیں ہیں۔ مثلاً ہمارے ذہن میں ایک دوائی کی جملہ علامات موجود ہوں لیکن یہ قابلیت نہ ہو کہ کس طرح ان میں امتیاز کر کے جائزہ لیں اور پرہیز کئے۔ انکا انتخاب کیا جائے یہ غرق صرف علم اور عمل کا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرض بحیثیت مجموعی براہوتیا۔ رٹاکس۔ آرنیکا اور یوٹیریم سے متناہ ہے۔ لیکن وہ مخصوص علامات جو اسے آرنیکا کے سوا اور کسی دوائی کا مرض نہیں بتاتے آپ پر ظاہر نہ ہوں یا آپ میں اس قدر علم موجود ہو کہ آپ صرف آرنیکا کو ہی انتخاب کر کے مرض کے مرض کو رفع کریں۔ یہی دیر سے کمال لوگ بوجہ ناقابلیت ہومیوپیتھک ادویات مختلفہ کیلئے دیکھ رہے دیتے ہیں یا دوائیں مرکب حالت میں پہنچاتی ہیں۔

اگرچہ چالیس مشہور ادویہ آپ کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کی علامات یا سلیقہ ذہن نشین کر سکیں اور ہر مرض میں مناسب دوائی کا ایلا تخلیف انتخاب کر سکیں یہ ادویات ہماری تعلیم ضروریات کیلئے نہ ہی کافی ہیں اور نہ ہی مخزن الادویہ کی وسعت پر حاوی۔ اس مختصر فہرست ادویہ میں چند ایسی بھی ہیں۔ جو کہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں اور کثیر الاستعمال ہیں یہ فہرست اس غرض سے یہاں درج کی جاتی ہے تاکہ چند لمحوں کے اندر اس کا مطالعہ کر کے بعد تحقیق ہی سے دوا میں آپ کو ترتیب علامات اور انتخاب دوائی میں کافی مہارت پیدا ہو جائے اور انہیں امور لوں کی پابندی سے آپ بھی ایک ایسا نقشہ تیار کر سکیں جو روزمرہ مستقل ادویات کی کلید ہو۔



## علامات

جملہ علامات تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں (۱) علامات اکثریہ (۲) علامات مخصوصہ (۳) علامات عمومیہ۔ اول الذکر اپنی اہمیت میں سب سے افضل ہیں اور تا وقتیکہ منتخب شدہ دوائی میں یہ علامات موجود نہ ہوں وہ ہرگز علاج بالمثل کے مطابق مجوزہ قرار نہیں دی جاسکتی۔

علامات اکثریہ سے ہماری مراد وہ علامات ہیں جو کہ مریض کے نفس سے متعلق ہوں اور وہ خود ان کی بیان کرے مثلاً میری پیاس اس طرح ہے۔ گرمی یوں محسوس ہوتی ہے۔ یا سردی کی یہ کیفیت ہے تمام خواہشات و کمزوریاں اور وہ علامات جو حیض وغیرہ کے متعلق ہیں۔ علامات اکثریہ کے زمرہ میں داخل ہیں۔ علامات اکثریہ علامات مخصوصہ سے مشتق ہو سکتی ہیں۔

ان کے بعد علامات مخصوصہ کا درجہ ہے اور اگر منتخب شدہ دوائی میں علامات اکثریہ و مخصوصہ موجود ہوں۔ تو علاج بالمثل کے قانون کے مطابق وہ دوائی مریض کے بالکل موافق ٹھہرے گی۔ اگرچہ علامات عمومیہ تمام تر اس میں موجود نہ ہوں علامات مخصوصہ میں وہ علامات شامل ہیں جو کسی عضو کے متعلق ہوں اور چھکاوچھکاو یا جے جم میں مقامی طور پر ہو۔ مثلاً درد سر۔ درد معدہ۔ وہ علامات جو بیان نہیں کی جاسکتیں علامات عمومیہ سے موسوم ہوتی ہیں۔ دوائی کے انتخاب میں علامات عمومیہ چنداں قابل توجہ نہیں کیونکہ یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جو عام طور پر ہر ایک دوائی اور مرض میں یکساں طور پر پائیدار ہوتی ہیں۔

## چند ضروری ہدایات

ناظرین اور طلباء کی سہولت کیلئے اس جگہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا علامات کو حفظ کرنے اور ان سے مستفید ہونے کے لئے چند ہدایات درج کر دی جائیں تاکہ انتخاب دوائی اور باقاعدہ علاج میں ان سے کافی مدد حاصل ہو سکے۔

سب سے مقدم اور ضروری بات یہ ہے کہ ادویات جو آئندہ صفحات میں مختلف عنوانوں کے تحت لکھی جائیں گی۔ حفظ کر لینی چاہئیں۔ جس وقت یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر ان ادویات کے جداگانہ علامات بھی یاد کر لئے جائیں تاکہ ادویات مختلفہ میں تیز ہو سکے۔ اس تھوڑی سی محنت کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ روزانہ ہستمال اور عوامی امراض کیلئے دوائی کا تجویز کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد ادویات کی نسبت علم کو وسیع کرنے کے لئے مخزن الادویات کے مطالعہ کی ضرورت ہوگی اور اگر ہر روز تھوڑا سا



وقت اس کے مطالعہ میں صرف کر دیا جائے۔ تو اندک مدت میں کافی علم الادویہ حاصل ہو جائیگا۔  
باقی کی ادویات کو یاد کرنے کے لئے بھی یہی تدبیر کو عمل میں لانا چاہئے۔ کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی  
طریقہ ادویات کو حفظ کرنے کا نہیں ہے۔

چنانچہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر کتاب ہذا میں چالیس ادویات کے متعلق ایک مختصر مگر نہایت مفید  
بیان درج ہے۔ جس سے طبابت پر مشتمل اصحاب بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد  
ان کیلئے لازمی ہے کہ وہ مفصل مخزن الادویہ کا مطالعہ کریں۔

## ادویات

۱۰ دوائیں جن کا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مفصلہ ذیل ہیں :-

۱۰ ایکونٹائٹ	۱۱ بلاڈونا	۱۲ کالوسنتھ	۱۳ مایوسیس	۱۴ ٹائٹریک ایسڈ	۱۵ سلفر
۱۶ آرٹھیکا	۱۷ بریوٹینا	۱۸ ڈیجیٹلیس	۱۹ انڈیشیا	۲۰ نکسوسامیکا	۲۱ سیپیا
۲۲ آرٹھیکیم	۲۳ کلیریا کارب	۲۴ ڈروسرا	۲۵ آپریکا کوہنا	۲۶ فاسفورس	۲۷ سلینیا
۲۸ ایپس	۲۹ کارپوویکی	۳۰ ڈکنمارا	۳۱ ٹیکینیس	۳۲ فاسفورک ایسڈ	۳۳ تھوجا
۳۴ انٹیم کروٹ	۳۵ کاسٹیکم	۳۶ جلیبیم	۳۷ لائکو پوٹم	۳۸ پوڈوفالیم	۳۹ وریٹرم الیم
۴۰ انٹیم ٹارٹ	۴۱ چائٹا	۴۲ گریفٹارٹس	۴۳ مرکوریس	۴۴ ملٹیلٹا	۴۵ زنکم
۴۶ کیموملا	۴۷ ہیمپریلف	۴۸ نیٹرم میور	۴۹ رس ٹالس		

A-6  
B-2  
C-6  
D-3  
G-2  
H-2  
J-2  
L-2  
M-1  
N-3  
P-4  
R-1  
S-3  
T-1  
V-1  
Z-1

40

ان ادویات کا استعمال کرنے کے لئے مفصلہ ذیل ۲۲ عنوان قائم کئے گئے ہیں :-  
(۱) تغیر بمحاطہ حرارت و برودت (۲) دماغی حالت بمحاطہ اضطراب و بھینچنی (۳) خوف (۴) صندو  
تنگ مزاجی (۵) میلان بہ گریہ و رنج تغیر مرض بمحاطہ حرکت (۶) سکون زمانہ اشتداد مرض (۷)  
بعد از دوپہر ان اشتداد و انحطاط مرض بوجہ دباؤ و علامات اکثریہ و مخصوصہ متعلق بہ تشنگی اشتداد  
مرض بوجہ (۸) اکل (۹) شرب۔ دردوں کا احساس (۱۰) درجہ میں جلن ہو رہا (۱۱) درجہ میں اسطرح  
معلوم ہر کہ گویا کوئی چیز ہا ہے (۱۲) سوزش والا درد (۱۳) میس مارنے والا درد (۱۴) درجہ میں  
کچھاوٹ اور تناؤ ہو رہا (۱۵) درجہ میں اس طرح معلوم ہو کہ عضو یا وقت پھٹ پڑے گا۔  
عنوانات متذکرۃ الصدر کے مطابق اگر ہم کسی دوائی کا انتخاب کریں تو وہ دوائی مریض کے



باکھل حسب حال ہوگی۔ اور اس کے جملہ عوارض کی بیخ کنی کر دے گی۔

## برودت و اشتداد مرض بوجہ سرووت

پیشتر میں کہ ہم ادویات کا مفصل ذکر کریں۔ جو معمولی یا علائقہ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ برودت یا حرارت غریزی کی کمی اور سردی سے اشتداد مرض یا گرمی سے انحطاط مرض میں فرق کر لیا جائے۔ یہ دو علامت باکھل جدا گانہ ہیں۔ مثلاً ایک مریض جو گرمی کی خواہش رکھتا ہے۔ اور باوجود حصول حرارت کے بھی گرم نہیں رہ سکتا۔ سو کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی خاص علامات حرارت سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور سردی سے کم ہوتے ہیں۔ اس قسم کی مثال فاسفورس میں پائی جاتی ہے جس میں مرض نہایت مزہر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی علامات عمدہ سردی کے استعمال سے کم ہوتی ہیں۔ اس قسم کا مریض دوہرا مرض میں سرد چیزوں کی خواہش رکھتا ہے لیکن چوتھی وہ سردی سے عمدہ میں حرارت عمدہ کے باعث گرم ہوتی ہے۔ فوراً بندریت سے بچ جاتی ہے اس کی علامات سر بھی سرد چیزوں کے استعمال سے کم ہوتے معلوم ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے لائکو پوڈیم ایک گرم دوا ہے۔ اور ہرگز حرارت برداشت نہیں کر سکتی لیکن علامات عمدہ گرم چیزوں کے کھانے پینے سے کم ہوتے ہیں۔ ارسینک نہایت سرد دوا ہے۔ تاہم اس کی جملہ علامات سردی سے بڑھ جاتے ہیں۔

مفصلہ ذیل ادویہ عنوان بالا کے ماتحت مستقل ہیں۔

اکونائٹ۔ آرسنک۔ بلاڈوٹا۔ براونیا۔ کلکیریا کارب۔ چائٹا۔ کاربوونج۔ کاسٹکم۔ کالوسنتھ۔ ڈاکمارا۔ گریفارٹس۔ ہیڈسلفر۔ سپکالواہنا۔ اگنیشیا۔ لیکیس۔ لائکو پوڈیم۔ مرکوریس۔ نکلس و امیکا۔ نیٹریم۔ نائٹرک۔ اینڈ۔ فاسفورس۔ فاسفورک۔ ایڈ۔ رس۔ ٹاکس۔ سیڈیا۔ سلفر۔ سیلینیا۔

اب ہم ان ادویہ کو یکے بعد دیگرے بلحاظ ان کے خاص علامات بیان کرتے ہیں۔

آرسنک۔ جبکہ مریض سرد ہو۔ اور اس کے جملہ علامات سردی سے بڑھ جائیں۔ سو اسے سردی کے جو سردی سے کم ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب۔ مریض سردی کا احساس کرتا ہے۔ لیکن کھلی ہوا میں جانے سے متغیر ہوتا ہے۔ مرطوب ہوا بھی بُری محسوس ہوتی ہے اور درخت خفیف کے جھونکے سے بھی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔

چائٹا۔ جب بیرونی طور پر اور اندرونی اعضاء میں سردی کا احساس ہو۔

کاسٹکم۔ ایسی سردی جو حرارت سے رفع نہ ہو کھانسی۔ اسہال اور وجع مفاصل سردی سے



اشتداد پر ہوں۔ اور سردی ریشے کا باعث ہو۔  
 ڈاکمارا۔ جلد شکایت سردی مرطوب ہوا یا مرطوب جگہوں کی رہائش سے پیدا ہوں۔ زکام۔  
 کھانسی اور سٹپی دروسری سے زیادہ ہوتے جاتیں۔  
 گریفائٹس۔ مریض کو سخت سردی ہوتی ہو۔ زکام۔ نزلہ۔ پٹیوں کا درد اور علامات معدہ میں  
 سردی سے اضافہ ہو۔ لیکن جلدی علامات حرارت سے کم ہو جاتیں۔  
 ہایپر سلفر۔ مریض کو سردی خوب لگتی ہے۔ اور ہلکا سا جھوٹا بھی نہایت تیزی سے محسوس ہوتا  
 ہے۔ سرد ہوا یا سرد اشیاء پینے سے علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی حصہ جسم سرد ہو جائے تو تکلیفات  
 میں اضافہ ہو جاتا ہے۔  
 لائکو پوڈیم۔ اگرچہ دوا گرم ہے لیکن علامات مخصوصہ مثلاً سردی۔ کھانسی اور تکلیفات معدہ و گلو  
 سردی سے بڑھ جاتے ہیں۔  
 ٹائٹرک ایسڈ۔ مریض برف کی مانند سرد ہو۔ اور ذرا سی ہوا گھنے سے بھی اشتداد علامات ہو جاتا  
 ہے۔ پاؤں کے ٹکڑے سو۔ نزلہ زکام سردی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ البتہ کھانسی کو آرام ہوتا ہے۔  
 ٹکس و امیکا۔ تمام جسم میں سردی کا لگنا۔ کھلی ہوا میں سردی کا محسوس ہونا۔ لحاف پر لحاف اور ہٹنا  
 اور کپڑا جسم سے دور نہ کرنا۔ کھانسی اور سردی کا سردی سے زیادہ ہونا۔  
 فاسفورس۔ نہایت سرد ہے۔ خارجی طور پر سردی کا دماغ۔ معدہ۔ ہاتھ اور پاؤں میں محسوس ہونا  
 وجہ مفاصل۔ اعصابی درد۔ کھانسی اور اسہال سردی سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور علامات معدہ اور سرد  
 سردی سے کم ہوتے ہیں۔  
 فاسفورک ایسڈ۔ ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں اور پیٹ اور چہرے کی ایک طرف ٹھنڈی  
 ہوتی ہے۔  
 رٹاکس۔ اندرونی طور پر سردی کا ہونا۔ تری۔ کھلی ہوا کے جھونکے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے اور سرد  
 ہوا سے علامات تیز ہو جاتی ہیں۔  
 سلیشیا۔ عام طور پر سردی کا لگنا۔ ہمیشہ سردی کا احساس موسم سرما۔ ٹھنڈی اشیاء اور سردی سے  
 جلد علامات کا بڑھ جانا۔  
 اگر مفصلہ بالا دوا یہ مریض کے مطابق نہ ٹھہریں۔ تو مفصلہ ذیل ادویہ پر غور کر لینا علاج کے لیے  
 ازبس مفید ہے۔



ایکونائٹ۔ سردی سے تمام علامات زیادہ ہوتے ہیں۔ تکلیفات بوجہ سواری۔ سردی سے زکام  
دانت کا درد۔ خناق حلق۔ صرفہ۔ وجع مفاصل اور آشوب چشم یعنی رمد کا بڑھ جانا  
بلا ڈونا۔ گرم جگہ سے سرد جگہ پر جانا۔ سرد ہوا اور جھونکے تکلیفات میں اضافہ کرتے ہیں  
براہینیا۔ سردی۔ موسم گرما میں سردا شیاء کے پینے سے جو شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان  
کے لئے مفید ہے

کار بوج۔ سردی سے اثر پذیر ہو۔ ناک گھٹنے وغیرہ سرد ہوں  
کالوسنتھ۔ تمام جسم سرد ہو۔ موسم سرما میں شکایات بڑھ جائیں۔ معدہ۔ زکام۔ ورم معدہ اور وجع معال  
سردی سے بڑھ جائیں چہرے میں پھاڑنے اور ڈانگ مارنے والا درد محسوس ہو  
اپریکا کو اہنا۔ سردی و گرمی کا غیر معمولی احساس۔ سردا شیاء پینے سے قویٰ بن جائے۔ اور غمو یا شکایات  
موسم سرما میں ترقی کر جائیں

اگنیشیا۔ سردی کا اثر ہو۔ ٹھنڈی ہوا یا سرد پانی سے ہاتھ دھونے پر مرض میں ترقی ہو۔ ناک  
پاؤں اور ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں  
لیکیس۔ تمام جسم میں سردی ہو۔ ہاتھ پاؤں اور اوپر کالب سرد ہو۔ گلو کی شکایات سرد  
ہوا سے تیز ہوں

مرکیورس۔ سردی ناقابل برواشت ہو۔ احساس بہت زیادہ ہو۔ سردی کانوں۔ آئینہ اور  
ٹانگوں میں محسوس ہو

نیٹرم میور۔ دل کے گرد سخت سردی پاؤں۔ جوڑے پیٹھ اور معدہ میں سردی ہو  
سیلیسیا۔ تمام جسم میں سردی۔ سرد و مرطوب ہوا کا احساس۔ کھانسی۔ دانت کا درد اور وجع مفاصل  
سردی سے بڑھ جائیں

سلفر۔ سردی سے اور موسم سرما یا برسات یا ہوا میں مرض کا ترقی کرنا۔ اسہال اور امراض گلو کا سردی  
زیادتی اختیار کرنا

## حرارت و اشتداد مرض بوجہ حرارت

مفصلہ ذیل ادویہ اس عنوان کے تحت میں عام طور پر مستعمل ہوتی ہیں:-



ایس۔ انٹیمٹ مارٹ۔ براہونیا۔ ڈولکمارا۔ ڈوروسرا۔ گریفائٹس۔ ایسیکا کواہنا۔ لیکیس۔ لائیکو پوڈیم۔  
 مرکبیں۔ نیٹریم میور۔ فاسفورس۔ پٹسلا۔ سکیل۔ سلفر۔ سیسیا۔ ورٹرم۔ زنک  
 ایس۔ خام غور پر گرمی کا احساس اور گرم کرے میں معبود علامات۔ باوجود گرمی پہنچانے کے سردی  
 کا احساس اور سردی کا بالخصوص گرمی سے اشتداد پانا۔  
 پٹسلا۔ اندرونی طور پر گرمی۔ گرم کرے۔ گرم خوراک اور انگیٹھی کی گرمی سے علامات کا بڑھنا۔ عام  
 طور پر تمام علامات گرمی سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔  
 سکیل۔ گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ مزین جسم سے کپڑا دور کرنا چاہتا ہے۔ گرمی سے طبیعت  
 متغیر ہوتی ہے۔ اندرونی درد گرمی سے شدت پکڑتے ہیں۔ گرم شہابیہ کے کھلنے سے سردی مدہ  
 میں زیادہ ہوتی ہے۔  
 ایٹیمٹ مارٹ۔ سیریں بوجہ گرمی تخلیف ہوتی ہے۔ گرم اشہاد کے پینے سے کھانسی میں ترقی۔  
 گرمی بستر سے علامات میں زیادتی۔ گرمی سے غنودگی۔  
 براہونیا۔ کھانسی۔ گرم ہوا اور گرم کرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرا چہرہ اور سردی گرمی پہنچانے سے  
 زیادہ سرد محسوس ہوتے ہیں۔  
 ڈولکمارا۔ گرمی سے پتی اچھٹنا۔ کھانسی اور چھینکوں میں ترقی ہوتی ہے۔  
 گریفائٹس۔ رات اور شام کے وقت خشک گرمی سے مرض میں ترقی۔ انگیٹھی کی گرمی سے خارش  
 میں زیادتی۔ دانت کا درد گرمی سے زیادہ ہوتا ہے۔  
 ایسیکا کواہنا۔ گرمی پہنچانے سے سردی میں زیادتی۔ گرمی اور مرطوب ہوا سے تخلیفات کا بڑھنا۔  
 لیکیس۔ موسم بہار میں اگر گرمی زیادہ ہو جائے۔ تو مرض میں ترقی ہو جاتی ہے۔ بستر کی گرمی بھی  
 ہی علامات پیدا کرتی ہے۔ اور اسہال میں ترقی ہوتی ہے۔  
 مرکبیں۔ بستر کی گرمی سے خارجی دروں میں ترقی۔ گرمی کیلئے ذکی الحس۔ سردی۔ دم الاذن دکن شہر  
 درد وندناں۔ وجع المفاصل اور خارش کا بوجہ گرمی بڑھ جانا۔  
 نیٹریم میور۔ سورج کی گرمی اور موسم گرمی میں مرض مائل بہ ترقی ہوتا ہے کھانسی اور سردی بڑھ جاتی  
 ہیں۔ گرم خوراک کھانے سے درد وندناں میں ترقی ہوتی ہے۔  
 فاسفورس۔ اگرچہ مریض بظاہر سرد ہوتا ہے۔ لیکن پیٹھ کے نزدیک وہ ہرگز گرمی برداشت نہیں کر سکتا  
 گرم پانی پینے سے درد وندناں میں زیادتی۔ گرم خوراک سے اسہال کا لاحق ہونا۔ گرم شہابیہ پینے سے کھانسی کا بڑھنا



علاماتِ معده بوجہ گرمی زیادہ شدید ہو جاتے ہیں ہاتھ چہرہ اور بازو گرمی سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور  
خارش بڑھ جاتی ہے۔

سینہ گرم کپڑے۔ گرم آب دہوایا کپڑا اور صحنے سے تمام علامات میں زیادتی۔ رد اور  
سرور گرمی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گرمی سے تنفس میں تنگی۔  
ور پیرم۔ گرم کمرے میں کھانسی زیادہ۔ وجع اعصابی گرمی بستر سے زیادہ گرم موسم میں اہمال  
کی زیادتی۔  
زخم۔ ورزش کے بعد سرد ہو نہ پر علامات کا زیادہ ہو جانا گرم کمرے میں سرور کا بڑھنا۔

## بے چینی و اضطراب

مضامین ذیل ۳۲۔ ادویہ دماغی و جسمانی بے چینی کیلئے استعمال کی جاتی ہیں۔  
اکوتائٹ۔ آرسنک۔ ایس۔ ایٹم ٹارٹ۔ بلاڈوٹنا۔ چائنا۔ کلکریٹ۔ کاکا۔ پودینج۔ کاسٹیم  
کیموٹلا۔ کالونستھ۔ ڈیکمارا۔ ڈیجیٹالس۔ ہائیوسائنس۔ اپیکا کوہینا۔ اگنیشیا۔ لائکو پوڈیم۔ لیکیس۔ مرکورس  
نکس۔ وامیکا نیٹرم میور۔ ٹائٹلک۔ ایڈ۔ فاسفورک ایڈ۔ پلسٹلا۔ رس ٹاکس۔ سلفوریکس۔ سینہ۔  
سلیشیا۔ شانی۔ سگریٹ۔ تھوجا۔ ور پیرم۔  
اکوتائٹ۔ متواتر کرکٹ بدلنا۔ رات کے وقت بے صبر و فکر مند حرکت کرنا۔ اگرچہ یہ حرکت درد نہیں  
کوئی کمی نہیں لاتی۔ ہر ایک کام میں تعیل۔

آرسنک۔ دماغی و جسمانی بے چینی۔ امراض مزمنہ۔ سخت تھکات کی حالت میں۔  
بلاڈوٹنا۔ تلخ امراض قلبی میں مارتا۔ کائنا اور بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنا۔  
کلکریٹ یا کارب۔ دماغی بے چینی و اضطراب۔ بچہ صندی۔ چرچڑا اور بے چینی۔  
ڈیجیٹالس۔ جبکہ بے چینی بوجہ انتہائی اعصابی کمزوری کے ساتھ ہو۔  
ہائیوسائنس۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔  
لائکو پوڈیم۔ اگر بے چینی درد کے زیادہ احساس کے باعث ہو۔ دورانِ قولنج میں بے چینی۔  
مرکورس۔ دماغی اضطراب۔ نگر بندی سے فرار ہو ٹکی خواہش۔ ہر کام میں جلدی۔ متواتر جگہوں کا  
بدلنا۔ بے آرامی۔ شام (۸ بجے) سے صبح تک بے چینی۔



پلسٹا۔ دماغی بے چینی اور میان طبیعت پر تغیر۔ رات کو مجبوراً اٹھنا۔ مریض آرام نہیں کر سکتا  
اگرچہ حرکت باعث نقصان ہوتی ہے۔

رٹاگس۔ بھینپی و اضطراب۔ بار بار پہلو بدلنا بلکہ ایک بستر سے دوسرے بستر پر جانا۔  
سلفر۔ پاؤں کا متواتر پلانا۔ نظام اعصابی کی برہمی اور بے آرامی۔  
سلیسیا۔ تمام اعضاء میں وٹرکن کے باعث بے چینی۔  
سلیشیا۔ چلبلا خفیت شور سے بھی چونک پڑنا۔ اندرونی بے چینی دبرہمی۔ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ  
سے جسمانی بے چینی۔

سٹافی سگریا۔ بھینپی جسمیں حرکت کی خواہش نہ ہو۔ حرکت باعث نقصان۔  
زنگم۔ پاؤں میں چلبلا پن۔ متواتر نہیں حرکت دیتے رہنا۔  
ذیل کی ادویہ میں بے چینی دوسرے درجہ پر موجود ہوتی ہے۔  
ایس۔ مریض نہایت مشغول نظر آتا ہے کوئی کام بھی درستگی سے انجام نہیں پاتا۔ عام طور پر اپنا کام  
بدرتار بناتا ہے۔ جسمانی اور دماغی بے آرامی۔

انٹیم ٹارٹ۔ اضطراب۔ اوپر اوپر ہونا۔ بازوؤں کا پھینکنا۔  
کاربووج۔ رات کو بھینپی۔ شام کو ۴ بجے سے ۶ بجے تک دماغی بھینپی۔  
کاسکم۔ جسمانی بھینپی جو شام کو زیادہ ہو۔ بجائے کی خواہش۔ چلنے پر مجبور ہونا۔  
کالوسٹھ۔ بھینپی مدد ہال۔ اگرچہ مریض کمزور ہوتا ہے۔ تاہم حرکت پر مجبور۔ کسی پہلو چین نہیں پڑتا  
سرور کے باعث پہلے پر مجبور ہوتا ہے۔

ڈاکھارا۔ بے چینی۔ بے تعبیری۔ عام بے آرامی۔  
ایریکاک۔ دوران بخار میں بے چینی۔  
لیکیس۔ ہر دم کروٹ بدلنا۔ پشت اور اعضاء میں درد۔  
نیٹریم میور۔ سردی سے بھینپی۔ اعضاء کو متواتر متحرک رکھنا۔  
نخاسفورک ایسڈ۔ سینہ کی تنگی کو پہلنے سے آرام ہو۔ ہڈیوں۔ رانوں۔ سکہاؤں کے جوڑے میں درد۔  
تھوجا۔ رات کے وقت اضطراب کے باعث ڈانڈا ڈول۔ دماغی بے چینی۔  
ورٹیرم۔ حرکت دماغی۔ دماغی بھینپی۔ عورتیں خود کو پے پہن نہیں سکتیں۔ دائمی طور پر جھکے محسوس  
کونا اور بے وقوفانہ حرکات کا انتخاب ہونا۔



## غصہ وری

۳۴۷ ادویہ ہندی و غصہ و طبائع کیلئے مستعمل ہوتی ہیں :-  
ایکونائٹ - آرنیکا - آرسک - ایس - اینٹیم ہارٹ - بلاڈونا - براہونیا - کیمو ملا - کلکیریا کارب  
چائنا - کاربووج - کاسٹم - کالونٹھ - ڈیگم - ڈیگم - جلیسم - ہیپر سلفر - لیکیٹس  
لائکو پوڈیم - مرکبوس - نکسوامیکا - نیٹرم میور - نائٹریک ایسڈ - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پیللا  
رس ٹاکس - سلفر - سیپیا - سلیشیا - شافی - سگریا - مخوجا - وریٹرم - زنگم  
ایکونائٹ - وردنا قابل برداشت یہاں تک کہ مریض بوجہ شدت مرض بخونا نہ حرکات کرے  
تمام امراض جو غصہ کے باعث ہوں :-

ایس مریض نازک مزاج - اور خوش نہ ہونے والا - تنگ مزاج - امراض کا باعث غضب و  
تنگ طبیعت :-

بلاڈونا - لڑاکا - نہایت جوشیلا - چیخنا - مارنا - اور کسانا :-  
براہونیا - گریہ غصہ - چڑچڑا اور علیحدگی کی خواہش :-  
کیمو ملا ہمیشہ شفتہ مزاج - چڑچڑا - لڑاکا اور غصہ ور :-  
کلکیریا کارب - دن کو طبیعت چڑچڑی - ہندی - کینہ ور - غصیلا :-  
کاربووج - جوشیلا اور چڑچڑا - غصہ میں مارنا اور کسانا :-  
کاسٹم - چڑچڑا - لڑاکا - بچپن اور طبیعت نہایت بُری :-  
ہیپر سلفر خفیف بات پر خفا ہونا - ہندی - انتہائی طاقت کا استعمال قتل و حد آگ لگانے پر  
مائل - خدمات سے چڑچڑا :-  
لائکو پوڈیم - بیداری پر طبیعت نہایت چڑچڑی خفیف مخالفت بھی ناقابل برداشت ہندی - وارثہ  
مزاج - بے پرواہ - پیش از جریان حیض معنوم :-  
نکس و امیکا - بایوس - لڑاکا - ذکی الحس - مائل بسلامت - طبیعت - شکایات معدہ بوجہ غصہ -  
ڈرپک :-

نیٹرم میور - صبح کے وقت طبیعت کی خرابی نہایت غصہ و رگفتگو میں ہندی خفیف باتوں میں  
جذبات کا بھرکنا غصہ کے بذرات یا غم خوری سے شکایات کا پیدا ہونا - اظہار بہرہ وری کر نیہ خفا ہونا :-



ناٹھڑک ایسڈ سرکش۔ لڑنے میں لکپی۔ غصہ کے دوران میں لعنت ملامت کرنا خفیف باتوں سے  
نہایت دق ہونا۔ اُداس اور ضدی ۛ

قاسفورس۔ جوشیلا اور غصہ ور جسمانی اور دماغی طور پر چڑچڑا۔ ناخوشگوار اثرات سے مرعوب  
ہونا ۛ

پسٹلا۔ ہر شے سے بیزار۔ خاموش۔ جلدی غصہ کا آنا ۛ  
رٹاکس بے صبر۔ ہر بات میں دق ہونا۔ مایوس۔ بیزاری طبیعت ۛ  
سیسیا۔ دق ہونا اور ملامت کرنا۔ اعصابی چڑچڑاپن۔ کام کے متعلق بے پروائی ۛ  
سلیشیا۔ سرکش۔ ضدی اور جوشیلا ۛ

سلفر۔ ضدی ہر بات سے مایوس۔ جوشیلا ۛ  
تھو جیا خفیف باتوں پر غصہ آنا۔ لڑاکا اور جوشیلا ۛ  
ٹرکم۔ شام کے وقت بیزاری۔ جوشیلا۔ ڈرپوک۔ دق ہونے پر چلانا۔ چڑچڑا ۛ  
مفصلہ ذیل ادویہ کم استعمال ہوتی ہیں :-

انیم ٹارٹ۔ غصہ کے بعد علامات میں شدت۔ غصہ میں رونا اور چلانا ۛ  
آرنیکا۔ دق الحس۔ غصہ سے شکایات کا بڑھنا ۛ  
کالو سنڈھ۔ غصہ سے اشیاء کا پھینکنا۔ اسہال۔ تھ اور انقباض حیض بوجہ غصہ ۛ  
ڈلکمہارا۔ لڑاکا اور جلدی غصہ کا آنا ۛ

ڈی ٹیس۔ شکی اور معنوم ۛ  
جینسیم۔ معنوم اور عورت گزیر ۛ  
گریفٹھسک۔ چڑچڑا اور ڈھیٹھ ۛ  
لیکیٹس۔ حاسد اور نازک مزاج ۛ

سٹانی بیگریا۔ دق ہو کر یا غمخوری سے شکایات کا پیدا ہونا۔ بچے کا چیزوں کیلئے چڑانا۔ اور جب اسے  
دی جائیں۔ توان کا پھینک دینا ۛ

وریرم۔ تمام راست چلانا اور لعنت ملامت کرنا۔ غصہ میں قسموں کا کھانا ۛ



# خوف

ادویہ :-

ایکونائٹ - آرنیکا - بلادونا - برابرنیا - کلکیہ یا کارب - کاسٹم - کاربودج - ڈیجیٹلس  
جیلیسم - گریفائیٹس - ہیپرہائیوٹیمس - اگنیشیا - لاکو پوڈیم - مرکوریس - نیٹرم میورنیکس - وامیکا - فاسفورس  
پلسلا - سلفر - دیٹریم

ایکونائٹ - امراض بوجہ خوف - موت - تاریکی - بھیر - بھوت - اور گرنے کا ڈر  
بلادونا - خوف جودن کو زیادہ ہو - پانی اور بھرت پریت کا خوف - خوف سے پوشیدہ ہونا  
ڈیجیٹلس - خوف منتقل - خوف مرگ - ہر دم تکلیف دہ ہوتا ہے - قلب کی حرکت بند ہو جانے کا خوف  
جس سے مریض ہلنا شروع کر دیتا ہے

گریفائیٹس - خوفزدہ - صبح کی وقت خوف زیادہ معلوم ہو  
اگنیشیا - چوروں کا خوف و خطر ہر ایک خفیف شے باعث خوف ہوتی ہے  
لاکو پوڈیم - بزل - خوفزدہ خفیف شور بھی خوف پیدا کرتا ہے  
فاسفورس - موت کا خوف و خطر - خوف دوران باد و باران - گویا ہر ایک گوشے سے ہیبت شکلیں  
جھانک رہی ہیں

مفصلہ ذیل ادویہ بھی مفید ثابت ہوتی ہیں :-  
آرنیکا - خوف مرگ - چھوٹے اور بزرگ کے کا خوف  
کاربودج - جلدی خوفزدہ ہو جاتا ہے اور رات کو بھوتوں کا ڈر  
کاسٹم - ڈرپوک - بستر پر تنہا لیٹنے سے خائف - ہیبت خیالات سے دماغ پر آگندہ - ہر دم کسی  
ناخوشگوار واقعہ کی توقع - خوف مرگ

جیلیسم - بچات کا نہ ہونا - خوف مرگ - خوف کے بد اثرات  
ہیپرہائیوٹیمس - سوتے وقت انتہائی خوف  
ہائیوٹیمس - خوف کی وجہ سے سخت شکایات - تنہائی - چوٹ اور زہر کا خوف  
مرکوریس - ہر دم ہی خوف رہتا ہے کہ وہ (عورت) خودکشی کر لے گی - خوف تنہائی - ہوش و حواس  
کھوئے جانے کا خوف



نیٹیرم میور۔ اسقاط اور کسی امر کے واقع ہونے کا خوف۔ ہوش و حواس کھوئے کا خوف۔ رعش  
بعد از خوف

پلسٹلا۔ اسہال بعد از خوف۔ لوگوں سے خوفزدہ ہونا  
سلفر۔ اس بات کا خوف کہ اس کی مالی حالت تباہ نہ ہو جائے  
در ٹیرم۔ خوف کی وجہ سے دم کا گھٹنا۔ سردی۔ غش۔ پانچا کا بے اختیار خارج ہونا۔ خوف مرگ۔  
آسانی سے خائف ہونا

## اشک آلودگی

اوپر  
ایک نائٹ ایس۔ اٹمیٹ مارٹ۔ بلا ڈونا۔ براہینیا۔ کلکیر یا کارب۔ کار پوج۔ کاسٹیکم۔ ڈیچی  
ٹیس۔ گریفٹس۔ پیپر۔ کنیشیا۔ لائکو پوڈیم۔ نیٹیرم میور۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ رشاکس۔ سلفر  
سیپیا۔ در ٹیرم

ایس۔ مایوس اور خوفزدہ  
کلکیر یا کارب۔ زندگی سے مایوسی اور زود رنج  
کاسٹیکم۔ ناامید ہر شے کا تاریک پہلو دیکھ۔ دن کو گریہ میں مشغول۔ بچہ بات بات پر روئے  
گریفٹس۔ مثل گریہ خفیف باتوں پر چنچنا۔ چلانا۔ سردی و سن کر رونا  
کنیشیا۔ غم ہائی۔ گریہ و خندہ۔ علیحدہ بیٹھ کر رونا اور معمولی بات پر کڑھتے رہنا  
لائکو پوڈیم۔ دن بھر رونا۔ منوم اور نازک مزاج  
نیٹیرم میور۔ بلا سبب اداسی اور گریہ۔ گفتگو میں گریہ ہمیشہ مستقبل کا دھیان  
پلسٹلا۔ اداسی یا خوشی سے چنچنا۔ علامات مرض بیان کرتے وقت رونا۔ دق اور عاجز ہو کر  
گریہ کرنا

رشاکس۔ گریہ مع کمزوری۔ شام کو زیادتی۔ تنہائی کی خواہش بلا وجہ رونا  
سیپیا۔ بے اختیار رونا۔ زیادہ اداسی اور غموں کا رونا۔ کھلی ہوئی پھرے سے زیادتی  
سلفر۔ تسلی و ہمدردی سے گریہ۔ بیماری سے مرعوب ہو کر دن کو رونا



ورٹیم خیالی مصائب پر چھینا چلانا اور رونا  
 یہ ادویات کم مستعمل ہیں :-  
 ایکونائٹ - اداسی اور خوشی یکے بعد دیگرے  
 انٹیم غصہ سے گریہ چھوٹنے سے - دوران کھانسی میں  
 بلا ڈونا - ناامید اور دق ہو کر چلانا  
 کاربودج - اس خیال سے متاثر ہو کر کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے رونا  
 ڈیجیٹلس - آپہن بھرتا اور رونا - معوم طبیعت - گٹائسن کر زیادتی علامات  
 ہیمیر سلفر معوم - اداسی اور گھٹریوں رونا  
 فاسفورس - سنی دگریہ یکے بعد دیگرے - نال برگریہ

## اشتداد مرض بوجہ سکون

لیٹنے سے صعود مرض میں مفصلہ ذیل ادویات مستعمل ہوتی ہیں :-  
 ایکونائٹ - آرنک - ایس - انٹیم ٹارٹ - بلا ڈونا - کیوملا - ٹولکمارا - ڈوروسرا - ہایو  
 سائس بکیس - لاکو پوڈیم - نکس و امیکا - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پٹلا ٹیٹلس  
 آرنک - لیٹنے پر مجبور ہو لیکن درمیں ترقی ہو تنفس میں ضیق  
 ایس - بائیں کرڈ لیٹنے سے زیادتی خصوصاً علامات صدری میں تنفس اور کھانسی  
 کیوملا - آنکھوں کے سامنے روشنی کا تھخر تھانا - متلی - چکر - اعصابی اور ان کا درجہ چت لیٹنے  
 زیادتی - کسی چیز کے نکلنے میں تکلیف  
 ٹولکمارا - سرور - کھانسی اور وجع مفاصل میں لیٹنے سے زیادتی  
 ہایوسمس چت لیٹنے - لیکن کھانسی میں اضافہ ہو  
 ڈوروسرا - بستر پر لیٹنے سے علامات میں ترقی - ماؤف پہلو پر نہ لیٹ سکے - کھانسی تیز ہو  
 لاکو پوڈیم - بائیں پہلو پر لیٹنے سے کھانسی زیادہ ہو - دائیں پر کمی ہو - چت لیٹنے سے تنفس  
 میں زیادتی - کھانسی اور علامات معدہ دائیں کرڈ لیٹنے پر زیادہ ہوں



فاسفورس۔ چت لیٹنے سے نوٹیا کو آرام ہو۔ دائیں کروٹ لیٹنے سے اسپہال۔ اور علامات  
صدری بعد از نوٹیا آرام پائیں۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے دل۔ کھانسی۔ وجع مفاصل اور اسپہال  
میں زیادتی۔

پلسٹلا۔ دوران درد میں چت لیٹنے سے زیادتی۔ بائیں پہلو یا اس کروٹ جسمیں درد وغیرہ نہ ہو  
لیٹنے سے علامات بڑھ جائیں اور خواہش پیشاب۔ چت لیٹنے سے جلد جلد محسوس ہو۔  
رس ٹاکس۔ لیٹنے سے کھانسی۔ وجع المفاصل اور عرشہ میں ترقی۔

مفصلہ ذیل ادویہ بھی قابل غور ہیں۔  
ایکونائٹ۔ بخاریں لیٹنا ناقابل برداشت۔ اختلاج میں زیادتی۔ دائیں پہلو لیٹنے پر کھانسی  
اور صدری علامات میں اضافہ۔ رخساروں پر پسینہ۔

انٹیم ٹارٹ۔ ناؤٹ پہلو پر لیٹنے سے زیادتی۔ درد گوش۔ سوائے دائیں کروٹ کے ہر طرح  
لیٹنا باعث آفت ہو۔

بلاڈونا۔ دائیں جانب لیٹنے پر سردی اور کھانسی کا بڑھنا۔ درد جگر کی زیادتی۔  
لیکیس پھیپھڑوں۔ بائیں بازو۔ کمر۔ ریڑھ کی ہڈی اور ضیق کا لیٹنے سے بڑھنا۔  
لیٹے ہوئے بے اختیاری سے پیشاب کا نکل جانا۔

نکس و امیکا۔ کھانسی اور درد سینہ چت لیٹنے سے زیادہ ہوں۔ دائیں پہلو نہ لیٹ سکے۔  
دم۔ سردی اور پھیپھڑوں میں لیٹنے سے زیادہ ہوں۔

فاسفورک ایسڈ۔ جگر اور سینہ میں کھڑکھڑاہٹ بستر میں لیٹنے سے زیادہ ہوں۔  
سیپیا۔ چت لیٹنے سے سردی۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے کھانسی میں ترقی۔

## اشتداد مرض بوجہ حرکت

مفصلہ ذیل ادویہ اس وقت تجویز کی جاتی ہیں۔ جبکہ علامات مرض حرکت کرنے  
سے بڑھ جائیں۔

آرنیکا۔ آرنک۔ ایس۔ بلاڈونا۔ برائیونا۔ کاربودج۔ کالوسنتھ۔ ڈیجیٹلس۔ جلیمیم  
پیپر سلفر۔ اپیکا کو اہنا۔ لیکیس مس مرکوریس۔ نائٹریک ایسڈ۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔



سلفز۔ سلیشیا۔ ورٹر۔ زکھم۔

بلا وونا خفیف جھٹکے سے علامات کا بڑھنا۔ حرکت سے متفرق در و تو لیج جو پیچھے جھٹکے سے زیادہ ہو، اٹھتے ہوئے پاؤں کا لڑکھڑانا۔ سرور۔ چکر۔ در و چہرہ۔ اسہال۔ کھانسی کا حرکت سے بڑھنا۔ مریض آگے کی طرف جھک نہیں سکتا۔

برایو نیا۔ خفیف حرکت پر بھی تمام علامات کا بڑھنا۔ چڑھنا۔ اٹھنا۔ جھٹکنا اور لڑکھڑانا حالت مرض میں زیادتی پیدا کرتا ہے۔

کالوسنتھ۔ سر بھانا۔ آگے کی طرف جھٹکنا اور ٹھٹکنا باعث تکلیف ہوتا ہے۔ وجہ مفاصل۔ پیٹ کا درد اور درد چشم حرکت سے زیادہ ہوتے ہیں۔

مرکوریس۔ حرام مغز میں درد۔ جوڑوں اور گھٹنے کا درد۔ اختلاج۔ سینہ اور پھوڑے میں حرکت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔

نکس و امیکا۔ زینہ پر چڑھتے ہوئے کھانسی میں زیادتی۔ اٹھتے ہوئے چکر اور دائیں گھومے کا درد بڑھ جاتا ہے۔ بستر میں کروٹیں بدلنے اور ٹھٹکنے سے داغی اور پیٹ کی علامات میں ترقی چلتے ہوئے لڑکھڑانا۔

سلفز۔ سرور۔ کانوں میں شور۔ رانوں میں سوزش حرکت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چلنے میں سر۔ عرق النساء۔ ٹانگوں کے علامات اور ان کی جلن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھٹکنے پر سر کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اٹھنے اور بلندی پر جاتے ہوئے علامات میں ترقی۔

سلیشیا۔ خفیف حرکت سے تمام علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے کی طرف جھٹکنا۔ بلندی پر جانا اور ٹھٹکنا علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

مفصلہ ذیل ادویہ کی علامات مخصوصہ حرکت سے ترقی پاتی ہیں۔ ایس۔ سرور۔ سرور۔ اینٹن اور وجہ مفاصل حرکت سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ آگے جھٹکنا۔ ٹھٹکنا اور ہاتھوں کی خفیف حرکت زیادتی پیدا کرتی ہیں۔

آرسنک۔ سرور۔ در و در و خفیف حرکت سے زیادہ۔ بستر میں سر اٹھانے سے سرور۔ سرور۔ ٹھٹکنا اور بلندی پر چڑھنا علامت میں ترقی لاتے ہیں۔

آرنیکا۔ سرور۔ سرور۔ سینہ پیٹ۔ اینٹن اور سوزش حرکت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کاربووج۔ خفیف حرکت سے تنفس مشکلی سے آتا ہے۔ بستر میں کروٹ بدلنے اور چلنے سے



علامات میں ترقی ۛ  
 دھکی ٹلیس - حرکت وجع القلب پیدا کرتی ہے - بول و براہ کی خواہش - چلتے ہوئے دم اور ترقی  
 اختلاج اور تشنج - سینہ باز و اوپر اٹھانے سے کھانسی میں زیادتی ۛ  
 جلیسم - اس بات کا خوف کہ تا وقتیکہ متواتر حرکت نہ کی جائے - دل کی حرکت بند ہو جائے گی -  
 سردرد - پوٹے اور ٹانگوں میں تشنج حرکت سے ترقی کر جائیں ۛ  
 پیسیر سلفر - زینہ چڑھنے اور اترنے میں کمر اور ٹانگوں میں درد - آگے بھگنے یا سر پھرانے سے  
 سردرد میں تخفیف ۛ  
 اسکا کو اہنا - خفیف حرکت سے متلی - امعاء میں سخت درد - پسینہ - شانہ کی ہڈیوں کے درمیان  
 کھچاؤٹ ۛ  
 لیکیس - حرکت سے متفرق چلنے سے ضیق اور دوران سر میں ترقی و حرکت سردرد علامات  
 سینہ اور تنگی تنفس زائد ہوتے ہیں ۛ  
 ٹائٹیرک البید - مقعد میں سوزش - چکر - اندام ہنانی میں چھن اور ناگہانی دم کا رکنہ حرکت  
 سے زائد ہوتا ہے - اختلاج اور دم کا رکنہ - سردرد - پیٹ درد اور سردی حرکت سے زیادہ  
 محسوس ہوتا ہے ۛ

فاسفورس حرکت سے مفضلہ ذیل علامات میں زیادتی ۛ  
 سردرد - دم کا رکنہ - پیٹ کی کمزوری - ناتوانی - اٹری میں درد اور چلتے ہوئے پاؤں کا لڑکھڑانا  
 پکڑ - وجع القلب اختلاج - کھانسی - اور پاخانہ کا بے اختیار خارج ہونا ۛ  
 در طرم البجم - متلی اور تھکے کا خفیف حرکت سے زائد ہونا - اٹھنے سے کھانسی کا بڑھنا سرد  
 پیٹ کا درد - کمزوری اور دم کا رکنہ - حرکت سے بڑھ جاتے ہیں ۛ  
 زنکم - خفیف حرکت کر کے بے کر پٹہ لیوں اور پاؤں تک درد پیدا کرتی ہے - چلنے سے  
 چکر - سردرد - قولنج - سوزش - بے اختیاری سے پیشاب کا خارج ہونا - درد اٹری اور گھٹنے میں اور  
 درد کمر و سینہ کا حرکت سے بڑھنا ۛ



## صعود مرض بعد از دوپہر

### ادویات

ایس۔ بلاڈونا۔ براونیا۔ کالوسنتہ۔ ڈکمارا۔ ڈیجی ٹیلیس۔ اگنیشیا۔ لائکو پوڈیم۔ مرکوریس۔  
نیٹرم سور۔ ٹائٹریک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پٹلا۔ رس ٹاکس۔ سیسیا۔ سیلیسیا۔ تھوجا۔ زنک  
بلاڈونا۔ ۳ بجے سے پہلے ۷ بجے رات تک مرض میں اشتداد ہو۔  
لائکو پوڈیم۔ ۳ بجے سے پہلے ۷ بجے تک مرض میں اشتداد ہو۔  
پٹلا۔ ۳ بجے سے پہلے ۷ بجے شام تک علامات بڑھیں۔ شام کے وقت تمام علامات  
بالعموم زیادہ ہو جاتے ہیں۔

رس ٹاکس۔ ۲ بجے بعد از دوپہر بخار میں شدت۔ نوبتی بخار کا دورہ پانچ بجے بعد از دوپہر  
آتا ہے۔

سیسیا۔ ۳ بجے سے پہلے ۷ بجے شام تک علامات بڑھتے ہیں۔ بخار۔ چکر اور درد عموماً بڑھ  
جاتے ہیں۔

سیلیسیا۔ شام کے وقت اور رات کو عموماً صعود مرض ہوتا ہے۔ حرارت اور پیاس ۳ بجے سے ۵  
بجے (بعد از دوپہر) تک نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔

تھوجا۔ تقریباً ساڑھے پانچ بجے شام کے سردی کا محسوس ہونا۔ اسی وقت انوائمنیز کا اہل  
ہونا۔ سر کی چوٹی میں بوجھ کی زیادتی۔

زنک۔ ۴ بجے شام تک سردی کا لگنا۔ ۳ بجے شام سے ۴ بجے تک درد دل۔ ٹیگنی۔ چکر۔ لکھو  
کی جلن۔ چھینکوں کا اتنا تشنگی۔ کمزوری اور خیالات مرگ کا زیادہ ہونا۔ بعد از دوپہر ہلکی ہوا زیادہ محسوس  
ہونا۔

مفصلہ ذیل ادویات کے خاص علامات بعد از دوپہر زیادہ شدت اختیار کر لیتے  
ہیں۔

ایس۔ ۳ سے ۴ بجے شام تک سردی محسوس ہوتی ہے۔  
برایونیا۔ سردی ۴ بجے سے ۷ بجے تک۔ بار بار پیشاب کا آنا۔ عرق النساء اور دیگر عوارض کا  
سہ پہر کے وقت زیادہ ہونا۔



کالوسنتھ ۴ بجے شام سے ۹ بجے تک۔ علامات کا بڑھنا ۛ  
 ویکچی ٹبلے ۴ بجے شام سے ۶ بجے تک صعد مرض ہوتا ہے ۛ  
 اگنیشیا۔ سہ پہر سے شام تک دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ۴ بجے درد شدت کے  
 ساتھ ہوتے ہیں ۛ  
 مرکبوریس۔ ۵ سے ۶ بجے شام تک سردی کا لگنا۔ سہ پہر کے وقت خصلوں میں سردی  
 کا احساس ۛ

نیم گرم مہوڑ۔ سہ پہر میں پاؤں کا سرد ہونا اور حرارت و سردی کا ہونا ۛ  
 نائٹرک ایسڈ۔ کھانسی۔ سردی۔ چکر اور نفخ کا بعد از دوپہر بڑھنا ۛ  
 فاسفورس۔ ۲ بجے شام سے ۶ بجے شام تک جلد عوارض میں ترقی ہوتی ہے ۛ

## صعد و مرض بعد از نیم شب

### اوویات

آرنک۔ براؤنیا۔ کلمیریا۔ کارب۔ ڈروسرا۔ جلیسیم۔ مرکبوریس۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔  
 پوڈوفائلم۔ رس ٹاکس۔ سلفر۔ سلیشیا۔ فموجا  
 آرنک۔ ایک سے دو بجے تک عوارض میں اشتداد۔ بے چینی۔ اسہال حرارت۔ بردوت۔  
 اور تشویش کا زیادہ ہونا ۛ

ڈروسرا۔ مثلی کا زیادہ ہونا۔ کھانسی۔ حرارت اور چیرنے والے دردوں کا بڑھنا ۛ  
 نکس و امیکا۔ ۳ بجے صبح سے ۴ بجے تک علامات میں زیادتی۔ کھانسی۔ درد گروہ۔ پسینہ  
 کا زیادتی سے ہونا ۛ

فاسفورس۔ کھانسی۔ زکام اور عرق کا بڑھنا ۛ  
 پوڈوفائلم۔ ۲ بجے صبح اسہال کا پیٹ درد سے آنا۔ ۵ بجے صبح سے ۹ بجے تک انٹرایوں  
 میں تشنج ۛ

رس ٹاکس۔ بعد از نصف شب تمام علامات میں زیادتی بھینی۔ تشنج اور خارش میں زیادتی ۛ  
 سلیشیا۔ بعد از نیم شب علامات کا بڑھنا۔ ایک بجے صبح سے ۷ بجے تک سردی کا محسوس ہونا۔



۲ بجے صبح بیدار ہو جانا۔ ۶ بجے صبح کو پسینے کا آنا۔ ۶ سے ۸ بجے صبح تک اسہال کا جاری ہونا۔  
 نخوجا۔ سردی۔ سردی اور وجہ مفاصل کا شدت سے ہونا۔ ۳ بجے صبح سے ۴ بجے تک سر کی  
 چوٹی میں دباؤ کا احساس اور سردی کا لگنا۔  
 مفصلہ ذیل ادویات میں بعد از نیم شب صعدو مرض کم ہوتا ہے :-  
 کلکیریا کارب۔ ۲ بجے صبح سے ۳ بجے تک علامات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ۳ بجے کے بعد  
 پسینہ زیادتی سے آتا ہے اور مریض سو نہیں سکتا۔  
 جلیسیم۔ خوابوں کا آنا۔  
 مرکبورس۔ تشنگی۔ متلی اور پانی کا بکثرت منہ سے خارج ہونا۔ حرارت اور ٹھنڈی چیزوں کے  
 لئے بہت زیادہ خواہش۔ بعد از نیم شب تمام علامات بدتر ہو جاتی ہیں۔  
 سلفر۔ ۴ بجے صبح سے ۵ بجے تک صعدو مرض ہوتا ہے۔ بیداری کے بعد ۶ بجے صبح سے  
 ۷ بجے تک پسینہ کا آنا۔ دو بجے صبح تک کھانسی کا ہونا۔

## صعدو مرض بعد از خواب

ادویات  
 ایکونائٹ۔ آرنیکا۔ آرنک۔ ایس۔ کاربودج۔ کاسکم۔ بیپر سلفر۔ لیکیمس۔ لائیو پودیم  
 فاسفورس۔ ایسڈ پٹلا۔ رس ٹاکس۔ سلفر  
 لیکیمس۔ بعد از خواب علامات کا مجموعی طور پر زیادتی پانا۔ اور دوران خواب میں علامت  
 کا وارد ہونا۔  
 سلفر۔ بعد از خواب چونک پڑنا اور چیخنا۔ خوفزدہ بیدار ہونا بعد از خواب اسہال کا جاری  
 ہونا۔

مفصلہ ذیل ادویات میں بعد از خواب صعدو مرض کم درجہ کا ہوتا ہے :-  
 ایکونائٹ۔ سونے کے بعد بخار ناقابل برداشت ہوتا ہے بخوابوں سے چونک پڑنا۔  
 آرنک۔ بعد از خواب تھکن محسوس کرنا اور نیند میں چونک پڑنا۔  
 کاربودج۔ بعد از خواب مانگوں اور پاؤں کا زیادہ سرد ہونا۔



کا شکم۔ بیداری پر علامات کا بڑھنا۔ بیٹھنے پر مجبور ہونا۔ نیند کے بعد اڑیوں میں تناؤ اور کھچاؤ کا رہنا۔

ہمیشہ نیند میں ڈرنا اور نیند کے بعد ضیق کا وارد ہونا۔  
لائکو پوڈیم۔ جھوک اور تھکان کا محسوس کرنا۔ بیدار ہو کر مارنا اور لڑنا۔  
فاسفورک ایسڈ۔ یلوس خیالات کی کثرت۔ بیداری پر حرارت اور جھوک کا زیادہ ہونا۔

فاسفورس۔ تشویش اور تھکان کا احساس ہوتا ہے۔  
پلسٹا۔ بعضی۔ کاپی اور تھکان بعد از خواب زیادہ ہوتی ہیں۔  
رس ٹاکس۔ کمزوری۔ تشویش۔ بچینی۔ کپکپی کی ترقی اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ ریض ہرگز نہیں سویا۔

## صعود مرض باعث دباؤ

### ادویات

آرنک۔ ایس۔ براہونیا۔ کاربوج۔ ہیمپرفلکیمیس۔ لائکو پوڈیم۔ مرکوریس نیٹریم۔  
ٹائٹریک ایسڈ۔ ٹیکس و امیکا۔ سلینیا۔ سٹانی سیکیوریا۔

ایس۔ مریض خفیف چھوٹے کو بھی محسوس کرتا ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بستر کی چادر بھی اس کو نہ چھو جائے۔ بہترن مویں درد معلوم ہوتا ہے۔ بچے کو اگر چھو جائے تو وہ اڑ جاتا ہے۔

ہمیشہ سلفر نہایت ذکی الحس ہوتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی چیز اسے نہ چھو جائے سر کی جذبا چشم۔ گردن کی جگہ۔ گردن کے پٹھے اور بریدی گٹھے کو اگر چھو جائے تو تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہے

لیکیس۔ تھوڑا سا چھونے سے علامات بڑھ جاتی ہیں اور جب جگہ چھو جائے۔ وہاں نیلے اور سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ گلے کو دبائے سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اور سپٹ اور گلے کا چھوٹا مریض برداشت نہیں کر سکتا۔

لائکو پوڈیم جسم کے نرم حصے نہیں چھوئے جاسکتے چپت لباس یا لباس کا بوجھ ازادی علامات کا باعث ہوتا ہے اور مقام جگر میں خصوصاً زیادہ احساس ہوتا ہے۔



سلیشیا۔ آخری پسلی کے پچھلے مقام پر چھوٹا نہیں جاسکتا۔ تھرمیدہ اور چندیا کو دبائے سے مرض کو ترقی ہوتی ہے جس کو ٹ مریض سوتا ہے۔ وہ طرف سو جاتی ہے۔ چھوٹے سے سر۔ درد دندان چشم۔ جگر۔ کہتی اور اندام ہنائی کی تخلیفات ترقی کر جاتی ہیں۔  
 سٹانی سیکریا۔ چندیا کا سطحی درد۔ رحم اور پچھڑے دبائے سے بدتر ہوتے ہیں۔  
 مفصلہ ذیل ادویات کے علامات مخصوصہ دبائے سے شاید ہو جاتے ہیں اور ان کا تشنا دوسرے درجہ پر ہے۔

ارسنگ چندیا۔ معدہ اور پیٹ کے علامات دبائے سے زیادہ ہوتے ہیں۔  
 کاربو دیو ج۔ چندیا۔ جگر اور سفر و آنتوں کا درمیانی حصہ دبائے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے  
 نیٹرم مہور۔ کپڑے ناقابل برداشت۔ بال چھوٹے سے گرنے لگتے ہیں۔ ناک۔ جڑا۔ دانت۔ حرام مغز۔ اور پیٹ کے بالائی حصہ کو دبائے سے علامات کی زیادتی ہوتی ہے۔  
 ٹائٹریک ایسڈ مہاسوں کو چھوٹے سے خون کا جاری ہونا۔ دانوں کا ابھرنے۔ آنکھ کی سوزش۔ دانت۔ پیٹ سفر و دہن وغیرہ چھوٹے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔  
 ٹکس و امیکا۔ چست کپڑے۔ مقام جگر پر زیادہ سوزش پیدا کرتے ہیں۔ ہاتھ سے چھونا تشنج کا باعث ہوتا ہے۔ معدہ۔ جگر۔ چندیا اور پیٹ کے علامات دبائے سے بڑھ جاتے ہیں۔

## انحطاط مرض بوجہ دبائے کے

مفصلہ ذیل دس ادویہ عموماً مفید ثابت ہوتی ہیں۔  
 ایس۔ براہوینیا۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ ڈروسمرا۔ ٹوکمارا۔ گریٹاٹس پٹلا۔ رٹاکس سلیشیا  
 براہوینیا۔ دبائے سے عام طور پر آرام محسوس ہوتا ہے۔  
 چائنا۔ چھاتی سے کے کر سترنگ درد اور بوجہ۔ آگے جھکے مقام جگر کا دباؤ کم ہوتا ہے۔  
 کالوسنتھ۔ سختی سے دبائے اور مضبوط کپڑے سے درد کو آرام محسوس ہوتا ہے۔  
 ڈروسمرا مریض کھائے اور چھینک مارتے وقت چھاتی کو ہاتھوں سے تھام لیتا ہے۔ چہرہ۔ پیٹ اور چھاتی کا درد دبائے سے کم ہوتا ہے۔  
 سلیشیا۔ اگرچہ بہت سے درد دبائے سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن سرور کو دبائے سے یا زور سے



باندے سے آرام ہوتا ہے ۛ

مفصلہ ذیل اودیہ میں علامات مخصوصہ دبانے سے کم ہوتی ہیں۔

ۛ دبانے سے سر درد کو آرام ہوتا ہے۔ اگرچہ باقی تمام علامات بڑھ جاتی ہیں ۛ

ۛ ٹانگہ یا پشت اور سینہ کے درمیان دبانے سے آرام ہوتا ہے ۛ

گریفٹائیس۔ درد قوی کو دبانے سے آرام ہوتا ہے مقام جگر اور پیٹ میں قحطے سے دباؤ یا چپٹ کپٹے

سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے ۛ

رستاکس۔ عرق اند کو دبانے اور گرگڑنے سے آرام معلوم ہوتا ہے۔ ٹانگوں۔ کمر۔ پشت اور

چالے کا درد دبانے سے کم ہوتا ہے ۛ

## تشنگی

ادویات۔ ایکو نائٹ۔ آرنیکا۔ ارنک۔ بلاڈونا۔ براہونیا۔ کلکیرو یا کارب۔ گیوملا۔ چائنا۔

ٹریکیٹائیس۔ ہائپوس۔ یلیکس۔ مرکپورس۔ نکس۔ وایکا۔ نیٹرم۔ میور۔ ٹائٹراک۔ ایسٹ۔ فاسفورس۔

پلٹوفا۔ ٹیکم۔ رستاکس۔ سلفر۔ سلیشیا۔ دیپٹرم۔ الیم

یہ علامات بہت سی ادویات اور امراض میں پائی جاتی ہے۔ اگر پیاس کے لئے کوئی خاص اور تین

وجہ نہ ہو تو یہ ایک اہم علامت ہوتی ہے۔ لیکن جب حرارت تیز ہو رہی ہو یا گرمی میں کوئی شخص کام کر رہا ہو۔

یا فوڈ پیس کا مریض ہو تو اس شخص کیلئے یہ علامت ایک معمولی بات ہے اور ایسی حالت میں پیاس کا فائدہ علامت

میں کوئی غیر معمولی وجہ نہیں رکھتا ۛ

ایکو نائٹ جلن۔ نہ بجھنے والی پیاس۔ کڑوی اشیاء کے لئے خواہش ۛ

ارنک۔ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش۔ جرمہ جرمہ کر کے پیئے اور اکثر پیئے۔ سینہ میں تشنگی کا غلبہ۔ کھٹی اشیاء

کاٹی۔ دودھ اور شراب کی خواہش ۛ

براہونیا۔ پیاس کی شدت اور اندرونی طور پر جلن۔ دیر کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پیتے۔ گرم اشیاء

کے پینے سے آرام ہو ۛ

کلکیرو یا کارب۔ پیاس جو پانی پینے سے کم نہ ہو۔ رات کو تکلیف زیادہ ہو۔ سرد اور کھٹی اشیاء کے

پینے کی خواہش ۛ



کیمو ملا۔ سرد پانی کی خواہش۔ کافی پینے کے بعد کمزوری کا لاحق ہونا۔ اور جی تھلانا۔ رات کے دور کو گرم پانی سے آرام۔ کھٹی چیزوں کی خواہش

چائنا۔ لرزہ سے اول اور بعد اور دورانِ سپتہ میں پیاس۔ پانی قہقہہ اور اکثر پیئے ۛ

ٹوچی ٹلیس۔ گنگانار پیاس کا احساس۔ لب خشک۔ کڑوی اور کھٹی چیزوں کی خواہش ۛ

مکروس۔ زبان تر لیکن سرد اشیاء کیلئے شدت کی پیاس ۛ

نیٹرم میور۔ پیاس کا گنگانار احساس۔ لیکن پانی پینے کی خواہش نہ ہو۔ شام کو زیادتی علامات کھٹی اور کڑوی اشیاء اور دودھ کی خواہش۔ کافی وغیرہ سے نفرت ۛ

فاسفورس۔ نہایت سرد اشیاء پینے کی خواہش اور معدہ میں نادر فیکہ وہ گرم نہ ہو جائیں۔ شکایتِ

ہوتی ہے۔ گرم ہونے پر وہ شے بذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔ خوشگوار اشیاء مرغوب خاطر ہوتی ہیں۔ گرم دودھ۔ چائے۔ کافی وغیرہ سے نفرت ہوتی ہے ۛ

ریٹاکس۔ رات کو گنگانار ہونا اور سرد اشیاء کی خواہش ۛ

سلفر۔ کثرتِ پیاس و قلتِ غذا۔ شراب کی خواہش ۛ

ورٹیم البم۔ برف کی طرح سرد اشیاء کی خواہش۔ جو اکثر لیکن کم مقدار میں کھائی جاتی ہے ۛ

مفصلہ ذیل ادویہ خاص علامات رکھتی ہیں :-

ازسکا۔ بغیر سبب کے سرد پانی کی خواہش۔ سرکہ جیسی اشیاء طبیعتِ مائل ہوتی ہے ۛ

بلاوونا۔ شدتِ پیاس لیکن پانی سے دم گھٹتا ہے۔ لیوں یا سبجین کی خواہش ۛ

پاپوسیس۔ پانی سے خوف۔ نہ کم ہونے والی پیاس۔ کوئی چیز نگل نہ سکے ۛ

لیکیس۔ دائمی پیاس لیکن پانی پیتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ پانی سے بیزاری ۛ

نکس دامیکا۔ لرزہ میں پیاس۔ صبح کے وقت شراب و سکرات کی خواہش ۛ

ناتسٹرک ایسڈ۔ صبح کے وقت شدت کی پیاس ۛ

پوڈوفاکٹم۔ سرد پانی کی بڑی مقدار کے لئے خواہش۔ کھٹی چیزیں مرغوب ہوتی ہیں ۛ



# خوراک سے بعد از خوراک اشتداد مرض

علامات بالا مفصلہ ذیل ادویہ میں پائی جاتی ہیں :-  
 آرٹک - اٹیم ٹارٹ - بلاڈونا - برابوینا - کیوٹلا - کلیریا کارب - چائنا سکار بوچی ٹیس - کاسٹیکم  
 کالوسنتھ - گریفائٹس - ہائوسیس لیکپس - لائکو پوڈیم - نکس و امیکا - نیٹرم میور - نائٹریک ایڈ - پٹلا -  
 پوڈوفالیم - رٹاکس - سلفر سیپیا - سلیٹیا - تھوجا - زنگم - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ  
 آرٹک - صبح ہمارے طبیعت بہتر معلوم ہوتی ہے - ذائقہ تلخ - متلی - بعد از خوراک پافانہ اور لرزہ میں  
 شدت

برابوینا - بعد از خوراک بہت سی علامات کا ظاہر ہوتا - معدہ میں بعد از خوراک دباؤ اور پھجکا معلوم  
 ہوتا - پھلی - بہتر ترکاریاں - پیڑ وغیرہ کھانے سے اشتداد علامات - کھانے کے بعد کالی کھانسی کا شدت  
 سے ہوتا

کلیریا کارب - کھانے کے بعد جی متلانا اور معدہ میں دباؤ - دانت کا درد - کھانسی - علامات قلبی -  
 پافانہ اور لرزہ میں شدت

کاسٹیکم - روٹی - چربی غذا اور تازہ گوشت کھانے سے شکایات پیدا ہوتی ہیں  
 کالوسنتھ - قلیل خوراک سے اسہال کا جاری ہونا - آلو کھانے سے قولنج پیدا ہو - مرڈ اور نفخ بعد از غذا  
 کھانے پینے سے درد میں زیادتی  
 لیکمیس - چکرستی - غنودگی - دم کنی - حرارت کا بڑھنا - معدہ کا دباؤ - اسہال خوراک سے پہلے  
 یا بعد از خوراک زیادہ ہو جاتے ہیں

لائکو پوڈیم - ایک وہ نمٹوں سے طبیعت کا سیر ہو جانا - غنودگی - معدہ اور جگر میں دباؤ - کھانے کے بعد  
 خوراک کا نکل جانا - پیاز - پھلی وغیرہ کے بد اثرات

نکس و امیکا - کھانے کے بعد غنودگی - کھانے کے بعد کپڑے کے بندوں کا ڈھیلہ کرنا - بھنی سے  
 خلل و اغ - ذائقہ کٹھا - دباؤ کھٹی دکاریوں کا بعد از خوراک وار دھونا - کھانسی کا بڑھنا

نیٹرم میور - ہمار یا خالی پیٹ ہمیشہ طبیعت درست معلوم ہوتی ہے - کھانا کھاتے وقت چہرہ پر عرق -  
 متلی - اختلاج اور صفراء کی زیادتی

فاسفورس - کھانے کی ابتدا سے انتہا تک درد کا لاحق ہوتا - سرد خوراک کی خواہش متلی - بعد



خوراک معدہ بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے :

پسٹلا مٹھائی۔ مرغز غذا چربی۔ پیاز وغیرہ کھانے سے جو شکایات پیدا ہوں ان کی شہمت ہے :  
 سلفر پانی زیادہ پینا۔ خوراک کم۔ نھوڑی سی غذا سے شکایات کا بڑھنا۔ دودھ مصغم نہیں ہوتا :  
 سلیبیا کھانا کھاتے ہی دردوں کا بڑھنا۔ روٹی۔ دودھ۔ چربی اور کھٹی چیزوں سے شکایات کا بڑھنا :  
 سلیبیا۔ شام کی غذا کے بعد پاؤں کا برف کی طرح سرد ہونا۔ اور پیٹ میں سردی کا احساس۔  
 کھٹے ڈکار۔ معدہ کا بھرا ہوا محسوس ہونا۔ کھانے کے بعد ڈکاروں کے ساتھ پانی خارج ہونا :  
 زنگم۔ دودھ اور شہرباب موافق نہیں ہوتے۔ شکر کھانے کے بعد ڈکاروں کے ساتھ پانی کا نکلنا :  
 مندرجہ ذیل ادویات میں علامت متذکرہ بعنوان دوسرے درجہ پر آتی ہے :  
 انٹیم ٹارٹ۔ معدہ کے دباؤ کو کھانے سے آرام آتا ہے۔ لیکن کھٹی چیزوں کے کھلنے سے  
 وہ پیدا ہوتا ہے :

بلا ڈونا۔ کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ معلوم ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ بڑا ہوتا ہے :  
 کیمو ملا۔ کھانے کے دوران اور بعد میں فرق اور چہرے پر حرارت کا محسوس ہونا۔ چکر متلی اور بعد  
 از خوراک شکم کا اچھا رہا :

چائنا۔ غنودگی۔ بعد از خوراک اضطراب۔ سرد درد اور معدے کا بھرا ہوا معلوم ہونا :  
 کار بو درج۔ درد کے خوف کی وجہ سے کھانے سے انکار۔ بعد از خوراک سرد درد۔ معدہ میں صفرا۔  
 بھاری پن۔ گرم ڈکاریں اور تین اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ بعد از خوراک پیٹ پھٹ پڑ گیا۔ کھن۔  
 چربی۔ مچھلی اور مٹھائی مصغم نہیں ہوتی :

گریفاٹس۔ شیریں چیزوں سے جی کا متلانا اور ان سے نفرت۔ گرم اشیاء کا مصغم نہ ہونا :  
 ہالیوٹیس۔ کھانے کے بعد تھکی اور تشنگ۔ پیٹ میں قراقر کا ہونا :  
 ناسٹرک البسڈ۔ ذائقہ تلخ۔ معدہ میں بھاری بوجھ۔ کمزوری۔ حرارت اور اختلاج بعد از خوراک۔ صفرا  
 سے صفرا کا پیدا ہونا۔ چربی غذا متلی اور صفرا پیدا کرتی ہے :  
 فاسفورک البسڈ۔ معدہ میں دباؤ اور کھانے کے بعد کھٹی ڈکاروں کا آنا۔ حامص اور کھٹی اشیاء  
 کے کھانے سے اسہال آتے ہیں :

ڈیوٹا۔ کھانے کے بعد بھوک کا احساس۔ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد متلی اور تھ۔ اسہال  
 اور کھٹے ڈکار بعد از اسہال :



رٹاکس - کھانے کے بعد غنودگی اور متورم ہونا  
تھو جھا - تمباکو - مشرب - چائے - چربی - پیاز وغیرہ سے جو شکایات پیدا ہوں - انہیں مفید ہے :

## جلن والے درد

اوویس - ایکونائٹ - ارنیکا - ارنک - ایس - بلاڈونا - براہونیا - چائنا - کاربونک - کاکم  
کالوسنتھ - ڈنگمارا - ڈروسرا - گریفائٹس - اگنیشیا - لیکسیس - لاکو پوڈیم - مرکوریس - نیٹرم میو  
نایٹرک ایسڈ - نکس و امیکا - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - رٹاکس - سلفر - سیپیا - زنگم -  
سلیشیا :

ایکونائٹ - اندرونی طور پر گرمی کا احساس - لب اور زبان میں درد جلن کے ساتھ  
آرنک - جلن والے درد - گرمی پہنچانے سے آرام پاتے ہیں - ذریدوں - سر - آنکھوں -  
ناک - ذہل - رطوباتی جھلی - جگر - رحم - پشت - حرام مغز اور جوڑوں میں جلن کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے  
بلاڈونا - آنکھ - ناک - معدہ - پیشاب اور چھاتی میں جلن کا احساس  
براہونیا - سر - آنکھ - پسلیوں - جگر - پیٹ - پافانہ - پیشاب اور چھاتی میں جلن  
گریفائٹس - سر - آنکھ - زبان - معدہ - پیٹ - اندام نہانی - ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہیں  
یا ان میں جلن کے ساتھ درد ہوتا ہے :

مرکوریس - عموماً جلن والے یا ڈنگ مارتے ہرے درد - سینک سے آرام پاتے ہیں - اندرونی  
طور پر جلن کھجلا نے کے بعد جلن :

نیٹرم میو - سورج یا آگ کی گرمی سے درد کا بڑھنا - کھلی ہوا یا سرد پانی سے درد کا کم ہونا - چنڈیا  
آنکھ - کان - ناک - گھٹا - معدہ - اعصاب - پیشاب کی نالی - اندام نہانی - ہاتھ اور پاؤں میں درد کا جلن کے  
ساتھ ہونا :

نایٹرک ایسڈ - عام طور پر جلن - ڈنگ مارتا ہوا اور مقامی درد  
نکس و امیکا - اندرونی جلن - سر - گھٹا - معدہ - پیٹ - سفر - پشت - شانہ اور سینہ میں جلن کے ساتھ  
درد محسوس ہوتا ہے :

فاسفورس - عام طور پر چلتا ہوا اور - سر - سفر - چھاتی اور کوڑی کے نیچے محسوس ہوتا ہے :



فاسفورک ایسڈ۔ پچھلے حصہ جسم میں درد جلن کے ساتھ جگر گلو اور چھاتی میں بالعموم جلن ہوتی ہے۔  
پائسلہ۔ آنکھ گلو۔ مثانہ۔ پیشاب کی تالی۔ پاؤں۔ سینہ اور دل میں جلن ہوتی ہے۔  
رسٹا کس۔ جلن اور ڈنگ مارتا ہوا اور دبائیں پہلو میں محسوس ہوتا ہے۔

سلفر۔ عام طور پر تمام جسم میں جلن اور گرمی۔ تمام جلد میں جلن اور بالخصوص ان حصوں میں جن پر کہ  
مریض لیٹا ہوا ہو۔ چند یا۔ پیشانی۔ تنوے۔ آنکھ۔ پوٹے۔ نتھنے۔ چہرہ۔ گلو۔ معدہ۔ پیٹ۔ پیشاب کی  
تالی۔ سفرہ۔ بواسیر کے مہاسے۔ شانوں کے درمیان ہاتھ اور انگلیوں کے سرے۔ گھٹنے اور پاؤں میں  
خاکہ رات کو جلن محسوس ہوتی ہے۔

سیپیا۔ اندرونی گرمی۔ جسے کھلی ہوا میں آرام محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں یکے بعد دیگرے  
گرم اور سرد ہوتے ہیں۔

سلیشیا۔ پاؤں کے تنووں اور پھوڑوں میں جلن عام طور پر جلن اور ڈنگ مارنے والے دروں  
کا احساس۔

زنکم۔ پشت۔ تمام حیاں مغز۔ بائیں بازو۔ دائیں کلائی۔ بائیں چوڑے۔ تنوے۔ جلد اور قبل میں  
جلتا ہوا درد۔

وہ جلتا ہوا درد جو مذکورہ بالا ادویات میں نہیں پایا جاتا۔ مفصلہ ذیل ادویات کے تحت  
میں ہے۔

ارنیکا۔ پاؤں۔ معدہ۔ دل۔ سینہ۔ گلو۔ لب۔ آنکھ اور دماغ میں جلتا ہوا درد۔  
ایس۔ درد عموماً جلنا اور ڈنگ مارتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔  
چائٹنا۔ ایک ہاتھ میں جلن اور دوسرا طرف کی طرح سرد۔ جلد میں اور قبل میں جلن۔  
کاربووج۔ آگ کی طرح جلن کا ہونا۔ پیاس باکھل نہیں ہوتی۔ سردی سے آرام کا محسوس  
ہونا۔

کاسکم۔ عام طور پر جلنا ہوا درد۔  
کالوسنتھ۔ پیشانی میں دائیں طرف جلن۔ پوٹے۔ چہرہ۔ زبان۔ پشت۔ سفرہ اور پاخانہ کرتے وقت  
پیشاب کی تالی میں جلن۔ رحم میں دائیں جانب اور سامٹگانہ اور ٹانگ میں بھی جلن معلوم ہوتی ہے۔  
ٹولکمارا۔ پیشانی۔ فم معدہ۔ سفرہ۔ مقعد۔ پاؤں۔ مسوڑھے۔ پشت اور جسم کی نالیوں میں جلن۔  
ڈوروسرا۔ مرکز سینہ اور گلو میں جلن کا محسوس ہونا۔



اگنیشیا۔ ایک رخسار درکان میں سرخی جلن کے ساتھ۔ اندام ہنائی اور پاؤں میں جلن۔ سر۔ آنکھ۔  
 فمعدہ۔ معدہ۔ پیشاب کی نالی اور اڑھری میں جلن۔  
 لیکیمس۔ سر کی چوٹی۔ آنکھ۔ منہ۔ مفعدہ۔ رحم۔ کلائی۔ معدہ اور چولے سے بیکر پاؤں تک گلو۔  
 ہاتھ اور تنوں میں جتنا اور ڈنگ مانتا ہو اور۔  
 لاکو پوٹویم۔ ایک پاؤں گرم اور دوسرا سرد۔ نہان پر آہوں میں جلن۔ انگوٹھے اور انگلیوں میں  
 جلن۔ معدہ۔ مفعدہ۔ پچھلے حصہ جسم کے اعضاء۔ رحم اور بخنوں میں درد۔

## حیرتا ہوا درد

اووہ۔ ازیکا۔ بلاڈونا۔ کلگیر یا کارب۔ چائینا۔ کالوسنتھ۔ ڈروسرا۔ ہاپوسیمس۔ لاکو پوٹویم۔  
 مرکوریس۔ نکسوامیکا۔ میٹرم میور۔ پٹلا۔ سلفر۔ سلیشیا۔ شافی سگریا۔ وریٹرم البم۔ زنگم  
 پلاڈونا۔ بچہ دان و عضلات۔ پیٹ۔ معدہ۔ چہرہ اور سر میں دائیں جانب حیرتا ہوا درد محسوس  
 ہوتا ہے۔

کلگیر یا کارب۔ حیرتا ہوا درد جو اندر سے باہر کی جانب آتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور مقام جگر۔ پشت۔  
 معدہ اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔

کالوسنتھ۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ امعاء کو چاقو سے کاٹا جا رہا ہے۔ پیشانی۔ سر کے بائیں  
 طرف۔ آنکھ۔ کان۔ معدہ۔ پیٹ اور سینہ میں درد ہوتا ہے۔

ڈروسرا۔ پٹیلوں اور دائیں جانب اکثر چیرے والے درد کا احساس۔

ہاپوسیمس۔ جڑوں۔ سینہ اور پیٹ میں چیرے والا درد۔

لاکو پوٹویم۔ شانہ۔ مفعدہ۔ متناسل۔ پیٹ۔ سینہ۔ چوٹی اور جگر میں حیرتا ہوا درد۔

مرکوریس۔ عام طور پر درد ہکا۔ بھمی مارنے والا اور کھن کے ساتھ ہوتا ہے۔ معدہ سے آٹھ سال

تک دریدگی کا حس۔ آنکھ۔ پیٹ اور امعاء میں درد ہوتا ہے۔

نکسوامیکا۔ ناف کے مقام پر چیرا اور پس مارنے والا درد۔

پٹلا۔ امعاء۔ گلو۔ پیٹ۔ اعضاء جگر۔ سینہ۔ پشت اور ذہل میں حیرتا ہوا درد۔

سلیشیا۔ دائیں بھپھرے۔ خبیہ۔ چھاتی۔ شانہ۔ گھٹنوں۔ معدہ۔ مفعدہ اور ناف کے مقام پر



چیرنے والے درد +

ورٹیم الیم۔ بائیں چھاتی میں درد۔ قونج مرڈ اور چیرتے ہوئے درد کیساتھ +  
ونکم۔ دوران حیض میں کمر اور ناف کے مقام پر درد۔ دائیں آنکھ اور کان۔ ناک متعده۔  
سفرہ۔ گردہ اور پیشاب کی نالی میں درد +

چیترا۔ اور مفصلہ ذیل ادویات میں بھی پایا جاتا ہے :-  
آرنیکا۔ گردہ میں اس طرح درد ہوتا ہے کہ گویا کوئی تیرتولہ سے کاٹ رہا ہے۔ درد دندان  
فم معدہ اور جگر میں درد +

چائنا۔ ہوا خارج ہونے سے پہلے چیترا ہوا اور پیٹ کے تمام اطراف میں جاری ہوتا ہے  
تلی میں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیر رہا ہے۔ اور وہ نہایت سخت ہو گئی ہے +  
سٹافی۔ سنگری یا۔ نیز دھار والے آلات کے گھاؤ کے لئے مفید ہے پیٹ اور ٹانگوں  
میں درد۔ عمل جراحی کے بعد زخموں میں درد +

## در دجن میں مقام درد دھونسا ہوا دوکھن والا معلوم ہو

ادویات۔ آرنیکا۔ بلاڈونا۔ چائنا۔ ڈروسرا۔ ہیپیریکس و امیکا۔ ٹیٹرم میور۔ فاسفورس  
سٹاکس۔ سلفر۔ سیلیسیا۔ ونکم۔

آرنیکا۔ ضرب اور موج کے بد اثرات کو دور کرنے کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ عام  
طور پر درد دوکھن والے معلوم ہوتے ہیں۔ دماغ معدہ اور گھٹے میں سرد دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔  
بلاڈونا۔ دوکھن پوٹوں میں خلق سے کان تک پیٹ اور کمر میں درد معلوم ہوتا ہے۔  
چائنا۔ چھوٹے سے درد کا اثر دھنا لیکن زور سے دبانے سے دوکھن کم ہوتی ہے۔ تمام جوڑ  
ہڈیاں۔ اور غلاف ہڈی میں درد۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ تمام جسم دھونسا ہوا ہے۔

ڈروسرا۔ کپٹی اور دائیں کپٹی کی جلد میں دوکھن۔ جگر اور خندہ دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔  
ہیپیریکس۔ پیشاب کی نالی۔ آلات تناسل۔ سفرہ اور پنتھن کے درمیانی جگہ۔ سینہ اور تمام  
اعضاء میں دوکھن۔ دان کے پیرونی پٹھے دھونستے ہوئے معلوم ہوئے تھیں۔

ونکم و امیکا۔ تمام جسم میں دوکھن پیٹ ذوالحس مقام جگر میں۔ پیٹ اور اس کے  
اطراف۔ سینہ۔ جوڑ مثانہ میں دوکھن۔ دماغ۔ گردہ۔ پشت۔ اعضا اور پیٹ کا پچھلا حصہ۔



دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

تیسرے میوے۔ ناک کی بائیں جانب تھتھے۔ بازو۔ غم معدہ۔ سینہ۔ پاؤں کے جوڑ جگہ۔ تالو اندام نہانی۔ گلا۔ حجرہ اور پاؤں میں دو کھن۔

فاسفورس۔ ہڈیاں دھونسی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ دو کھن اور درد۔ ناک۔ منہ۔ سینہ پھیپھڑے۔ گلا اور ہوائی نالیوں میں دو کھن۔

رشاکس۔ دو کھن اور اینٹھن۔ سر۔ تھتھے۔ زبان۔ پیٹ۔ ناف اور پیٹ کے پتھے پشت اور اندام نہانی۔ سینہ اور پیٹھ کی بائیں جانب دو کھن۔ گلا۔ اعضا اور سر دھونسنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

سلفر۔ بائیں آنکھ۔ منہ کے جوڑ۔ پیٹ میں درد اور دو کھن۔ پیٹ پشت۔ بایاں شانہ۔ بال۔ کولہ۔ ران۔ ٹانگ کا باہر والا حصہ اور پاؤں دھونسنے ہوئے ہوتے ہیں۔

سیلیشیا۔ اندرونی دو کھن۔ ہڈیوں سینہ پھیپھڑے اور سر میں دو کھن چشم میں اینٹھن اور دو کھن زنگم۔ سر۔ چند یا۔ بال۔ دائیں آنکھ کے اوپر ولے پیوٹے۔ ناک۔ دانت۔ زبان سینہ کے اوپر کے حصے۔ اطراف معدہ۔ مقعد۔ مسقرہ۔ بائیں گڑھے اور پیٹ کی نالی میں دو کھن۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ لگی ہے۔ چھاتی۔ ران کے پر و نچھے اور ماسے دھونسنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

## تپکن والے درد

ادویہ۔ ایکونائٹ۔ بلاڈونا۔ براونیا۔ کولہ۔ کلکیریا۔ کارب۔ آئینشیا۔ نائٹریک ایسڈ۔

فاسفورس۔ پٹھلا۔ رشاکس۔ سر۔ سیپیا۔ سیلیشیا۔ شانی۔ سگریا۔

ایکونائٹ۔ جبکہ سر کی بائیں جانب اور کنپٹیوں میں تپکن ہو۔

کلکیریا۔ کارب۔ بھدورق۔ تپکن کا درد۔ پیشانی اور فرق سر کا درد۔ حرکت سے زیادہ ہوتا ہے۔

پٹھلا۔ دماغ۔ سر۔ پیشیا۔ دانت۔ کان اور پاؤں کے تلوؤں میں تپکن محسوس ہو۔

سیلیشیا۔ دماغ۔ دانت۔ مانٹھے اور کنپٹیوں کی تپکن کے لئے مفید ہے۔

اگر مذکورہ بالا ادویہ میں کے موافق نہ ہوں۔ تو ذیل کی ادویات متعلی ہوتی ہیں۔

بلاڈونا۔ دماغی رگور۔ دماغ۔ دانت۔ معدہ۔ رحم اور پستانوں میں تپکن۔ اگرچہ عام تپکن والے



دردوں میں اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ علامت ایسی بوضاحت نہیں ہوتی جیسی کہ مذکورہ بالا ادویہ میں موجود ہے۔ یہ صرف اسی حالت میں مفید پڑتی ہے جب بقیہ علامات ادویہ بھی پائے جاتے ہوں۔

براہونیا۔ تمام جسم میں تپکن موجود ہو۔ چند یا میں درد۔  
 کیمو ملا۔ نصف دماغ اور گلے کے پچھلے حصے میں درد۔  
 اگنیثیا۔ دائیں طرف کنپٹی۔ پیشانی اور پشت سر میں تپکن والا درد۔  
 ناعظمک ایسٹر۔ سر کی بائیں جانب تپکن والا درد۔ کان۔ گدی۔ دانت اور معدہ میں درد۔  
 رساکس۔ قعر معدہ میں تپکن۔ کنپٹی میں یا ایسا درد جو جھڑوں اور دانتوں کے کنپٹی تک پہنچتا ہو۔ بائیں شانہ اور ماتھے میں درد۔  
 شانی سیکریا۔ کنپٹی اور دانتوں سے آنکھوں کی طرف آتا ہوا تپکن والا درد۔  
 سلفر پشتر میں بائیں جانب ہاتھ۔ دانت مسوڑھوں۔ منقہ اور منقرے میں درد۔  
 تپکن کے ساتھ۔

## نشئی درد

ادویہ۔ بلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ ڈیجی ٹلیس۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ فاسفورک ایسٹر۔  
 پٹلا۔ سلفر۔ شانی سکر۔ یا۔ زنکم۔  
 فاسفورک ایسٹر۔ جوڑوں۔ بازو۔ کلائی۔ سینہ۔ معدہ۔ پیٹ وغیرہ تشنج کیلئے مفید ہے۔  
 پٹلا۔ معدہ اور سینہ میں تشنجی درد۔ دائیں ٹانگ میں جو گھٹنے سے شروع ہو کر کوئے تک جاتے۔ قعر معدہ۔ پیٹ۔ رانوں میں درد۔  
 مفصلہ ذیل ادویات میں تشنجی درد بلحاظ اہمیت کے دوسرے درجہ پر شمار ہوتا ہے۔  
 بلاڈونا۔ جھڑوں میں تشنج۔ ایسا دپیٹ اور معدہ میں پھیرے لیٹنے سے آرام پاتا ہے۔ اور پیچھے جھکنے سے دایر ہوتا ہے۔ اور عضلات کا تشنج بھی اسی دوائی کے تحت میں ہے۔  
 کلکیریا کارب۔ پھونچے۔ ہاتھ۔ پاؤں اور لاتوں میں تشنج۔ معدہ اور اس کے اطراف میں تشنجی درد جس کے ساتھ اختلاف بھی موجود ہو۔  
 ڈیجی ٹلیس۔ سینہ۔ پیٹ اور شانہ میں تشنج۔



پیشتر مہیور حیض شروع ہوتے وقت پیٹ میں تشنجی درد۔ در دقو لہج جو درد زہ کے تشابہ ہو۔  
یہ درد پاخانہ ہونے کے بعد بڑھتا ہے۔ اور ہول کے خارج ہونے سے کم ہوتا ہے۔ بازو۔ ماتھ۔ انگلیوں  
انگوٹھے۔ لاتوں۔ پنڈلیوں اور پاؤں میں درد ہوتا ہے +  
فاسفورس۔ خضیوں۔ معدہ۔ مقعد۔ پنڈلیوں۔ شانوں کے درمیان اور سر کے بائیں جانب

تشنجی درد۔  
سٹافی سگریا۔ پیٹ۔ دائیں گھٹنے کے جوڑ اور انگلیوں کے پہلے جوڑوں میں تشنج اور درد۔  
سلفر۔ معدہ۔ سینہ میں تشنجی درد۔ چوے درمیان انگلی۔ ٹانگ۔ رین۔ پنڈلی تیلوے اور پاؤں  
کے پنجے میں انٹھن۔

ترکیم۔ مقام معدہ۔ جگر۔ اطراف پیٹ۔ ناف۔ گلو۔ مثانہ اور سینے سے معدے تک درد اور  
تشنج۔ رانوں۔ پنڈلیوں اور بائیں پاؤں اور پٹھوں میں انٹھن۔

## ٹیکس مارنے والا درد

ادویہ۔ بلاڈونا۔ برائیونیا۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹکم۔ اگنیشیا ایکس و امیکا۔ نائٹریک ایسڈ  
سیپیا۔ سیلیشیا۔

بلاڈونا۔ درد شقیقہ۔ دائیں کنپٹی۔ ناک کے اوپر۔ پشت سر۔ دماغ کی کنپٹیوں کی جانب آنکھیں  
یاد آئیں آنکھ کے اوپر۔ سینہ۔ معدہ۔ پیٹ اور اطراف معدہ میں ٹیکس مارنے والا درد۔  
برائیونیا۔ پیشانی۔ آنکھ۔ گلو۔ معدہ میں دائیں جانب۔ بائیں آنکھ کے اوپر اور سر سے باہر  
کی جانب رجوع کرتا ہوا ٹیکس مارنے والا درد۔

کلکیریا کارب۔ معدہ اور سر میں ٹیکس مارنے والا درد محسوس ہوتا ہے۔  
کاسٹکم۔ ماتھے۔ کمر۔ مقعد۔ معدہ۔ کان اور کولے میں ٹیکس کے ساتھ درد ہو۔  
اگنیشیا۔ ناک کی جوڑا پر تلتی۔ معدہ اور مقعد میں ٹیکس کا پڑنا اور درد کا ہونا۔  
نکس و امیکا۔ چندیا۔ پیشانی۔ آنکھ۔ معدہ۔ جگر سے سینہ اور سر کی جانب مثانہ۔ صفحہ۔  
اور قعر معدہ میں درد اور ٹیکس۔

نائٹریک ایسڈ۔ دماغ کے وسط پیشانی چشم۔ گلو۔ معدہ۔ مقعد اور کمر میں درد اور ہوک کا اٹھنا  
سیپیا۔ پیشانی۔ جگر۔ معدہ اور سینہ میں درد کا اٹھنا۔ حرارت خون کے باعث جسم میں ٹیکس کا



ٹیس کا احساس جو عموماً زیادہ ہوتا ہے۔  
 سلیشیا۔ پشت بسر اور پیشانی میں ٹیس مارنے والا درد جو دبانے سے کم ہوتا ہے۔ آنکھ بعد  
 اور سینہ میں ٹیس مارنے والا درد +

## چند ہدایات

ناظرین اور طلباء کی سہولت کے لئے اس جگہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا علامات  
 کو حفظ کرنے اور ان سے مستفید ہونے کے لئے چند ہدایات دیج کر دی جائیں تاکہ انتخاب دوائی  
 اور باقاعدہ علاج میں ان سے کافی مدد حاصل ہو سکے +  
 سب سے مقدم اور ضروری بات یہ ہے کہ ادویات جو مذکورہ بالا عنوانوں کے تحت ہیں لکھی گئی ہیں  
 حفظ کر لینی چاہئیں جس وقت یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر ان ادویات کے جداگانہ علامات بھی  
 یاد کر لئے جائیں تاکہ ادویات مختلفہ میں تمیز ہو سکے۔ اس تھوڑی سی محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزانہ  
 استعمال اور حادث امراض کے لئے دوائی کا تجویز کرنا چند انشکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد ادویات کی نسبت  
 علم کو وسیع کرنے کے لئے مخزن الادویات کے مطالعہ کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر ہر روز تھوڑا سا وقت  
 اس کے مطالعہ میں صرف کر دیا جائے تو اندک مدت میں کافی علم الادویہ حاصل ہو جائے گا۔ باقی کی  
 ادویات کو یاد کرنے کے لئے اسی تدبیر کو عمل میں لانا چاہئے کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ادویات  
 کو حفظ کرنے کا نہیں +



# چالیس تیر ہدف ادویات

معد

## علامات عمومیہ و مخصوصہ

ACONITE

ایکونایت

امراض و تاثرات

من و دماغ

اعصاب (حسیہ)

قلب } شریان  
دورہ خون

پھیپھڑیاں } پھیپھڑیاں

جوڑے اعضا

پھیپھڑیاں

اشتداد مرض

خوف سے

جذبات کے بھڑکنے سے

صدے سے

روح کے جانے سے

سردی لگنے سے

سردی اور خشک ہوا سے

پیشینوں میں ہوا لگ جانے سے

شور سے۔ روشنی سے۔ دانت نکلنے کے دوران میں

بوقت شب۔ رات کے پہلے حصے میں نصف شب تک

پہلو پر لیٹنے سے

انحطاط مرض

کھلی ہوا میں۔ یا آرام سے لیٹنے سے

گرم پینے آنے سے

علامات مضبوط جسم۔ محنت پسند عادت اچانک نہایت تیز دردناک اثرات۔ تناؤ۔ انجماد اکثر مرگی کا سا۔ نظام اعضا اور دیکھو۔ نظام میں جوش سوزش چمکدار سرخ خون کا اخراج۔ عضو بے حس۔ بڑا یا جلتا ہوا محسوس ہو۔ چھن ہو۔ کثیر پے رنگتے ہوئے معلوم دیں۔ درد کے بعد بے حس ہو جائے۔ عصبی درد۔ خوف۔ فکر۔ سخت جان کا خوف۔ موت کا۔ ہجوم کا۔ درد کے مارے عت بے چینی۔ خوف کے ساتھ چھین مارتا ہو۔ اپنی مٹھیاں چباتا ہو۔ کاٹتا ہو۔ ناخن کاٹتا ہو۔ (آر سکم) مرنے کی خواہش۔ مرنے کی پیشین گوئی کرے۔ اور کہے کہ



دوبس میں بارہ بجے تک مر جاؤنگا۔ یہ ایسی خاص علامتیں ہیں جو سولے ایکونائٹ کے اور کسی دوا میں نہیں پائی جاتیں۔ نہایت تیز جس ہو جائے۔ سر بھاری ہو۔ چھینکیں بہت تیز ہوں۔ ماتھا اور آنکھیں پٹی جاتی ہوں۔ نہیں پیشانی میں ترپ ہو دوائیں اینٹم ٹارٹ۔ گینٹیا۔ بیلاڈونا، دروین پیشاب بہت آئے۔ پتیلیوں میں جلن ہو گولی سی لگے۔ ناک بے حس ہو۔ (بیلاڈونا۔ میڈورٹنیم) ناک سے گرم پانی خارج ہو۔ نہایت منقہ دکھائی دے (پنچیا) گرم اور سرخ رخسار۔ اٹھنے کے وقت چہرے پر زردی۔ غشی۔ دانت میں درد۔ ہر ایک چیز کا ذائقہ تلخ۔ پانی بڑ لگے۔ نکلنے ہوئے گلے میں اٹکے۔ جلانے والی پیاس۔ ترشی یا میٹیر کی خواہش۔ برف سے پت کی یا خون آلود تھے۔ خالص خون کے دست بھاگدار۔ دستوں کا رنگ سبز گھاس کی مانند ہوتا ہے یا سفید۔ جب دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوں (ڈونکمارا) مرکبوس کارپیش۔ متعین کھلج۔ کچھ چپکا ہوا سامحوس ہو پیشاب ترک جانے لگے۔ کم آئے۔ سرخ خون کے سے رنگ کا ہو۔ تکلیف دہ ہو۔ حیض یکا یک ترک گیا ہو۔ سانس جلدی جلدی آئے فکر آلود ہو۔ سختی سے آئے۔ اٹکے کر سیدھا بیٹھ جانا پڑے کھانسی خشک تکلیف دہ۔ گلا بیٹھا ہوا۔ کھانسنے کھانسنے گلا پکڑے۔ رات کو یا کچھ پینے سے۔ چھاتی کی طرف خون کا تیز دورہ۔ نمونہ۔ چھاتی میں در کی چپکن۔ پلوریسی۔ دل کی سوزش کا احساس۔ ہول دل۔ یا اس بازو میں درد نیچے کی طرف کو جانے۔ انگلیوں کی لوکیں سرخ ہوں۔ نا انگلیں بے طاقت۔ سوزش چمکدار اور سرخ جلد گرم و خشک۔ برف کا سا پانی گزرتا ہوا محسوس ہو۔ بے خوابی اور بے صبری۔ نبض تیز پر طاقت اچھلتی ہوئی۔ یا تار کی مانند پتلی۔ شریانوں میں تناؤ۔ دوریٹرم (ور) سردی۔ لہریں سی اٹھیں کبھی گرمی لگے کبھی سردی۔ بخار بہت تیز۔ درجہ حرارت بہت بلند۔ خشکی۔ جلانے والی گرمی۔ پوٹوں۔ ناک میں گلے میں پھیپھڑوں پر۔ پسلیوں پر۔ کپڑا اتار کر پھینکے۔

ایکونائٹ امراض بخار۔ نمونیا اور در و درج کے آغاز میں دیا جاتا ہے۔ حیض میں جبکہ خون درد سے اور قلت سے آتا ہو +

خوراک دوا اور طاقت استعمال :- ۳۰۔ ۳۰۔ ۳۰۔ اور اعلیٰ طاقت کی ادویات جب امراض حسیہ ہوں۔ انجماد خون میں ۳۰ یا ۳۰ کا۔ اور جب حواس حسہ ماؤف ہوں تو ۲۰ یا ۳۰ سے بھی زیادہ طاقت کا۔ مدت اثر تین ہفتے تک۔

ممد و معاون ادویات۔ آرنیکا۔ بیلاڈونا۔ برائیونیہ۔ کوفیا۔ سیلیفولیم۔ فاسفورس۔ پنچیا۔ سلفر۔ ادویات متعلقہ۔ بیلاڈونا۔ کوفیہ + فاواثر۔ دے بھار (سرک)

نوٹ :- اضافہ و افادہ امراض کے نشانات جو اس کتاب میں درج ہیں۔ انگریزی نشانات کے متضاد ہیں۔ کیونکہ اردو طریقہ بھی انگریزی کے متضاد ہے۔ مثلاً نشان ۱۰ سے مراد ہے کئی مرضی اور نشان ۱۰ سے مراد ہے زیادتی مرض۔



ARINCA

## آرینکا

## امراض و تاثرات

خون

شریان و ورید خون

اعصاب

عضلات

قولے باطنہ

## اشتداد مرض

خراش

چوٹ سے { صدمے سے - دھماکے سے -  
محنت سے - موج سے -

چھو جانے سے - خواب کے بعد -

حرکت سے - بڑھاپے سے یا شراب نوشی سے

اخطاط مرض کے

لیٹنے سے بستر چا کر گرنے سے (ویریم ویرم) یا ٹکرائی لینے سے

علامات سخت درد ہو خراش یا زخم تمام جسم میں - کسی حصہ سے اخراج خون یا درد کے بعد دھرم  
خاس، کچلے جانے جیسا درد - بستر سخت معلوم ہو - یا اس میں گولے سے ٹھیکیں بعد کی پشت میں ایک گولہ  
سامحوس ہو - درواچانک ایک جوڑے سے دوسرے میں چلا جاوے کو کچم، یا فالج کا سادرد - ذالقد سانس  
پاقانہ وغیرہ بدبودار میعاد بخاریں سرایت نہ ہو جانے سے - سیلان خون کی رغبت - غیر ارادی  
اخراج - اعصابی و پڑ اتید مزاج - خوف چوٹ لگنے کا - بیماری کا - فوری موت کا - بیداری کے بعد رنج  
اداسی - نفرت جسمانی - بے صبری - تکلیف - مگر یہ کہ مجھے کچھ تکلیف نہیں (اوپیم) آہستہ آہستہ کوشش سے  
جواب دے - دماغ ٹھکا ہوا معلوم دے - بستر پر کھڑے - غنودگی معلوم دے - جواب دینے کے ساتھ  
ہی ساتھ خواب ماری ہو جائے - آنکھیں خون آلود سرخ ہوں - بخاریں خون جیسی سرخی زبان کے  
وسط کے نیچے سرخ دھاریاں - حلق میں زکام کا گرتا پیٹ سے نیچے کی طرف تھوچ - بدبودار دست - گرمی میں  
کئے جیسا احساس پیشاب رک جائے - بوند بوند کر کے خارج ہو - وضع حمل کے بعد درد - دردوں کے بعد درد  
پلانے سے - گلا پر گیا ہو - محنت سے - سردی سے - پانی میں بھگنے سے - کھانسی بیداری کے بعد رونے  
لگے پستان کے نچلے حصہ پر بھاری ہن - گھنڈیوں پر زخم بازو میں درد لٹکانے سے - دل کی دھڑکن تمام جسم کو ہلاک  
دل کے عضلات کمزور ہو جائیں - ہر جگہ ذرا سی چوٹ لگ جانے سے کالا یا سرخ نشان پڑ جائے - سرخ باد -  
پتی یا چھپاکی - چوٹے پھوٹے - نہایت تکلیف دہ ہا سے یا چھوٹے چھوٹے - غنودگی  
تکلیف دہ - اور خوف پیدا کرنے والا خواب - ذکر کر بیدار ہو جائے - کروٹ کی طرف ٹھنڈی - سردی لگنے  
کے دوران میں پیاس - سرگرم اور جسم ٹھنڈا - چہرہ میں خون کا جمود - دکھ میں مٹے ہوئے اندھے کی سی  
بدبودار مریض ہر شے سے خوف کھاتا ہے کہ کہیں اس کی موت نہ ہو جائے - یا اسے کوئی چھو نہ جائے +



مقدار خوراک - طاقت - ۳x سے ۳۰ یا زائد۔

مدت اثر - دو ہفتہ۔

ممدادویات - ایکونائٹ - کلکیریا کرب - نیٹریم سلف - سوراٹنٹم - رس ٹاکس - سلفورک ایسڈ  
قاد اثر - کیمفر۔

متعلقہ ادویات - بلاڈونا - ایکنیشیا - میسرپسلف - رسٹاکس +

سنگھیا

ARSENICUM

آرسینکیم

اشتداد مرض

ٹھنڈے { خوراک - مشروبات برف ہو اسے  
ٹھیک وقت پر نصف شب بعد منہ صبح کے بعد  
ایک خاص زمانہ یا وقت کے بعد شلا ہفتے عشرے ماہ  
یا سال کے بعد  
سبزیوں کے استعمال سے پانی پینے سے  
بکثرت شراب پینے سے  
دوبائی اثر سے - خراب گوشت سے -  
نکالوں یا پھوڑے پھنیوں سے جو رشود ناساختہ ہوئے  
کونین کے بکثرت استعمال سے  
ایک کروٹ بیٹے رہنے سے  
شبا کو نوشی سے - زیادہ محنت سے

انحطاط مرض

گرمی سے { رشک - سینک سے - خوراک سے -  
اٹھنے پھرنے یا اوڑھنے سے -  
حرکت سے یا چلنے پھرنے سے  
سر کو اٹھا رکھنے سے - شیدھا بیٹھنے سے  
اجاب کی صحبت میں بیٹھنے سے -

امراض و تاثرات

لعاب دار جھلیاں - من تنفس

پھیپھڑے - با مخصوص دایاں پھیپھڑا

خون - دل - اعصاب

تلی

اعصاب - جلد

اعضاء مخصوصہ

علامات - یک لخت اور نہایت تیز اثرات سخت درد دیوانہ کر دینے والا - آگ جیسی جلن والا -  
بہت بے چینی ہو گرم سوئیاں چھیں بد مزاجی بڑھتی جائے رسی سی فیوگما یا یکا یک کمزوری بیزی  
سے سوکھتا جائے - بیکزوری ہو - جلن پیدا کرنے والے قلیل المقدار پتلے اخراج - ناک سے پانی - تنوکا -



پینے وغیرہ مشرب ہوئے مردار مادے کی بوند و بھری ہوئی پھیلی جیسی سوزش۔ پانی کا انجماد۔ خون کی کمی  
 رات کو موت کا خوف۔ صحت سے مایوسی ہو۔ مگر زندگی سے سیری ظاہر کرے۔ اپنے جسم پر تشدد و وار کھے  
 بال نوچے۔ ناخن کاٹے۔ خود کشی کرنا چاہے۔ سر کی طرف خون کا دورہ لے ٹھنڈے مگر عصبانی درد لے گرمی سے کبھی  
 سر میں درد ہو کبھی پیٹ میں یا جسم میں۔ بانیں آنکھ کے اوپر درد ہو۔ سر بے چین رہے۔ بال جلد سفید ہو جائیں۔  
 گرنے لگیں۔ پوٹے کچے جائیں۔ گرم گرم جلتے ہوئے آنسو میں۔ بادی سے آنکھیں دکھیں۔ سردی سے زخم پڑ جائیں  
 ناک میں چھٹکیں بہت آئیں جلن پیدا کرنے والا پانی ناک سے بہے۔ لیکن پھر بھی ناک رُکی رہے۔ بخار ہو۔ تیمار  
 داروں کا تصور رکھائے۔ آسانی سے رکام ہو جائے۔ خوراک کی بوسے۔ دیکھنے سے بلکہ اس کے خیال سے  
 نفرت۔ چہرہ درد۔ گھسا ہوا سا۔ ہڈیاں نکلی ہوئی اور لیٹھا ہوا سا۔ ٹھنڈے پیہم آئیں۔ ہونٹ کالے پڑ جائیں۔ رات  
 کو دانتوں میں درد ہو۔ سخت نہ بچنے والی پیاس لگے۔ ٹھنڈے اور برف کے پانی کی خواہش۔  
 لیکن پانی پینے سے معدہ خراب ہو۔ دُکس دُتے آجائے۔ تھوڑا تھوڑا اور بار بار پانی پیئے  
 ڈکائیں بہت آئیں۔ تپتی پرسوزش۔ تپے اور دست۔ بد بو عارچاؤوں کی بچ جیسے۔ مقدار میں کم۔ جلن پیدا کرنے والے  
 سیاہ لعاب وارد دست۔ ٹھنڈے مشروبات سے۔ پیشاب کم۔ سیلان الرم۔ اخراج بکثرت۔ اور طبع پیدا کرنے والا  
 کھانسی خشک۔ رات کو کچھ پینے سے۔ دل کمزور۔ کپکپاتا ہوا۔ دھڑکتا ہوا۔ ذرا سی وجہ سے سانس چھوٹا  
 اور جلد جلد آٹے۔ ناک میں معلوم دے۔ لے بیٹھنے سے۔ اوپر چڑھتے ہوئے پیام بھاتے ہوئے  
 ٹٹکالے (دلے۔ پھلیاں وغیرہ) جلدی یا اندرونی شکایات باری باری سے جلد افسردہ۔ روکھی۔ خشک۔ میلی  
 پیام بھاتی ہوئی۔ اکڑ یا فاش۔ یکجائی پھلیاں۔ پھلیاں کھانے کے بعد۔ زخم پڑ جانے کی رغبت۔ جلن ہوتی رہے۔  
 میند لیٹتے ہی اُچٹ جاتے۔ بے چینی۔ موت کے خواب۔ سردی بیرونی و اندرونی۔ جلن والی  
 گرمی جگہ جگہ۔ نہایت تیز جس لے کھلی ہوا میں (اور مہیٹ) لرزہ بے قاعدہ۔ ملا دینے والا۔ گرم مشروبات کی خواہش  
 سانس تک بھی نہ لے کے گرمی ایسا محسوس ہو گویا رگوں میں گرم پانی دوڑ رہا ہے یا ان میں لگ لگ ہی ہے چھاتی  
 میں جلن یا ٹھنڈ دہرائی لیکسیس۔ نیٹرم میو۔ سلفر۔ پینہ نہ بچنے والی پیاس کے ساتھ۔ سردی یا غشی +

خوراک دوا اور طاقت و استعمال - ۳۴ - ۳۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰۰

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ ایلم سیپا۔ کاربودیج لیکسیس نیٹرم سلف۔ فاسفورس۔ پاشلا۔ سلفر نیٹیو جوا

ادویات متعلقہ۔ سلفیوک ایسڈ۔ ویرا ٹرم ایلب۔

فادائثر۔ اوپیم۔ کاربودیج۔ چائنا۔ اسپر سلف نکس وایبکا۔



## ایلیس

امراض و تاثرات

آنکھیں

خانہ دار ریشہ جات } خلق  
خصیۃ الرحم

خلائے آبی

جلد

گردہ مثانہ

اعصاب تنفس

دل - خون

بائیں جانب - دائیں سے بائیں جانب کو

## APIS شہد کی مکھی

اشتداد مرض &gt;

گرمی سے } گرمیوں میں  
پینے سے } آگ سے  
بستر پر }چھوٹے سے - نیند کے بعد - ہم بچے بعد دوپہر  
دبانے سے - اخراج مولو (پھنسی پھوڑے) دب جانے سے

انحطاط مرض

ٹھنڈے سے } ہوا سے جل سے  
کپڑا اتر جانے سے }قدرے بلغم خارج ہو جانے سے  
حرکت سے -

علامات :- تیز عملہ - اچانک تیز چپخیں - یا ایسا درد جس سے چپخیں نکلیں - گھبراہٹ - سوزش  
تیز جستی در دہیں تیز ڈنگ سا چھبھتا ہو یا زخم سے چھلتا ہوا احساس دماغ میں - پیٹ میں  
نلوں میں بٹانے میں - پھولا ہوا - چمکدار - جلن - خارش - دبائی اثر - سوزش - سختی - چڑچڑاہٹ - جوش -  
جھکڑاؤ - پریشان - لا پرواہ - بات بھول جانے - چیزیں بھینکتا پھرے - یکایک چرتی ہوئی چپخیں  
مارنے لگے - سردی سے - خیر سا چلے - یا مکاسلگے - کن پٹی میں - سر اور ہر آدھڑ گھمائے  
بے حس - تھکان کا سرد درد کے دبانے سے - بال درد کرتے ہوں - سر میں پینہ آئے - آنکھیں سوجی ہوں  
پونے پانی کے تھیلے بن رہے ہوں - سرخ ہوں - گرم گرم پانی ہے - روشنی سے خوف لگے - بھینگا پن - نظر  
ند آئے - پاخانہ آنے سے سرخ - چہرہ سوجا ہوا یا سرخ - آنکھوں کے گرد - مومی زردی - ناک  
ٹھنڈی - سرخ چہرہ یا زبان - دانت کٹکٹائے - زبان کی کوک پر پھلے - سوزش - جلی ہوئی سی - چمکدار  
ٹھنڈی چیزوں سے - مسوڑے سرخ - ایڈیپسیا (Adiposa) المرزہ کے دوران میں پیاس - سنہری زرد  
یا مٹاڑ کے گودے جیسے دست - بے بو - تحریک سے - مقعد میں تکلیف - سوزش - خون رے سے  
یا کھلی رہے - پیشاب جلتا ہوا آئے - کم - بدبودار - پسے ہوئے تھوے جیسے فدا ت - خصیۃ الرحم بے حس -



دائیں جانب پھوٹا۔ آغاز شباس میں پُر درد اسراج حیض سانس لینے کے لئے مانپنا۔ یہ احساس گویا یہ سانس آخری ہوگا۔ ہوا کی ٹھوک۔ دل میں چپک۔ پیچے کے کونے۔ (Apix) سے پیچے کو جلانے حرکت تمام جسم کو ہلا ڈالے۔ ماتہ اور پیر سو جائیں۔ ہتھیلیاں چلیں۔ ناخن ڈھیلے محسوس ہوں۔ جلد گلابی سرخ۔ تیز جس۔ ٹہنیاں کھردری۔ ڈنک جیسے دھتے۔ زرد بڑی پتی۔ چھپا کی سرخ دھتھر۔ خشک۔ گرم جلد ہو باری سے پسینہ آئے۔ غنودگی۔ مگر بہت گجھا ہٹ۔ جب گرمی ہو۔ چلا پڑے۔ کپڑے لات مار کر انار دے بیض کمزور تیز۔ لرزہ۔ کپڑے اتار نیکی خواہش کبھی گرمی لگے۔ کبھی سردی۔ دائیں جانب چلا لئے والی گرمی۔ لیکن ٹھنڈ معلوم دے جوش میں آنے پر بغیر پیاس کے۔ چار بجے۔ بعد دوپہر۔ ایک حصہ میں گرمی دوسرے میں سردی۔ پسینے کی افراط۔ کسی کسی حصے میں۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال ۱۰۰-۵-۲۰۰-۶-۳۸ مدت اثر و دین مہنتے۔

ممد و معاون ادویات۔ آرنیکا۔ آرسنک۔ بیرنٹاکارب۔ سیلی پور مرکبوس سائنٹائلس نیٹرم میو۔ پلسٹلا۔

ادویہ متعلقہ۔ آرسنک کینتھیرس۔ پلسٹلا۔ اڑیکا۔ مخالف ادویہ۔ رہس ٹاکس۔

کچا سمرہ

NTIMONIUM CRUI

اشتداد مرض

سردی سے } غسل سے  
سردی سے } نہی سے  
سردی سے } سرد پانی ڈالنے سے  
زیادہ کھانے سے۔ تڑشی سے

گرمی سے } پسینوں سے  
گرمی سے } موسم گرمیاں میں سورج کی گرمی سے  
گرمی سے } گرمی کی کثرت سے  
آگ تاپنے سے۔ آگ کی چمک سے

ایڈی مونیم کروڈ

امراض و تاثرات

معدہ  
نظام انہضام  
دلغ  
جلد  
پہلو بدلتا

علامات :- ثقیل اور زیادہ خوراک کھانے والوں کو۔ گٹھلیوں اور کانٹھوں (سندوں)



سے چڑ دست آئیں۔ جڑی بڑی ڈکاریں آئیں۔ دماغی پریشانی اور جلدی خرابی کی علامتیں  
 نمودار ہوں۔ سیلانِ گرم ہو۔ جلد۔ ناخن وغیرہ خراب ہوں۔ درد نہ ہو۔ عھقے اور منہ کے گوشے پھٹ جائیں  
 (ایمیر وینیم) فریب۔ ترشرو۔ چڑچڑاہو۔ رونے لگے۔ جب اس کی طرف دیکھا جائے۔ چھو جائے  
 (سٹریمونیم) یا ہلایا دھلایا جائے۔ نفرت ہو۔ زندگی سے۔ خوراک سے بہت خوش رہے۔ خواب سے  
 دیکھا کرے۔ جذبات کے زیر اثر ہو۔ جلد کھردری اور نرم ہو۔ منہ کے گرد پھنسیاں۔ زبان سفیدی  
 جیسی سفید ہو۔ آرسنکیم سمجھ۔ برائی۔ کالی میو۔ فاسفورس اٹن میں چھائے ہوں۔ پیاس نہ ہو۔  
 ماضیہ خراب ہو۔ کھانے کے بعد بھی خوراک کا مزہ۔ یا ویسی ہی فوکاریں آتی رہیں۔ قے ہو۔ کھانے پانی  
 سے جی مائل نہ کرے (شیلیدونیم)۔ تے آنے سے بھی آرام نہ پڑے۔ پیٹ بھر بھر معلوم ہو۔ دست  
 پتنے پانی جیسے سڈے ملے ہوئے۔ معدہ دبانے سے درد معلوم ہو۔ انگلیوں کے جوڑوں میں گٹھیا  
 سادہ ہو۔ آواز پر قابو نہ ہو۔ بولنے سے کھانسی بہت تیز۔ ہر ایک دورہ پہلے سے کم ہو۔ ناخن پھٹے  
 ہوئے یا سینگوں جیسے موٹے۔ اندر ہی اندر بڑھتے جائیں۔ پھٹنے کی رغبت۔ انٹن۔ نہایت سخت پھیند  
 اور تھکاوٹ مٹی معلوم ہو۔ چہرہ پھٹا پھٹا ہو۔ جھریاں سی پڑی ہوں +  
 خوراک دوا اور طاقت استعمال۔ ۳۴-۶۴ سفوف  
 مدت اثر۔ پانچ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ سیلیا۔  
 ادویات متعلقہ۔ سلفر۔  
 فادرزہر۔ سپر سلفر۔



ANTIMONIUM TART

ایٹمی مونیم ٹارٹ

استند تو مرض

امراض و تاثرات

گرمی سے } گرم کرہ میں  
 گرمی سے } گرم کپڑا اوڑھنے سے  
 گرمی سے } گرم موسم میں  
 غصہ سے۔ لیٹنے سے  
 صبح کے وقت

ہوا کی نالی  
 پھیپھڑے  
 دل  
 دورہ خون  
 تنفس یا سانس



پیٹ انٹریاں

تینہ

کمر کے گرد

جلد

زیادہ کھانے سے

سردی سے - نئی سے

انحطاط مرض

بلغم کے اخراج سے

بٹھنے سے

حرکت سے

علامات :- غمگین رہے۔ رد عمل کی کمی۔ روز بروز کمزور ہوتا جائے۔ پسینہ بہت آئے  
 ڈھیلیا ہوتا جائے۔ جھلی سے زیادہ لعاب خارج ہوتا ہو۔ بوزھوں اور بچوں کے امراض میں  
 کارآمد۔ ماضیہ خراب ہونے والی شکایات میں۔ لاپرواہی۔ یا ترشروٹی۔ اپنے حال میں مست رہنا پسند کرتا ہو۔  
 چڑچڑاہو۔ گڑھٹا اور کراہتا رہے۔ آنکھ بند ہونے پر غفلت طاری ہو جائے (کینائس انڈیکا) پیشانی پر  
 کچھ گولاسا بننا ہو۔ نتھنوں میں کچھ دھواں سا جمنا ہے۔ یا پھٹ پھٹانے میں۔ درود چہرہ بیماریوں جیسا  
 نیلگوں یا اینٹھا ہوا سا چہرہ ٹھنڈے پسینے آتے ہوں۔ زبان پر سفیدی۔ ترش چیزوں کو پسند کرتا ہو۔  
 مگر وہ چیزیں مریض کی طبیعت کے مطابق نہ ہوں۔ ڈکاریں سرے انڈوں کی سی بو والی۔ جلی کی لہریں  
 سی اٹھتی ہوں۔ ٹھنڈا پسینہ آکر کمزوری پیدا کرے۔ دلویلیا۔ ویراژم الب، نندگی سے نفرت پا کر  
 زور سے تے آتی ہو۔ گزیت تیرائیں معدے میں ٹوہاؤ کا سا احساس۔ سانس چھوٹا آئے۔ دم گھٹے  
 باری باری سے کھانے پر چڑھا محسوس ہو کر دھسک اٹھے۔ ڈھیلی۔ کچی۔ گھگھر کر کے والی کھانسی  
 آتی ہو۔ چھاتی بھری بھری معلوم ہوتی ہو۔ لیکن کم از کم اٹھنی ہو۔ پھرنے ہو جائے یا نیند آجائے۔ (دھیمو زنا)  
 غصے کے وقت کھانے کے لئے بیٹھنا پڑے۔ پلور و لمونیا ہو۔ کمر میں سخت درد ہو۔ ڈاٹھلے سے حرکت  
 کرنے سے گوزاؤ ٹھنڈے پسینے زیادہ آئیں۔ بازو ہلتے رہیں۔ باری باری سے کھانسی اور جھانپاں آتی ہوں  
 مریض بہت شکایت کرے۔ بلغم گاڑھا خارج ہو۔ دل اور پیچھے پڑوں پر فلج کا سا اثر و سیراٹھا کارب  
 گرمی سے نیند آئے۔ جلد پسینے سے تر اٹھتی ہو۔ نیلے ولے دریں نمودار ہوں۔ حجام کے  
 آسترے سے پیدا ہونے والی خارش۔ بیض کی مناسک زور و ریتیز ہو +  
 خوراک دوا اور طاقت استعمال - ۳x و ۶x - سفوف - کم طاقت کی دوا بسا اوقات شروع  
 میں تکلیف بڑھاتی ہے۔ بعد میں آرام کرتی ہے۔

مدت آخر - دو ہفتے تک۔



مرد و معاون ادویات - بیراشاکارب -  
ادویات متعلقہ - ایونیاکارب - الیکلیپاس - ایکا - لوبیلیا - اوپیم -  
فادرہر - پلسلا - سیپیا -

BELLADONA

## بیلادونا

### امراض و تاثرات

اعصابی مرکز

خون کی نالیاں - بال جیسی باریک نہیں

آنکھ کی

لغاب دار } منہ کی

جھتی } حلق کی

جلد

اعضاء مخصوصہ

دائیں جانب کی تکالیف

### اشتداد مرض

سورج کی گرمی یا دھوپ سے

بعد دوپہر تقریباً تین بجے

ٹھنڈی ہوا لگنے سے - بال کٹوانے سے

سردی لگ جانے سے پسینہ ٹپک کرانے سے

روشنی سے شور و غل سے - دھماکے سے

چھوٹنے سے صحبت اجاب سے حرکت سے نیچے جھکنے سے

### اخطاط مرض

ہلکا کپڑا اوڑھنے سے

پچھلے کو جھکنے سے

بستر پر آرام کرنے سے

علامات - گردن و ذریعہ بدن - جبکہ تکلیف یک لخت اور تیز ہو - خشکی ہو - تیز سرخی ہو - خون کا دود

دھاسفوس گرمی اور جلن - نہایت تکلیف کے ساتھ سوزش ہو - انجماد خون ہو -

سر کی طرف - ترپنے اور چیرنے والا درد ہو - ٹھیر ٹھیر کر اور بار بار تکلیف دے گولے کی مانند

نکل جانے والی - یا نوچنے والی - دیوانگن - بار بار آنے والی دنا ٹرک بے شمار اخراج

قلیل و گرم - جھٹکے لگیں - تشنج اور لٹٹھن - گلے میں - رحم میں ضرورت سے جتنی زیادہ جتنی - جوش آجائے

وحشت آمیز سرسام کے مریض کا سا - پُر غضب - پُر شور - چلاتا رہے - بے چین ہو - جلد جلد

ہوے - بچ کر بھاگنا چاہے - غلط - سر میں نبض کی سی ٹرپ ڈکن پٹیں میں دھمکتے سے بل

کھولنے سے - دماغ میں لہریں سی اٹھتی و گرتی ہوئی معلوم دیں - سردی دے دے کہ مارے سر کے بال کچھ



درد دماغ - گولگ جانا - صدر نہ ہو - کوئی خیال دل میں پیچہ گیا ہو - جو بار بار ذہن میں آتا ہو - پتیلیاں پھیلی  
 ہوں - آنکھیں چمکتی ہوں - بڑی بڑی ہوں - سرخ ہوں - آنکھ بند کرنے سے خوفناک خواب دکھائی  
 دیں - اندھے پن کے دورے بعد میں زرد زرد نظر آئے - آنکھوں کے سامنے چمک سی ہو - روشنی سے خوف  
 ناک آگ جیسی گرم - دھندلا نظر آتا ہو - چہرہ گرم معلوم ہو - گلا اور حلق خشک اور گرم ہو - زانوں  
 رس ناکس، دانت میں درد ہو کے کاٹنے سے - زبان پر سوزش - زبان سرخ و سفید حتیٰ دار - نگلنے میں تکلیف  
 دم گھٹا جائے - گھونٹ گھونٹ اور اوپر سانس لے کر پانی پئے - لیونینڈ پینے کی خواہش بہت زبردست ہو -  
 یا بکر سے درد اٹھ کر کندھے اور گلے کی طرف جائے - درد والے پہلو پر لیٹنے سے - کوڑی کے پاس درد -  
 قویج - کاٹنے والا - پیچھے کو جھکنے سے - کلچ نکل آئے (آر سک) پاخانے میں اکھڑ یا کی سی گھٹلیاں - آواز گتے  
 کی بھونک سے مشابہ - پستان سرخ دھاریوں والی - گردن اور کندھے سخت - دائیں طرف شام کو پیشاب بیٹنے  
 سے بستر پر خارج ہو جائے - رات کو جلدی سے بہت سا - گرم دھاننا، حیض بکثرت اخراج کرک کرک پیشاب  
 کا رنگ گہرا سرخ ہو - کھانسی خشک ہو - کمر ٹوٹی ہوئی سی معلوم دے - جلد چمکدار اور سرخ ہو - سرخ دھبے  
 ہوں - پتی یا چھپاکی اچھل آئے - نیند آتی ہو مگر سونہ سکے - سوتے وقت جھٹکے سے لگیں خواب  
 خوفناک دکھائی دیں - مثلاً جنگ و جدل - آتش زدگی وغیرہ وغیرہ کے - سر گرم ہو - دیگر اعضا ٹھنڈے  
 ہوں - پسینہ گرم گرم آئے +

خوراک دو اور طاقت استعمال - ۱ - ۳۰ - ۲۰۰ - ۱۰۰۰ - شدید امراض میں خوراک دو اجلد جلد  
 دی جائے -

مدت اثر - تین ہفتے -

ممد و معاون ادویات - بوریس - کلکیر یا کارب - ہیمپسلفر - مرکبوریس - نیٹریم  
 ادویات متعلقہ - گلوٹیم - ٹائس مس - سٹریونیم -  
 فاذاثر - کیمفر - کوفیا - اوپیم - ایکونائٹ



BRYONIA

## برایونیا

امراض و تاثرات

خون

دورہ خون - جگر

سر کی  
رقیق مادہ خارج کرنیوالی جھلی سینہ کی  
جوڑوں کی  
لیپٹ کی

قوت پیدا کرنیوالے آلات جسم | اعصاب  
اعضات

دائیں جات

ایف (رقیق مادہ) پیدا کرنے والے

خانے دار ریشہ جات

اشتداد مرض  
اٹھنے سے  
جھکنے سے  
محنت سے  
حرکت سے  
کھانسنے سے  
اگر اسانس لینے سے  
گرم ہو جانے سے  
گرم کمرے میں  
گرمی سے  
گرم موسم میں  
گرم پینے سے  
گرم کھانا کھانے سے

سبزیوں کے استعمال سے

ترش اشیاء سے - کیلول کے استعمال سے

خفگی و بیزاری سے - چھوٹنے سے

اخراج رک جانے سے

سردی لگ جانے سے

اختطاط مرض سے

دباؤ سے | درد والے پہلو پر لیٹنے سے  
درد کی جگہ پٹی باندھنے سے

سردی سے - خاموشی سے - اگر کوئی طوبیہ  
گھٹنے اوپر کھینچ کر کٹھے رکھنے سے

سوزش والے مقام کو مینک دینے سے

علامات بد آہستہ آہستہ بڑھنے والے پر طاقت نکل - نہ دہنے والی لسنوں کی مقامی تکلیف - نہایت پروردہ



اثرات۔ کھانسنے پر بڑے زور کا درد ہو جس کے باعث مریض کو اپنا سر یا چھاتی وغیرہ پکڑنی پڑے۔ پھٹے جانے والی ٹیس کی سی تکلیف پیچھے کو جاتی ہوئی۔ ذرا سی بھی حرکت ناگوار معلوم ہو۔ خشک جھلی دار لعاب کا اخراج۔ قلیل اور چپکنے والا جمود۔ سوزش۔ برسنہ۔ سرخ دھاریاں سی ہونا۔ بالی پت کی قسم کی مریض تنہا رہنا پسند کرے۔ یا گھر جانا چاہے۔ سست رہے۔ اٹھنے وقت سر جھکائے بیہوش ہو جائے۔ سر میں سخت درد ہو۔ پھٹے جانے۔ چیرنے والے۔ کچلے جانے کا سا۔ یا بھاری پن محسوس ہو کن پٹیوں کے درمیان۔ سامنے پیشانی پر آٹھ ٹکھوں کی حرکت سے۔ ہائیں آنکھ سے اوپر درد ہو۔ بال بال درد کرتا ہو۔ چکنے بال ہوں۔ کھانسی ہو۔ پاخانے کے وقت کوشش کرنے سے پیٹیا زخمی سی محسوس ہوں۔ پیچھے درد ہو۔ چبانے کی حرکت سے نکیلا آنے سے بمنہ خشک ہو۔ زبان بہت خشک اور کھردری ہو۔ درمیان سے پھٹی۔ جڑ میں سرخ۔ صابن ملا ہوا سا تھوک خارج ہو۔ ذائقہ تلخ۔ پانی زیادہ پینے کی پیاس۔ پینے کی خواہش ہو مگر مزہ نہ آئے۔ نفرت ہو۔ جی اٹلائے۔ دائیں ہیلو پر لیٹنے سے۔ دھڑکن ہو۔ کوڑی پر نہمی ہو۔ معدے میں بوجھ محسوس ہو۔ جگر زخمی سا محسوس ہو۔ اس ہیلو لیٹنے سے۔ ایپینڈی سائٹس پاخانہ خشک۔ لمبا اور بہت سخت آتا ہو۔ جلا ہوا۔ قبض رہے۔ مٹھنے پر بال کر نکلنے والا دست۔ پتوں والی گوبی سے دموم گرم مایں۔ پاخانے کے بعد سخت آنوں کے نوٹھڑے خارج ہوں۔ کے ری پس پچور لیٹن لمبا اور گہرا سا لپٹنا چاہے مگر نہ سکے۔ اس سے کھانسی پیدا ہو۔ سخت درد والی خشک کھانسی۔ گویا معدے سے اٹھتی ہو۔ کھانے پینے سے خون آلود یا سخت بلغم۔ براکھاٹس۔ منہ۔ دائیں اچھاتی میں سخت درد ہو۔ دائیں جانب جیض سے پہلے پستان بہت سخت ہوں۔ مانگ اور کمر میں درد سے جھکنے پر۔ سر سام۔ سخت محنت کے خواب۔ نبض بھری ہوئی تیز اور سخت۔ خسرو نامکمل۔ یرقان۔ زکام۔ سردی سرگرم۔ چہرہ سرخ۔ دگر مکرے میں۔ جلا نیوالی خشک گرمی۔ تمام علامات ہیں۔ خون تک گرم ہو۔ تکلیف دہ مسلسل بخار۔ تب مزہ مسہر کام۔ اخراج دب جانے سے۔ خروش اور چکنا پسینہ آئے +

خوراک دوا اور طاقت استعمال ۱۰۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ ۱۰۰۰۔ امراض شدید میں کم طاقت کی دربابا

مدت اثر۔ دو ہفتہ۔

ممدو معاون ادویات۔ ایبرائے نم۔ ایلومی تیم۔ کالی کارب۔ لائیگو پو ڈیم رشاکس  
سیپیا۔ سلفر۔

ادویات متعلقہ۔ فائوٹیا۔ رس ٹاکس۔

فادافز۔ ایکونائٹ۔ کیمومیل۔ ٹکس وائیکا۔



# کلکیریا کارب یا کلکیریا اوسٹریم

CALCAREA CARB & CALCAREA OSTRUM

## امراض و تاثرات

غذائی رگوں کے انٹریکٹ

پرورش کے لئے  
ہڈی کی  
جلدی

خون

سینہ - دایاں پیچھے

دل

بچوں کے امراض

## استعداد مرض

خشک سرد ہوا سے

مرطوب ہوا سے

غسل کرنے سے

ٹھنڈے لگنے سے

تبدیلی موسم پر

دماغی محنت سے

جسمانی محنت و مشقت سے

چڑھنے سے

آنکھ پر زور پڑنے سے

بچوں کے دانت نکالتے وقت

شروع جوانی میں -

کپڑوں کے دباؤ سے

دودھ سے

بیداری سے - فکر سے -

علامات - موٹے اور گورے آدمیوں کی نکالیف جہنیں پسینہ بہت جلد آئے  
سر باچھاتی پر - سوتے ہوئے - بکثرت - اکثر ترش - بدبودار اخراج ہو - دست پسینہ  
تھوک وغیرہ - جسم سے ترش نکلے - گرم - کاپی آمیز - خذیر کے رنگوں کی سی عادات ہوں - اعضا  
سوجائیں - آسانی سے موج آجائے - سرد و مرطوب ہوا سے جسم کو ٹھنڈا کر دے - سردی جلد  
لگ جاتی ہو - خصوصاً چھاتی میں - ہڈیوں کی ساخت و نشوونما ٹھیک نہ ہو - بچوں کے  
دانت دیر سے نکلیں اور چلنا بھی دیر سے آئے - خذیر ہو - سوجھا مسان ہو - ہاتھ پاؤں ٹھہرے  
ہوں - پتھری پیدا ہونے کی رغبت ہو - آداس پریشان سا اور خشک و شبہ میں پھنسا ہوا رہتا ہو



بیماری و مصیبت سے اور زیادہ زیر نگاہ رہنے سے گھبرائے۔ دیوانگی کے سے آثار پائے جائیں (علیم  
مگر اضم - نکس و امیکا - سیپیا - وراثم الب، محتاط اور گھبرایا ہوا سارے الفاظ کا غلط استعمال  
کر جائے۔ اچانک اداس لاپرواہ اور مست ہو جائے۔ سر چکراتا ہو۔ دل ٹمکیں رہے۔ سر بڑا ہو۔  
نیز پیٹ بڑا اور سخت ہو۔ سر کی گرائی میں درد ہو۔ تڑپ ہو۔ اور درو کے مارے پھٹا جائے بیداری  
کے بعد چند یا کھجلائے۔ سوئی۔ بدبودار۔ پھیپھاس۔ دسلفر تیلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔  
آنکھ بند کر کے دیکھے۔ زکام رہے پیشاب زیادہ آئے۔ ناک اور اوپر کا ہونٹ سو جا ہوا ہو۔  
بیر اشاکارب۔ سلفر چہرہ زرد پھولا ہوا سا اور لیسہ دار ہو۔ حلق کے اندر کے غدود وٹو نسل، پھوٹے ہوئے  
ہوں۔ اندوں اور وئی خوراک کی خواہش ہو۔ گوشت سے نفرت ہو۔ تے میں ترش اور جھا ہوا ساد و دھ  
خارج ہو۔ (نیزم فاس)، معدہ الٹی طشتری جیسا ہو۔ ناف میں اینٹھن ہو۔ پت کی خرابی سے  
درد تو لہج ہو۔ دست کھڑیا کے یا بھوے رنگ کے (فاسفورک ایسڈ) یا سبز رنگ کے پتلے ہوں۔  
پیشاب بدبودار یا سخت ہو۔ اس میں سفید سفید ذرات ملتے ہوئے دکھائی دیں۔ فوطوں میں پانی اتر  
آیا ہو۔ سیلان الرحم۔ گاڑھا۔ دودھ جیسا۔ ناک رگ کر زور سے آنے والا خارج ہو۔ گلا بیٹھا ہوا ہو  
مگر تکلیف کچھ نہ ہو۔ کھانسی۔ شبکی دھک جیسی۔ بلغم ڈھیلی پیپ جیسی اور میٹھی ہو۔ دل کمزور ہو  
دھڑکن ہو۔ چھاتی میں جلن۔ حیض سے پہلے پستانوں میں جلن۔ گردن میں درد اور اٹھانے سے ہاتھ  
پھٹتے ہوں۔ غدود بڑھے ہوئے ہوں۔ (گردن کے) جلد سرد۔ سانپ جیسی۔ رات کو بڑبڑاتا  
ہو۔ نیند نہ آتی ہو۔ خیالات کی فراوانی بے چین رکھتی ہو۔ چند یا برف کی مانند سرد رہے سر پر  
ماٹھوں پر۔ گھٹنوں پر یا پیروں پر دلغ ہوں اور وہ سرد ہیں۔ لرزہ ہوا اور پیاس لگے۔ اندر گرمی معلوم  
دے اور یا ہر ت سرد ہو۔ پسینہ آئے۔ دماغی محنت سے سر گرم ہو جائے۔ ماٹھ چپ دار ہیں  
دسلفر، پسینہ۔ تھوڑا تھوڑا سر پر۔ کن پٹیوں پر۔ چھاتی پر۔ ماٹھوں پر۔ پیپر ٹھنڈے  
اور تر رہیں۔ پیشاب گاڑھا ہو۔

خوراک دوا۔ اور طاقت استعمال۔ ۶۴۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ ۱۰۰۰۔ یا زیادہ۔  
مدت اثر۔ پانچ ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ بیر اشاکارب۔ لائیکو پوڈیم۔ سلیشیا  
ادویات متعلقہ۔ بیر اشاکارب۔ سلیشیا۔ لجدیس۔ نائٹرک ایسڈ۔ سلفر۔  
فاو اثر۔ کیمفر۔ ایپی کوانا۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس۔



لکڑی کا کوئلہ

CARBO VEGETABLE'S

کاربو وِجی ٹیلیس

اشتداد مرض

گرمی سے  
خون نکلنے سے  
ٹھنڈ لگ جانے سے  
کمزور کر دینے والی بیماریوں سے  
پیری ہیں

مرغن غذا سے

امیرانہ زندگی سے

زیادہ بوجھ اٹھانے سے۔ کپڑوں کے بار سے

شدت گرمی و سردی سے

درجہ حرارت کی تبدیلی سے

رات کو ٹھنڈی ہوا سے

اکثر سے۔ رطوبت سے

سر پر ہوا لگنے سے

اخراج دہ جانے سے

انخطاط مرض

ڈکار آنے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے

پیراؤنچے رکھنے سے

امراض و تاثرات

لعاب دار جھلی { نظام انہضام  
معدہ

لسنوں میں  
دل { دورہ خون  
کن پٹی

علامات۔ غززدہ۔ سنجیدہ۔ بے اصولی یا جحتی اور فضول سوال و جواب کرنے والا۔  
رد عمل سے عاری ہو۔ یا صندی ہو۔ کمزوری۔ اچھا رہ۔ ہوا کی ٹھوک معصبت سی دیگر شکایتوں  
کے پیکپی۔ کمزوری جی متلائے۔ یکایک طاقت جواب دیدے۔ نبض چھٹ جائے  
بیوشی طاری ہو جائے۔ بے جان سا ہو جائے۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ جسم ٹھنڈا رہے۔ مگر  
بیمار کی یہ خواہش ہو کہ پنکھا ہوتا رہے۔ یا ٹھنڈے پانی کی پیاس ہو۔ رنگت پیلی پڑ جائے جلد بھلنے




لگے۔ زخم ہو جائے۔ خون جاری ہو۔ سیاہی مائل اخراج ضرورت سے زیادہ بکھرا ہوا معلوم دے۔  
 (Venosity) کاڑھے جلن پیدا کرنے والے اخراج دباؤ راسٹس، پھر نازک کام۔ بھاری درد  
 کرنے والی جلن۔ ہڈیوں میں زخموں میں۔ بے حسی رشت۔ متفکر اور زور و رنج۔ ناخوش ہر بھاری  
 معلوم دے۔ سرد درد کن پٹی۔ ضرورت سے زیادہ گرمی سے۔ لیٹنے سے۔ یا ٹوپی کے دباؤ سے۔  
 چھینکیں آتی ہوں۔ گلے میں خراش بھی ہو۔ ناک صاف کرنے سے یا پھینکیں آنے سے۔ سردی بچے کو حاتی  
 ہوئی معلوم دے۔ فاسفورس، مصیبت زدہ سا۔ مکارانہ۔ افسردہ چہرہ۔ اوپر کا ہونٹ ٹٹا ہوا۔  
 خنازیر۔ دانت ڈھیلے۔ منہ میں چھالے۔ چھوٹے چھوٹے چھالے۔ زبان میا۔ کھانے کے خیال سے  
 بھی نفرت ہو۔ ڈکار آئیں۔ بدبو دار۔ بلند آواز۔ کھانسی سمیت۔ بچہ اچھا رہ۔ رکھا ہوا پھولا ہوا  
 پیٹ کا اوپر والا حصہ دپٹلا ہر ایک خوراک ہو اپیدائرس۔ بد ہضمی۔ درد قوی۔ متعقد میں جلن۔  
 زخمی۔ گرم جلن۔ اندام نہانی میں سوزش۔ شام کو گلا بیٹھا ہو۔ دم روکنے والی کھانسی معہ سرد درد اور تے  
 کے۔ سرد مشروبات سے بہتر ہیں۔ گوز کے ساتھ بلغم خارج ہو۔ بھاری۔ زخمی یا کمزور چھاتی۔ تباہ کن دیرپا  
 امراض۔ پھیپھڑے کی تباہ کن بیماریاں سیم۔ فکر اور دوسٹر کن۔ پسلیاں زخمی سی۔ گویا کہ کمر میں بند لگا  
 ہے۔ کمزور انگلیاں۔ کھردری اور وجہ دار جلد خوفناک۔ خواب۔ سوت جیسی ریاریک نیض۔  
 کبھی گرمی۔ کبھی سردی۔ لرزہ۔ تپ جیسی سرد۔ زبان۔ گھٹنے۔ ٹانگیں۔ رات کو سانس بھر گرم  
 اعضا ٹھنڈے۔ اندرونی گرمی۔ جلانے والی دل میں۔ چھاتی پر۔ جلد تپ جیسی سرد۔ پسینے۔ پسینے  
 آسانی سے آجائیں۔ چہرے پر۔ کھانسی سے۔ معمولی خوراک بھی تکلیف دہ ہو۔ دل میں جلن رہے۔  
 دست آتے ہوں۔ ہڈیوں میں جلن اور سخت درد محسوس ہو۔ زبان۔ گھٹنے اور ٹانگیں رات کو برف  
 کی مانند سرد ہیں +

خوراک دو اور طاقت استعمال ۱x-۳x-۶x-۱۲x-۳۰-۲۰۰-۱۰۰۰۔ اور نائید۔

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

معدوم معاون ادویات۔ آرسینکیم چائنا۔ کالی کارب لیکسیس۔ فاسفورس۔  
 متعلقہ ادویات۔ گریفائٹس۔ کوپچکم۔ آرسینکیم۔ ایمونیا کارب۔ رتن۔  
 فاد اثر۔ بعد میں۔ کاسٹکم۔ نیٹرم میور +





## CANSTICUM

کاسٹیکم

امراض و تاثرات

اعصاب الحار

عضلات حلقوم

تنفس

جلد

دائیں جانب

چہرہ

استد امرض  
 سرد و خشک ہوا سے برطوب ہوا سے  
 ہوا سے آندھی سے ہوا کا جھونکا گئے سے  
 سخت سردی اور گرمی سے  
 جھکنے سے - اخراج رک جانے سے  
 کافی پینے سے ۳-۴ بجے صبح کو یا شام کو  
 محنت مشقت سے

اسخاط مرض  
 کچھ ٹھنڈی چیز پینے سے  
 دھونے سے

گرمی سے - اینترک

پہل قدمی سے - آہستہ حرکت سے

علامات - کمزوری - بے قابو ہو جانے کا برہم ہوا اشتیاء - لرزہ کھانا - آخر میں کسی ایک عضو پر فالج  
 جوڑوں کی سختی پھول کا شکڑنا - ہتھیلی کے دھیرم میور، ران کی لہروں کا - بد شکل ہونا - دہلا پن - کسی ایک  
 پٹھے میں جھٹکے سے لگنا - مرگی - بوقت شباب - کپکپی - جلن - درد - کھردرا پن - معلقوم میں متعقد میں -  
 دماغی تھکان - فکر آلود خطرات - دماغ میں محسوس ہوں - دھیرم سام - پیشانی کے نیچے دھیرم محسوس ہو - پلک چمکی جانے  
 بھاری محسوس ہوں آنکھوں میں درد برابر ہوتا رہے - دود کھائی دیش - دائیں طرف دیکھنے پر چیزیں بڑی  
 بڑی دکھائی دیں - مسکڑی ہوئی دکھائی دیں - کان میں سے میل بہت نکلے - کان میں گونج سنائی دے -  
 ناک کے پچھلے حصے پر پھنسیاں (Prosopalgia) ٹھنڈے پانی سے - چہرہ پر فالج و لفظوہ، گرمے  
 منہ کھولنے پر زبان کی جڑ میں - حلق میں - جھکنے سے - نکلنے کی کوشش کرے - غلط طور پر نکل جائے پھکنائی  
 طے ڈکار - جھکنے پر متعقد میں شنج - کھانتے کھانتے کا بیج نکل آئے - پاخانہ چمکے - شکل سے خارج ہو - کے کھڑے  
 ہو جانے سے پیشاب کی نالی بے حس بنانا - یا متعقد محسوس پاخانہ کے لئے دلیلو، بواسیر - چلنے سے سوزش  
 ہو - کھانتے کھانتے پیشاب خطا ہو جائے - بوند بوند کر کے یا آہستہ آہستہ خارج ہوئے بیٹھے  
 سے - دن میں حیض خارج ہو - رات کو سیلان الرحم - گلے کے گڑھے میں سننا ہٹ ہو کر کھانسی اٹھے دسیپا -



یابائیں حلقوم میں سپیم رات کو اور صبح خشک۔ کافی گرمی کھانسی نہ لے سکے (درم) کھوکھلے میں واپس پھسل جائے۔ بستر کی گرمی سے۔ جھکنے سے بھٹندی ہوا سے کے بھٹندے پانی کی چسکی سے۔ چکنا سا مشکل سے خارج ہونے والا بلغم۔ گلا پڑ جائے۔ صبح کے وقت جھکنے سے کے بات کرنے سے۔ حلقوم میں زخم۔ چھاتی میں زخم۔ واسکٹ تنگ محسوس ہو۔ اٹھنے پر گردن یا کمر میں سختی۔ درد آگے کی طرف یاران کی طرف جائے۔ نگلنے ہوئے ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ انگلیوں کی نوکیں پھٹ جائیں ہنڈیوں میں پیروں میں۔ یا پیروں کی انگلیوں میں شخ۔ گرمی جلن اور اس کا اثر۔ مسے بھوؤں پر۔ پوٹوں پر۔ ناک پر انگلیوں کی نوکوں پر۔ پانی۔ خون۔ زخم۔ سردی سے نہ ہو گرمی سے پیدا کیے۔ فلج۔ کھانسی۔ دست وغیرہ پسینہ بچے صبح کے قریب۔ بکثرت ذرا سی کوشش سے۔ کھلی ہوا میں +

خوراک دوا و طاقت استعمال - ۳۷ - ۴۷ - ۱۲۷ - ۱۴۷ - ۱۶۷ - ۱۸۷ - ۲۰۷ - ۲۲۷ - اور زاید مدت اثر - پانچ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات - گریفائٹس۔ ایکس۔ پیٹرومس۔ سیپیا۔ سنہ نم۔ سیفی سیگیریا۔ ادویات متعلقہ جیلیسی میم۔ کالی بائی کارب۔ فاسفورس۔ رس ٹاکس۔ سیپیا۔ فادائر۔ جب زہر سیسہ سے فانی گر جائے۔

CHINA

چائنا

امراض و تاثرات

اشتداد مرض -  
تضع جوہر حیات یعنی منی و خون غیر چھوٹے  
دھماکے سے زہور سے  
مقرر وقت پر -  
ہر تیسرے دن ڈائسٹیکم بنیٹم ہو  
سردی سے  
جھونکے سے  
آندھی سے  
کھلی ہوا میں  
کھانا کھانے سے

خون  
دورہ خون  
از اعضائے  
اخراج  
طوبت  
جگر  
تلی  
اعصاب



پچھل کھانے سے اور دودھ پینے سے  
دماغی کام کرنے سے

انخطاط مرض ۷

ڈھیلے کپڑے پہننے سے

خوب دبانے سے

علامات - باری سے - بکثرت سخت کمزور کرنے والے اخراج - یا اخراج خون  
(ابروٹیم - فاسفو کلسینڈ - کلکیر یا سپ) کمزوری - تیز حسی - اعصابی - بے چینی - ہر ایک معمولی بات  
سے گھبرا جائے - مثلاً روشنی - شور - بدبو - درد - وغیرہ وغیرہ سے - سختی اور سوزش ہو - درد کی جگہ پٹی  
پڑتی ہو - رتخ اور نزلے کی شکایت - خون کی کمی اور سوکھا یا ہو - ڈراپسی ہو یعنی پیٹ میں جلد بھرا کہیں  
اور سے خارج شدہ پانی کا اجتماع - مندی اور نافرمانی و طبیعت - سر جھکانا - پیچھے کی طرف گرتا ہو - دماغ  
میں تڑپن - پھٹا جاتا ہو - زخمی سا معلوم دے - کنپٹیوں میں - چاند دکھتی ہو - بال چھوٹنے سے -  
کان گرم اور خشک ہوں - سر میں جکڑ آئے - بہرا پن ہو - زرد میلا لارنگ ہو - بیمار سا معلوم دے - آنکھوں  
کے گرد نیلے سے حلقے ہوں - دانتوں میں تپکن ہو - چوسنے سے - ذالیقہ کڑوا - نرش یا تیز - عمدہ عمدہ  
کھانے پسند کرے - مگر جلد سیر ہو جائے - باد بار بھاری بھاری بلند ڈکاریں آئیں - مگر آرام نہ پڑے  
(آر جینٹ ناٹریٹ) کھانا دیر میں مفہم ہو - بد مصفی کے دست - نیلے خون ملے ہوئے اور سیاہ ہوں  
اور بے تکلیف آتے ہوں دکھانے سے - رات کو سیاہ دھبے دار - بکثرت اخراج جیض - ذرا سی حرکت  
بھی دل دہلنے لگتا ہو - افسانہ اکھڑ جائے - پھوٹا ہوا گھر گھر کرتا ہوا سانس آئے - چھاتی میں سخت درد  
ہو - اور ریڑھ کی ہڈی میں - اچھا رہ ہو - متعدد سے رحم تک درد ہو - تھوک میں خون آئے - پکنے والا پتہ حق  
ہو دیر سلف اکندھوں پیکپولا اور سیکرم کے درمیان بوجھ معلوم دے - گھٹنوں میں اینٹھن ہو - گویا کہ  
ٹانگوں کے گرد کوئی بند باندھ دیا گیا ہے - حرام مغزیں درد ہو - غنودگی معلوم دے - گہری نیند - خزانوں کی  
آواز ہو - فکر اور پریشانی والے خواب آتے ہوں - ہاتھوں کی رگیں سوجی ہوں - دھاتھوں اور چہرے کی  
بخار میں سردی مگر می اور پیٹ کے مدارج صاف صاف نمایاں ہوں - سردی ہلنے کے بعد پیاس لگے - چہرہ  
سرخ اور گرم ہو - ہاتھ ٹھنڈے ہوں - تپ دق - حرکے دینے والا پسینہ آئے - رات کو ذرا  
ذرا سی حرمت سے کمزوری سے - طبقہ حارہ کے بخارات +

مقدار خوراک و طاقت - ۲۰ - ۳۰ +



کم از کم تقریباً مدت اثر تین ہفتہ۔  
 مدد و معاون ادویات۔ آرسینکم۔ کلکیر یا فاس۔ کاربوووج۔ غفرم۔ کلکاس۔  
 ادویات متعلقہ۔ کاربوووج  
 مخالف ادویہ۔ ڈیگی ٹیس۔ سیلینم

CHAMMOMILLA

کیمو ملا

امراض و تاثرات

من  
 اعصاب  
 جذبات

لعاب دار جھٹی { اعضائے انضمام  
 جگر  
 امراض مستورات و بچکان  
 بائیں جانب

اشتداد و مرغی

غصہ سے

رات کو

دانت ٹکڑے کے وقت

سردیوں میں بالخصوص سرد و مرطوب ہوا میں

سردی گھٹنے سے۔ آندھی میں

قہوہ پینے سے

منفی اشیاء مثلاً افیون کے استعمال سے

انخطاط مرض

اٹھائے پھرنے سے

معتدل موسم سے

گرمی سے۔ پسینے سے

ٹھنڈک پہنچانے سے یا کوئی سرد چیز لگانے سے

علامات۔ قوت احساس بہت کم ہو۔ تکلیفیں اور درد ہلکا و بدلتا رہتا ہے۔ چلانا آسان ہے۔ نور  
 فرش پر گھومتا رہتا ہے۔ آرسینکم یا تکلیف کے بارے۔ بے چین ہو۔ بیکراہ کو کرلیٹ جالے۔ غزل یا درد و رنج کا انکار  
 ہو۔ بے چین اور چڑچڑاہو۔ درد قوی لہج۔ خشک و خشک والی کھانسی ہو۔ اینٹھن ہو۔ تلخ ذائقے کی تہ ہو  
 اعصاب میں مروڑی جھٹی۔ بیداری پر یا تکلیف کے بعد ہاتھ سن پڑ جائیں۔ اور کوئی چیز پکڑ سکیں جھکنا  
 ہو۔ بد صورت و خستہ۔ غیر متذبذب معمولی سی بات پر بگڑ جائے۔ بولنا یا چھو جانا



نا پسند کے۔ بچہ گو دین پھرائے جانے کا خواہشمند ہو۔ جو چہ سوزی دی جائے اُسے  
 لینے سے انکار کر دے۔ کان میں درد ہو۔ گرمی سے تکلیف۔ ایک طرف کے گال پر سوزش  
 یا سرخی ہو۔ چہرے میں دائیں طرف درد ہو۔ چہرے ٹھکے ہوئے سے معلوم ہوں۔ ذائقہ تلخ ہو۔ زبان پر  
 موٹی زردی مائل سفید تہ جمی ہو۔ ڈکار سے شرے ہوئے اندھے جیسی بد بو آئے۔ (Distended Bowels)  
 تہی ہوئی معدے کی انتڑیاں۔ دمہ ہو۔ گرم خشک موسم میں بیتان ہو۔ انتہائی خشک رہیں۔ فہد آئے۔ بھلیف  
 کے مارے اٹھڑی ہوئی یا بار بار چونک پڑے۔ گرم دست آئیں۔ قویٰ بچہ میں کاٹنے کا سادرو ہو۔ یا ہوا  
 پھرے درات کو۔ ایک طرف ٹھنڈی ہو اور دوسری طرف گرم۔ کپڑا کھل جانے سے۔ جلد ٹھنڈی ہو  
 مگر جلد ہی گرم ہو جائے اور سردی لگ جائے۔ کبھی گرمی لگے اور کبھی سردی کبھی گرم ہو اور پیاس لگے  
 یا درو کے ساتھ گرم گرم پسینہ آئے۔ ناک سے گرم گرم پانی خارج ہو۔ دست گرم۔ ترش  
 بد بو دار۔ گھاس جیسے سبزی مائل۔ جھاگ دار۔ پھٹے پھٹے۔ زردی مائل سبز یا بدبو مضمی کے  
 شرے ہوئے اندھوں کی سی بد بو والے بے قاعدہ۔ ٹھیک ٹھیک ہونے والے وضع حمل کے سے درد۔ یا پٹنے  
 رافوں کے اندر کی طرف پھیلنے والے۔ سیاہی مائل جھانٹھ دار اخراج حیض یا رطوبت +  
 مقدار خوراک یا طاقت استعمال۔ ۳۷ سے ۳۸ تک  
 مدت اثر۔ ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ بیلا ڈونا۔ کلیریا کارب۔ میگنیشیا کارب۔ سینٹی کیولا۔  
 ادویات متعلقہ۔ نکس و امیکا۔ سیٹیفی سیگیریا۔  
 فادزہر۔ اگنیشیا۔ نکس و امیکا۔ پلسٹا۔ کو مو کلیڈیا  
 مخالف ادویہ۔ زنکم۔

COLOCYNTH

کولوسنتھ

اشتداد مرض

اظہار جذبات سے۔ تنگ آنے یا چہرے  
 جانے سے

کچا جانے سے۔ غصے سے۔

امراض و اثرات

(Trifacial)

چہرہ

تنگ

پٹھ

زناہ

اعصاب

(Sciatic)



نظام انضمام

انٹریاں

خصیات الرحم

نیلے۔ گردے

بائیں جانب

بے درد وانی طرف یسٹ سے

رات کو۔ بستر میں

ہوا کے جھونکے سے

سردی لگنے سے

اخطاط مرض

خوب زور سے دبانے سے۔

نہوہ پینے سے

گرمی سے

آہستہ آہستہ حرکت سے

آرام سے

رفع حاجت سے

گوز خارج ہونے سے

**علامات**۔ نظام انضمام پر اور ریڑھ کی ہڈی پر خاص اثر کرتی ہے۔ ایک لخت اور نہایت سخت مروڑ سا اٹھتا ہے اور اینٹھن ہوتی ہے۔ جس کے باعث مریض درد کی وجہ سے بہت اینٹھا جاتا ہے۔ مڑتا ہے۔ یا چلائے لگتا ہے۔ اس کا جی منٹلاتا یا منہ میں پانی بھر بھر کر آتا ہے (تنخی دور) بجلی کی طرح اٹھتا ہے۔ کاٹتا ہوا چٹکی۔ سی بھرتا ہوا۔ مروڑتا ہوا یا چھیدتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر جگہ سن سی پڑ جاتی ہے۔ درد والا عضو بہت چھوٹا سا معلوم دینے لگتا ہے۔ بہت کراہتا ہو۔ نزلہ سرد۔ غصہ۔ بد مزاجی۔ درد سے۔ سر میں چیرنے والا درد۔ پتلیاں پھرانے سے۔ چہرے میں درد دیکھ کر منہ آنکھوں کی علامات کے (Costialgia) کے ساتھ ادا لے بدلتے۔ اینٹھا اور مڑا ہوا چہرہ۔ دیر تک بد ذائقہ قائم رہے۔ سخت کاٹنے والا۔ نوچنے والا درد۔ قویٰ مریض کو دھرا کر دے کے سخت دباؤ سے۔ پاخانے میں یا ناف کے پاس سخت کاٹنے والا درد ہو۔ انٹریاں پتھروں میں دبی ہوئی سی معلوم ہوں۔ نلوں کے درمیان درد۔ زرد۔ جھاگ دار۔ پانی جیسے پتلے چھچھروں والے۔ حرش۔ بدبو دار۔ چپکے ہوئے دست آئیں۔ سخت درد قویٰ مریض کے ساتھ ہوا خارج کرنے ہوئے۔ پیش ہو۔ مقعد سے پھلنے والے بیلے سے خارج ہوں۔ پیشاب کے ساتھ چپکنا ہوا بدبو دار مادہ خارج ہو۔ دایرے کھنڈے کے نیچے درد ہو کے دبانے سے (برائی) اگر گردہ درد ہو حرکت سے



دوسے سے۔ یارات کوئے درد والے پہلو پر لیٹنے سے عضو اندر کو گھٹے ہوئے معلوم ہوں۔ بدبودار پسینہ  
مقدار خوراک اور طاقت۔ ہسے۔ ستھک۔

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ کاشی کم۔ مرکبوریس۔ سیٹنی سیگیریا۔

ادویات متعلقہ۔ سیٹنی سیگیریا۔

فادزہر۔ کوفیا۔ سیٹنی سیگیریا۔ کیبومیل۔

مخالف ادویہ۔ کاسٹکم۔

### DIGITALIS

اشتداد و مرض

اوپر اٹھانے سے

جسمانی محنت سے

بائیں طرف لیٹنے سے

حرکت سے

گرمی سے

خوراک کی بوسے۔

ٹھنڈی اشیاء پینے سے

زیادتی سے۔ خصوصاً کثرت جملع سے

اخطاط مرض

آرام کرنے سے

ٹھنڈی ہول سے پت لیٹنے سے

علامات۔ کمزوری۔ غشی کی مانند۔ جسے کہ بات تک بھی نہ کر سکے۔ دل کی حرکت کمزور۔ مہم

یا بے قاعدہ۔ حرکت سے تیز ہو جائے۔ جگر کی خرابی۔ یا کثرت جملع سے پیدا شدہ آفاقہ شباب میں۔

چلنے پھرنے کی سید خواہش۔ تفکرات۔ پیشاب کی وقت آمیز خواہش۔ فکر آلود تنائیں۔ سرچکرا نا۔

### روحی شلیس

امراض و تاثرات

دل۔ اعصاب

جگر

پھیپھڑے

معدہ

کینٹی

اعضائے تناسل و پیشاب

دورہ خون



سر میں کڑاؤں کا احساس ہونے کیلئے نیچر آدھے سر کا درد (SPASMODIC HEADACHE) زردی یا لہریخ  
 زبان موٹی اور دھندلی (THICK FILM) چھوٹا ہونٹ اور زبان زرد نیلگون -  
 پیاس کی زیادتی - بھوک کی کمی و سلسلہ بخار نہ ہو موت اور تشلی یا فم معدہ میں غشی آور دباؤ کا احساس - سوزش  
 جگر - چھو آہمی نہ جاسکے - سفید رنگ کے دست - بوند بوند کر کے پیشاب آئے - ڈراپسی کسی مقام سے  
 خارج شدہ پانی کا اندرونی اجتماع مثلاً جلد صحر وغیرہ مثلاً کے کی گردن میں ٹرپ - علی الصباح  
 ایستامکی عضو تناسل - رات کو احتلام - پروستٹیٹ گلینڈز گلیٹیوں کی بڑھاپے میں (Prostate Glands)  
 کی سوزش - حشفہ پر سوزش سوزال دجا کا سوزاک میں سر دی مائل سفیدی کا بکثرت  
 اخراج - سانس آہستہ آہستہ آتا ہو - اور ایسا معلوم ہو گویا دم گھٹا جاتا ہے کھانستے ہوئے یا نوحہ  
 ہاتھیں درمیان - دل کمزور - ایسا معلوم ہو گویا اس کی رفتار حرکت چلتی - دھڑکن - مروڑی معلوم ہو -  
 نبض کی رفتار کم دبتے قاعدہ - غنودگی - گر پڑنے کے خواب جس کے صدمے سے آنکھ کھل جائے - جلد  
 ٹھنڈی ہو - پھر پھر گرمی محسوس ہو - کمزوری جلد ہو - ٹھنڈے اور پیسے دار پیسے آئیں - یا یاں بانہ  
 سن یا کمزور +

مقدار خوراک و طاقت استعمال - ۳ سے ۳۰ تک

مدت اثر تین ہفتے -

مدد و معاون ادویات

ادویات متعلقہ - گلوٹیم - سپائی جیلیا -

فاد اثر - کیفیر - پیٹریا -

DROSERA

ڈروزیرا

اشتداد مرض >  
 نصف شب کے بعد  
 لیٹنے سے  
 گرمی سے  
 باتیں کرنے سے

امراض و تاثرات  
 اعضائے تنفس  
 ہڈیاں - لمبی (دشی نجیا)  
 جوڑوں کی ہڈیاں  
 آواز (دیر تکس) ؟



چھاتی پھیرے

غدد

ٹھنڈی اشیا کھانے سے

بہننے سے

خسرہ کے بعد

انخطاط مرضی

دیانے سے

علامات پھیر کر یک لخت حملہ کرنے والے نرے یا اخراج خون کے اخراجات۔ تپ و ق۔  
جلدی خفہ آجائے۔ مریض کی خواہش ہو کہ ڈوب کر مر جائے۔ جرش بوکا تیز احساس۔ درد اور پھینکیں  
خواب ذائقہ سڑا ہوا سا۔ کھانسی کے دورے جو پھیر کر تیز گہرے مکر مسلسل رہیں  
جن سے کتے کے بھونکنے جیسی آواز آئے۔ اور دم کھٹنے لگے۔ کھانسی گویا پیٹ سے  
اُٹھے۔ سانس بند سا ہو جائے۔ پسلیاں پکڑنے کو مجبور ہو۔ جن کا خاتمہ ڈکار آنے۔ قے آنے۔  
ٹکسیر آنے یا ٹھنڈے پسینے آنے پر ہو۔ بعد میں (Inflammation) ہو۔ کالی کھانسی ایسا  
موس ہو گویا گلے میں کوئی پر پھیر رہا ہے یا کچھ اٹکا ہوا ہے۔ گلا میٹھا ہوا ہو۔ بے لہجہ آواز۔ چھاتی میں  
کچھاوٹ محسوس ہو۔ محروں کا تشنج یا تھک کی اینٹھن۔ تھوک میں خون۔ زبان صاف نہ ہو۔  
کھانسی ہوئے کتے کے بھونکنے کی سی آواز نکلے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ اسے ۲۴ تک سفوف کی صورت میں۔

مدت اثر۔ ۲ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ کاربوئیج۔ نکس و امیکا۔ سلفر

ادویات متعلقہ۔ کوریلیم روبرم۔ کوکس کیکنائی۔

واد اثر۔ کیمر۔



## DULCAMARA

## ڈلکامارا

## امراض و تاثرات

ہوا کی نالی

مشانہ

آنکھ

عضلات

کمر

جاذب نایاں

جلد

لعابدار جھلی

پیشہ

## اشتداد مرض

گرمی میں

درجہ حرارت کی تبدیلی سے

کپڑے اتارنے سے

ٹھنڈے پانی میں پیر رکھنے سے

بھیک پالنے سے

ٹھنڈی مرطوب پیر نہ خانے میں

یا ٹھنڈا لیٹیر پر سونے سے

رطوبات جسمانی رک جانے سے

پسینہ رک جانے سے

پھوڑے وغیرہ دب جانے سے

موسم خزاں میں

رات کو

آرام کرنے سے

چوٹ سے۔ طوفان سے پہلے

پارے کے استعمال سے

علامات کسی لعاب کے زیادہ خارج ہونے سے۔ نزلے۔ سوج۔ جگری خرابی کی طرف میلان ہو  
 سختی۔ بے جستی۔ درد بازو۔ پاؤں میں یا فوطوں وغیرہ میں مروڑ یا اینٹھن۔ چیرنے والا درد۔ فالج کا اثر۔ کھٹک  
 دل کا بیٹھا جانا یا غمگین رہنا۔ بُرا بھلا کہنا۔ بولنے میں دقت۔ جلدی سے سرسام ہو جائے۔  
 کینٹی بڑی محسوس ہو۔ چند یا پروادہوں۔ ناک میں درد ہو۔ ناک بہے۔ رگ کی ہوئی معلوم دے۔ موسم  
 گرمیاں میں زکام ہو جائے۔ دست لگ جائیں۔ حیض کی بجائے نکسیر کئے۔ زبان پر سوزش ہو۔ چپکنے والا  
 یا صابن کے سے جھاگ والا تھوک۔ ناف کے قریب کاٹنے کا سادہ ہو۔ درد کے ساتھ سنبر رنگ  
 کے جھاگ دار دست آئیں۔ نزش بدبودار پتلے دست آئیں۔ رات کو مروڑے خفیف سی سردی



بھی آنکھ اور منانے پر (پاسٹلا) دستوں یا تنفس پر اثر انداز ہو (سلفر) پیشاب بہت آئے۔ دم کوئی دار  
یا جھاگداریاں بولوار پیشاب۔ ڈراپسی جو طے بڑھے ہوئے جن میں سخت درد ہوتی ہو۔ حیض میں پانی جیسا  
خون خارج ہو پھوڑے پھنسی۔ دال وار موٹے کھرنڈ والے جسم جن سے خون بہے۔ خارجی۔ حیض سے  
پہلے پھیپاکی (Urticaria) غلبہ شہوت۔ بٹے گوشت دار مے۔ سردی کا احساس کنبی پر مکر کے ارد

گرد۔ انتڑیوں میں۔ فالج زدہ حصہ برف جیسا سرد ہو۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۲۰ سے ۳۰ تک۔

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ ایلیومن۔ میرٹھا کارب۔ نیتروم سلف۔

ادویات متعلقہ۔ رس ٹاکس۔

فاد اثر۔ چار ہفتے

مخالف ادویہ۔ بیلاڈونا۔ لیکیس۔

زرد جمیلی GELSEMIUM

اشتداد مرض ۵

جذبات سے خوف سے

حیرت سے۔ صدمے سے مشکلات سے

موسم میں بہاریں۔ گہریں  
موسم میں مرطوب۔ گھٹا ہوا

گرمی سے۔ وقت مقررہ پر

دانت نکالتے وقت

تباکو سے۔ گیس سے

انحطاط مرض ۷

بکثرت پیشاب آنے سے

پسینہ آنے سے

جیلیسیم

امراض و تاثرات

کن پٹی

گدی

گدن

عضلات۔ گھٹنا

اعصاب قوت۔ پمدہ چشم

آنکھیں۔ انصارت

تاک

عاب دار جلی (Gall Ducts)

دائیں جانب



ہلانے سے شراب کے استعمال سے

مشروبات سے

دماغی محنت سے

**علامات۔ درد تھکان۔ بھاری پن۔ کمزور۔ دکھن۔** اعضا میں۔ مروڑ۔ خاموش  
 لیٹا رہے۔ سہارا لگائے بیٹھا ہے ریشنے کی حالت میں۔ اعصابی کمزوری حد درجے کی کچکچی کسی ایک  
 پٹھے میں اینٹھن۔ چہرے میں۔ بھوڑی پن۔ زبان میں۔ یہ خواہش کہ کوئی پکڑے رہے۔ لرزہ  
 دوران حمل میں اثرات فلج۔ آنکھوں میں۔ گھلے میں مقعد میں۔ بٹلے میں۔ بھرا بھرا محسوس ہو۔ بھول  
 انجماد۔ علامات معہ دوران سر۔ آنکھوں یا بصارت میں غنودگی۔ بار بار پیشاب آئے۔  
 گھبرا یا ہوا۔ بوکھلایا ہوا۔ سست یا لا پرواہ۔ آہستہ آہستہ جواب دے۔ ڈٹتا رہے مگر نے سے  
 تکلیف سے موت سے۔ درد سے۔ دوران سر شرابیوں کا سا کن پٹی میں سرد درد۔ سست۔  
 بھاری۔ بند سا بندھا ہوا۔ کن پٹی میں۔ آنکھوں کے اوپر تک۔ تنگ ٹوپی سے بسوزش سی محسوس  
 ہو۔ دم دماغ۔ مرگی۔ آنکھیں درد کریں آنکھیں بھاری لگیں۔ دیکھیں۔ پر دو چشم بھاری ہوں  
 مندے جائیں۔ بصارت۔ دو دو نظر آئیں۔ پیزن تیرتی ہوئی سی دکھائی دیں۔ اندھے پن کا دورہ  
 چہرہ بھرا ہوا۔ دھندلا سرخ۔ بھاری۔ غیر مظہر۔ دھواں سا چھایا ہوا۔ پلوں میں نزلہ کا درد۔ ننگے پر  
 کان میں درد۔ ناک رکی ہوئی۔ چھینکیں آئیں۔ تپلا چڑھتا ہوا زکام۔ زبان بھاری۔ بولنے میں  
 موٹی۔ پیاس نہ ہو۔ بٹانے میں اینٹھن۔ بہ افراط۔ زرد دست۔ بے درد۔ اعصابی دست۔ وضع  
 حمل کے بعد مقعد میں درد۔ صاف پانی جیسا پیشاب کے سرد کو۔ کبھی پیڑوں میں اور کبھی سر میں درد۔  
 رحم میں بھاری پن۔ درد گویا پکڑا ہوا۔ پُر درد حیض۔ وضع حمل کا درد اوپر کو جائے۔ پیچھے گویا نیچے کو  
 رانوں کی طرف جائے۔ گہرا زرد سیلان الرحم۔ آیام حیض میں گھلا پڑ جائے۔ سانس تکلیف سے آئے۔  
 چھاتی میں دھیرا سا معلوم دے۔ انجماد۔ دل میں درد۔ حرکت بند ہو جانے کا ڈر لگے۔ حرکت کی خواہش  
 ریڑھ کی ہڈی اوپر یا نیچے۔ درد کے سیر کرنے سے۔ ساتھ ساتھ کن پٹیوں میں درد۔ کندھوں کے نیچے درد  
 سر میں درد۔ (دائیں جانب) گھٹنے کمزور۔ اترتے ہوئے۔ لڑکھاتی چال۔ ٹانگیں بے قابو۔ زرد دم طبع  
 جلد۔ غنودگی۔ سوتے سوتے چڑک پڑے۔ گہری مدہوشانہ نیند۔ نبض بھری ہوئی۔ گول۔ نرم۔  
 کن پٹی سے پیشانی کی طرف خون کا دورہ۔ بصارت میں گڑبڑ۔ پھر سردی لگے۔ سردی لگے درد ہو سستی  
 معلوم دے۔ لیٹیا، گرمی ملی ہوئی یا ادلتی بدلتی۔ پشت کے اوپر اور نیچے۔ ماتھ پیر ٹھنڈے۔



گرمی اور نیند۔ پیاس نہ ہو۔ لرزہ اعضاء تناسل پر ٹھنڈے پسینے۔ بخار۔ سفر آوی بیجا۔

فصلی۔ لمبریا۔ سیربروسپائسل +

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔

مدت اثر ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ آرزنم۔ نائٹریٹ۔ سیسیا۔

ادویہ متعلقہ۔ کونیم۔ آگنیشیا۔ مرکبوس ایک۔ ٹیٹرم میور۔ سیسیا۔ وریٹرم درد۔

فاداف۔ چائنا۔ کلنی۔

سرم

GRAPHITES

گریفائٹس

اشتداد مرض >

سردی سے ٹھنڈی ہوا کے بھونکے سے درد و

آیام حیض کے دوران میں

اخراج دہب جانے سے

خالی تھوک نکلنے سے

چربی گرم مشروبات سے

بستر کی گرمی سے

کبھی سے

انخطاط مرض >

کھلی ہوا میں

اند پر پھرنے سے

چھونے سے

خوراک سے

امراض و تاثرات

پرورش۔ دورہ خون

جلد۔ کان کے پیچھے۔

تھوں میں

سورخ و ناخن

لعابدار جھیلیاں

آنکھیں

خدد

علامات۔ ڈیصلے کی مانند موٹے یا سخت (چائنا تھیو جہا) امراض جلد۔ خدد اور ناخن

زخم گتوں پر۔ دست۔ کھرنڈ۔ پانی سننے والے۔ یوائی یا شگاف۔ زاولوں۔ آنکھوں یا تھنوں میں۔ ہاتھ

کی آنکھوں یا پستانوں کی نوک پر۔ چونڑوں میں وغیرہ وغیرہ۔ زیر اثر حصے کا سوکھ جانا۔ تھوڑا سا بدبودار



اور چپکنے والا اخراج۔ پتلا خونی اخراج۔ جلن یا بے حتی۔ جس کروٹ لیٹے ہو اس کی دوسری طرف دروجا  
 چربی۔ ڈھیلا پن۔ ٹھنڈا ہونا اور قبض ہونا۔ ٹنگین رہنا۔ خوفزدہ۔ متلون المزاج اور ارادے کا کمزور  
 ہونا۔ کھانے سے رونا آنا ہو۔ دماغ بے حس سا ہو۔ چاند پر جلن ہو۔ گن پٹی بھاری معلوم دے۔ رسولی۔ بال  
 اُنچے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہوں اور گرتے ہوں۔ چند یا اور پسو کے۔ شور میں زیادہ سنائی دے۔ کان کے  
 پیچھے پھنسیاں ہوں۔ آنکھوں میں پڑ بال داندرونی پلکیں، روشنی سے خوف۔ کان میں کھرنڈ نکلیں۔ کان پیسے۔  
 نکیں پانی سا خارج ہو۔ ناک اور کان خشک ہوں۔ ناک زکام ہو۔ بند ہو یا کبیر آتی ہو۔ حیض سے پہلے  
 سونگھنے کی طاقت تیز ہو۔ ذائقہ خراب ہو۔ زبان پر مٹی اور سفید تہ۔ دجھتہ میل کے جے ہوں۔ دم گھٹتا  
 ہو۔ خنہ زیر وغیرہ سے۔ بھوک۔ مٹھائی اور گوشت پسند ہوں۔ کبھی ماضیہ طراب ہو جائے کبھی خرابی  
 جلد کی علامات نمودار ہوں۔ تکلیف دہ اور کھٹی ڈکاریں آئیں۔ جلی جلی سی۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہو  
 کمر کے قریب بوجھ برداشت نہ ہو سکے۔ بڑی بری ڈکاریں آئیں۔ اچھا رہے ہو۔ انتریاں کام نہ کریں۔  
 دست میں بڑی بڑی گھٹلیاں۔ آندھ میں لپٹی ہوئی۔ نہایت تکلیف سے خارج ہوں۔ یا  
 میلے خاکی مائل رنگ کے بدبودار دست آئیں کبھی دن تک پاخانہ نہ آئے۔ (سیسیا، مباحثت کے بعد کمزوری  
 دغشی سی طاری ہو جائے۔ نامردی۔ چوڑوں میں اور پوڑیہ دم میں کھلج۔ حیض سے پہلے۔ جملع سے لغت۔  
 نلوں میں سوزش۔ حیض بے قاعدہ۔ دیر سے۔ کم تکلیف کے ساتھ۔ سردی لگ جانے کے باعث۔  
 صبح کے وقت تھلی۔ دوران حیض میں پسینہ۔ حیض کی بجائے سفید رطوبت کا جلن کے ساتھ بکثرت اخراج۔  
 نصف شب کے بعد دم گھٹنے لگے۔ کھانا کھانے پر۔ زبان بے قابو ہو کر بولنے سے۔ دورہ خون  
 بے قاعدہ۔ تیز۔ سر کی طرف رجحان۔ گئے پر سوزش۔ آگ کی گرمی سے۔ دباؤ سے پیروں  
 میں ترش بدبودار پسینہ۔ انگلیاں چٹھی ہوئیں۔ ناخن گھلے ہوئے۔ کچلے ہوئے سے جلد خشک  
 کھانج ہو۔ سانی سے پھٹ کر لیس دار پانی خارج ہونے لگے۔ دتوں میں۔ زخم دیر  
 میں چرے ہوں۔ ترو ہیں۔ کھرنڈ آفریں۔ یگریمیا متیلی پر۔ مانگوں پر یا متعدد کے آس پاس ایک جگہ سے  
 دوسری جگہ سے۔ جانے والی یا بار بار ابھرنے والی پتی دھپکی، دماغی ڈالٹس۔ رس ٹاس، ٹھنیاں  
 دگر می سے۔ سردی بہت محسوس کرے۔ ہڈیوں میں۔ تکلیف ہو۔ بیتہ زکام میں۔ معدے میں  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۶ سے ۳۰ تک

مدت اثر ۵ ہفتے

ممد و معاون ادویات۔ آرسینک۔ کاشی کم۔ فیرم۔ ہیپر سلف۔ لائیکو پوڈیم۔ سلفر۔



ادویات متعلقہ۔ آرسینکیم۔ کلکیر یا فلور۔ کار۔ مچلی یا بی کارب۔ پلسٹا  
فادائر۔ نکس و امیکا۔ ایکونائٹ۔ آرسینکیم۔

HEPAR SULPH  
کلکیر یا اور سلفر

ہیپرسلف

استد او مرض

امراض و تاثرات

سردی سے۔ ہوا سے  
ہوا کے جھونکے سے۔ آندھی سے  
عضو کی خشکی سے  
کھل جانے سے  
چھوٹے جانے سے  
شور ہونے سے  
محنت کرنے سے  
سردی سے۔ خشکی  
ذرا سا بھی  
درولے جھپے پر لیٹنے سے  
پاؤں کے استعمال سے  
رات کے وقت

اعصاب  
جوڑنے والے ریشہ جات  
جھلی متعلقہ تنفس  
لچک دار پٹے  
غدد۔ مشاد  
جلد  
ناک کی ہڈی دکالی یا بی کارب

انحطاط مرض

گرم کرنے سے  
سردی سے  
تری سے  
تر موسم میں

علامات۔ ڈھلا پن خفیف سی سردی اور گرمی کا بھی اثر ہو۔ سردی بہت لگے درود بہت  
محسوس ہو۔ بہت جلد بیہوش ہو جائے۔ اخراج بکثرت ہو۔ بدبودار۔ سرے ہوئے پنیہر جیسی بو والا۔  
شرش۔ دست ہوں۔ جسم سے بو آئے۔ پسینہ بہت اور بہ آسانی آئے۔ جسم کھولتے ہوئے خون  
معلوم ہو۔ مگر آرام نہ پڑے۔ ایسا محسوس ہو گیا جسم پر آندھی سی چل رہی ہے۔ گرمیوں میں بھی اور کوٹ پہنے



بہ آسانی سردی لگ جائے۔ جلنے اور چپکنے والی۔ پھانس چھبے جیسی تیز تکلیف۔  
 ہر ایک چوٹ یک جائے بہت گاڑھی راڈ پڑے۔ پھوڑے۔ مزاج جلد باز۔ غصہ ور۔  
 چمچ چڑا اور غیر مطمئن۔ بال جگہ جگہ گرتے رہیں۔ چھوٹے سے بھی درد کریں۔ روشنی سے نفرت۔  
 کان بہہ دیرینہ۔ ناک بند اور تکلیف دہ۔ غرض زکام۔ بلغم دیر سے نکلے۔ گلے میں کچھ اکٹا ہوا معلوم  
 دے۔ خناق۔ گھیکا (دائیں) معدہ کمزور جلدی سے خراب ہو جائے۔ ترش چیزوں کی چاٹ۔ عارضی آہستہ  
 بخش ہشیا کی خواہش۔ کھانے سے فرحت ہو۔ مگر قیض کمرے پشیا ب سے فراغت پانے کے لئے  
 انتظار کرنا پڑے۔ بعد میں خون اور پیپ آئے۔ سرخ بخار کے بعد گردے کی بیماری۔ نہایت بدبودار  
 جھلی دار یا پیپ جیسی سفید رطوبت کا اخراج گلے میں تکلیف۔ سیٹی کی سی آواز۔ سانس لینے سے دم گھٹے  
 سر تھپے جھکا نا پڑے۔ کروپ۔ گوتوں کا گلا پڑا ہو۔ غرض تکلیف۔ رگکا بیٹھ جانا۔ دم۔ ننگ جانے کے بعد  
 کھانسی۔ دم گھوٹنے والی۔ کتنے کی سی آواز۔ سرد مشروبات سے یا صبح کے وقت دھک سی  
 اُٹھے۔ جیسے کوئی پر گلے میں اکٹا ہو۔ بلغم نرم ہو مگر خارج نہ ہو سکے۔ ٹھنڈی ہوا میں اور  
 بھی تنگ کمرے۔ کمزوری ہو۔ چھاتی میں گھڑ گھڑ کرے۔ بلغم بہت خارج ہو۔ زرد۔ گاڑھی۔  
 بار بار ہونے والا برا نکاسٹنس۔ سردی کے لئے جلد بہت ذی جس (ایگر اس) گندی اور تیز پھنسیا  
 بڑے زخموں کے گرد چھوٹی پھنسیاں۔ رات کو پسینے آئیں۔ ہلکا ہلکا بخار رہے۔ تپ وق جیسا  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال  
 مدت اثر۔ چھ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ آیوڈین۔ سلیشیا۔

ادویات متعلقہ مرکبوریس۔

فاواثر۔ سیلاڈونا۔ کیمولا۔ سلیشیا۔ کالی آیوڈین۔ مرکبوریس سول۔

بعد میں دی جائے۔ فاسفورس۔ سلیشیا۔



## ہائیمس

HYOSCYAMUS ابوائین

امراض و تاثرات  
من - دماغ - اعصاباعصاب  
چہرہ  
آنکھیں  
خوناشتداد مرض >  
جذبات خوف  
احسدچھوٹنے سے - لیٹنے سے  
ٹھنڈے سے

سوئے سے

انخطاط مرض ے

بیٹھنے سے

علامات - مرکز اعصاب میں اجتماع چہرہ زرد ہو - تشنج ہو - کپکپی ہو - جھٹکے سے لگیں - اینٹھیں -  
 ہو - پر جوش دیوانہ پن ہو - جس کے خاتمے پر لپٹ بہت کرنے والا نشہ سا ہو جائے - یا پکڑنے  
 کی سی حرکات ہوں یا اور بہت سی پریشان کن حرکتیں کرے - سر سام کا زور ہو - دیوانہ پن بنگا ہو جائے  
 اپنے عضو تناسل کھیلے - گالہ بکاتا اور لڑنا جھگڑنا ہو - اپنی انگلیوں سے کھیلتا ہو - اور بہت سی  
 مضحکہ خیز حرکتیں کرے - اکیلا رہنے تعاقب اور پانی سے خوف کھاتا ہو - وہی اور خشک مزاج ہو بھاگنا  
 چاہے - ہر ایک لفظ باوازد بلند بولے - پہلے سوچ نہ سکتا ہو شکل کچھ ہوش میں لایا جائے پھر ویسا ہی  
 جائے - کچھ منہ میں ٹر بڑھے - اور بسترے میں لیٹ جائے - نامعلوم طور سے دھت غار ج  
 ہو جاتے ہوں - خواہ سخت ہوں یا نہایت پتلے - خون آلود زرد ہوں - چہ حرکت کی سی حالت ہو -  
 خشک اور بے چین کرنے والی کھانسی کا رات کو دورہ پڑے - لیٹنے سے - کھلنے سے یا بات چیت کرنے  
 سے سوتے سوتے اٹھ بیٹھتا ہو - ہلکا ہلکا بخار رہے - جلد کا رنگ زرد ہو اور گرم رہے - گرم گرم  
 پسینہ آئے سر میں چکرائے تشنج ہو - سرد میں نہیں بڑھتی ہوئی محسوس ہو - سر آگے پیچھے ہلے داسے جھکے  
 سے - بھینکا دیکھے - روشنی ناپسند کرے - بار بار آنکھیں بند کرے - منہ چلے دانتوں پر میل جما ہو  
 زبان سخت - سیاہ - سرخ پھٹی ہوئی سی - کوا بڑھا ہوا - رات کو بار بار پیشاب آئے یا رنگ جائے  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال ۶ سے ۲۰ طاقت تک  
 مدت اثر - ایک ہفتہ -



مسدود معاون ادویات  
ادویات متعلقہ - بیلاڈونا - فاسفورس - ششہ نمونیم -  
- بیلاڈونا - کیمفر -

فادر ہیز - اگنیثیا

امراض و اثرات

من  
نظام عصبی  
دماغ اور ریرہ کی ہڈی دھرا  
(Cerebro Spinal Axis)

IGNATIA بیتا

اشتداد مرض

عجم سے  
کھجائے سے  
جذبات فکر سے  
خوف سے  
کھلی ہوا سے  
ہول سے  
بدلتے  
چھوٹنے سے  
قہر کے استعمال سے  
تباک کے استعمال سے  
انخطاط مرض  
کروٹ بدلنے سے  
پہلو پر لیٹنے سے  
پیشاب کرنے سے  
تنہائی میں  
دبانے سے

علامات - غلطی آمیز متضاد یا اچانک اثرات و حرکات - اکثر تشدد آمیز -  
اور اکڑاؤ - ننھن - تشنج - کپکپی وغیرہ - دوران درد میں - تمام جسم میں جھٹکے سے لگیں - گولاسا



محسوس ہو۔ کسی غیر چیز کا۔ یا سخت دباؤ سا معلوم دے۔ ہٹیر یا ہو کسی جگہ درد ہو۔ زیادہ توجہ سے۔  
پیشاب سے۔ چونکنا پن۔ تیز جس۔ اعصابی گھبراہٹ۔ جلد جوش میں آجائے۔ متلون مزاج۔ مغموم۔  
تغیر پسند۔ کمزوری ہو۔ جلد بیہوش ہو جاتا ہو۔ کبھی آہیں بھرتا اور کبھی رونا ہو کبھی ہنستا ہو۔ صدمہ عشق۔  
مغموم رہنے میں ہی لطف محسوس کرے۔ غمزہ۔ پچھلی باتوں کو یاد کر کے افسوس کرے۔ کبھی کمر میں  
درد ہو۔ کبھی سر میں دسلی لوٹس۔ سرد درد جھائیاں ڈا بایاں یا تے آنے سے بند ہو جائے۔ پردہ پشم خشک معلوم  
ہوں۔ روشنی کی چمک سی دکھائی دے۔ بہت کھانستے کھانستے اندر سانس کرنا ہولناک کو متاثر کرے۔  
ناک کی جڑیں درد ہو۔ چھینکوں کا حملہ۔ ایک طرف کا رخسار سرخ ہو۔ جیرا بند ہو جائے۔ اندر نکال کو یا  
زبان وغیرہ کو کاٹے۔ بچنے کے جڑے کے پٹھے دیمسٹر، سخت ہو جائیں۔ یا ان پر چھوٹے چھوٹے زخم پڑ جائیں  
بڑے بڑے لقمے نگلتا چلا جائے۔ ٹھوس خوراک سے۔ بچکیاں لگ جائیں۔ خالی خالی یا کڑوی ذکائر بھی آئیں  
بھوک لگے۔ جی متلائے۔ کچی خوراک کھانے کی خواہش۔ معدہ خالی بیٹھتا ہو۔ محسوس ہو۔ یا رہ رہ  
کر درد اٹھے۔ کھانے سے آرام نہ پڑے۔ پافانہ تکلیف سے خارج ہو۔ خواہ نرم بھی کیوں نہ ہو متعدد میں  
کچاؤ محسوس ہو۔ عصبی مریضوں کی دل کی قیض۔ مقعد میں اوپر کو درد چڑھتا ہو۔ محسوس  
ہو۔ بوا سیر ہوئے بیٹھنے سے کایخ نکل آئے۔ حیض بے قاعدہ ہو۔ گہرے اور لمبے سانس لینے سے  
آرام محسوس ہو۔ دم گھٹا جائے۔ خلق ڈکا ہو۔ کھانسی کا دورہ بہت سخت ہو۔ جس سے دم ڈکا سا جائے خشک  
گویا مٹی سے یا گندھک کے دھوئیں سے دھسک اٹھے۔ کھانسی سے تالوں کچاؤ گھیکایا، نیچیاں۔  
گردن کی انس میں کچاؤ۔ پنڈلیوں میں بانٹنے۔ تشنج۔ پافل بیماری محسوس ہوں۔ جلد درد کرے۔ دہلنے سے  
یکایک بہت جھجھائیاں آنے لگیں۔ بیند اھی طرح نہ آئے۔ ذرا سی آہٹ سے بھی چونک اٹھے۔ سردی  
بہت محسوس ہو۔ لرزہ چڑھ جائے۔ عصبی گھبراہٹ۔ پیاس۔ درد گرمی لگے۔ کچھ اور غصے کو جی نہ کرے  
پیاس بالکل نہ ہو۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۶۔ سے ۲۰ تک

مدت اثر۔ ایک ہفتہ

ممد و معاون ادویات۔ نیشتر مہیور۔ فاسفورک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سیپیا۔ آرم میٹ

ادویات متعلقہ۔ سسی سی فوگا۔ نکس و امیکا۔ سیپیا۔

فاو اثر۔ پلسٹلا۔ کیو میللا۔ کاکونس

مخالف ادویہ۔ کوفیہ۔ نکس و امیکا۔



IPECAO

## ایپی کاک

امراض و تاثرات

اعضائے انضمام

معدہ  
جھلی  
اعضائے تنفسپھیپھڑے  
پھیپھڑے اور رطلق دینو گوشت  
اعصاب  
ریڑھ کے  
جلدی رکیٹینیس  
ناف

اشتداد مرض

گرمی سے  
مرطوب - گرم ہوا سے  
کمرے میںبرف یا گوشت  
زیادہ کھا جانے سے  
دقتیں بخاری اور بلی جلی  
غذاؤں سے

اوقات مقررہ پر

کونین کے استعمال سے

بہن مقررہ وقت پر نہ بولی مسروی یا گرمی

اخطاط مرض

تازہ ہوا سے

علامات بکثرت اخراج جھاگ والے اخراج۔ دست وغیرہ لگتا ناجی متلانا ہے۔ تھمے میں  
چھلکار خون آتا ہو۔ سانس اکھڑ جاتا ہو۔ بہت سی دیگر شکایتیں ساتھ ہوں۔ بچوں کا تشنج۔ چلانا اور روتا  
رہنا ہو۔ مشکل سے خوش ہو۔ سر جھکائے سے کچلے جانے کا احساس چہرہ زرد ہو۔ آنکھوں اور نونوں  
پر نیلا پن۔ پیاس نہ ہو۔ کینٹی میں درد ہو۔ دتے سے سردی سے۔ آنکھوں سے بہت پانی خارج ہو۔ دایاں  
کان سرد ہو۔ نکسیر آئے جھینکیں آئیں۔ زبان صاف یا لکڑ پر سرخ ہو۔ یکایک بیوش ہو جائے  
متلی بہت سخت ہو۔ تے آئے سے بھی آرام نہ پڑے۔ تے۔ پت ملی د جھکنے سے۔ خوراک سے نظر  
معدے میں ڈھیلا پن یا ڈوبا جائے۔ ناف کے گرد اینٹھن۔ نوچنے یا کالے جانے کا سا احساس  
خون آلود دست۔ خاکی۔ گھاس کے رنگ کے یا زردی یا بل سبز۔ آنوں کی گٹھلیاں سی ملی ہوئی۔ گلا پر موبے  
مکلیف۔ گلا اور چھاتی رکی ہوئی۔ ذرا سی حرکت سے۔ چھیش۔ پیشاب کے لئے زور لگائے۔ خون کے  
رنگ کا سرخ پیشاب۔ نیچے دانی میں کالے حواسے کا سادرد دایاں سے دایاں کو جائے، اخراج خون خون  
کے ہر اخراج کے ساتھ لمبا سانس لینے کی کوشش۔ آواز کی سنو میں تناؤ۔ اینٹھن۔ سانس لینے کے لئے  
کوشش کہ۔ دم متلی کا دورہ۔ دم گھوٹنے والی یا نہ ٹکنے والی کھانسی کا دورہ۔ ہر سانس



کے ساتھ کھانسی آئے۔ اکثر اٹھ ہو جائے۔ سرخ یا نیلا پڑ جائے۔ آخر میں گٹاؤک چائے یا تے ہو جائے۔ کھلی ہوئیں چائے سے گرمی اور آرام سے۔ چھالی میں ڈھیلے۔ (کچے) بلغم کی غرغراہٹ جو خارج نہ ہو بروکوٹھنہ۔ گردے میں سے ران کی طرف دھو جائے۔ بخوڑی بخوڑی تیر بعد سردی اور گرمی (ایپس) ایک ہاتھ گرم دوسرا ٹھنڈا۔ دیر تک گرمی لگتی رہے۔ پیاس نہ ہو۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پینے سے تریں۔ ہر مدارج پر مثلی۔ نزلے یا پت کا بخار +

مقدار خوراک اور طاقت۔ ۳۰ سے ۶۰ تک۔  
مذات اثر۔ ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ آرسینک۔ کوپریم سیٹ۔  
ادویات متعلقہ۔ اینٹیم نارٹ۔ لایلیا۔  
فادرزبر۔ آرسینک۔ چائنا  
مخالف ادویہ۔ چائنا۔ اوپیم۔

سیناپ کا زہر LACHESIS

استعداد مرض

سونے کے بعد  
صبح کے وقت  
موسم گرمیاں میں موسم بہار میں  
سورج سے  
گرمی سے  
کمرے میں  
مشروبات سے  
خالی نگانے سے  
مشروبات سے  
آذر اس ہاتھ لگانے سے  
دبانے سے  
احساس سے کپڑوں سے۔ گردن پر کمر پر  
ایپس۔ پرویم۔ گریفا۔ پینس  
رشور سے

لیکیبس

امراض و تاثرات

جلدی۔ واسو موٹر  
اعصاب  
ہمدرد سمیٹیک  
نیو موگیٹر  
خون۔ پیپیرے اور حلق کی نالی سے  
دل  
دورہ  
پیلے یا سفید طرف  
پھر دایں طرف  
خضیات الرحم  
امراض زنانہ  
سر کی چندیا



رکے ہوئے اخراج } ایام حیض کے شروع میں  
 شراب پینے کے تیز نشے سے  
 انحطاط مرض

کھلی سوا میں  
 رطوبات کے کھل کر خارج ہو جانے سے  
 سخت دبانے سے

متاثر حصے کو دھوئے سے

ٹھنڈی چیزیں پینے سے

علامات۔ مرض کا تیز حملہ سختی۔ مردنی شدت سبائیں جانب کی تکالیف۔ یاہیں سے  
 دائیں طرف جانے والی تکالیف۔ زرد پڑ جانا ہے گرمی کی قنما ہٹ۔ خون کا چڑھاؤ۔  
 گولا سا۔ حلق میں جگہیں پیٹ میں مقعد میں مثانی میں ہوا محسوس دے۔ حلق میں سخت درد۔ حلق  
 رکھا ہوا۔ حلق میں زخم مقعد میں ٹنگی۔ سناؤ جڑے میں مقعد میں۔ کپکپی زبان پر ہاتھیں۔ ذیابیطس۔ کلا کھل پھوٹے  
 یا پچی دھپاکی، کے اثرات۔ نیلا پن ساقوں کا۔ جن پیدا کرنے والے اخراج۔ دست وغیرہ۔ اخراج خون پتلا  
 سیاہ۔ ذرے ملا ہوا تکیس۔ خون آلود پیشاب۔ اوپر چڑھتے ہوئے احساسات۔ گلے میں آنکھوں سے  
 چوٹی کی طرف گردن سے اوپر کو۔ نلوں سے دل کو۔ سردی۔ سخت دھک دھک دھکم دھماؤ۔ مرگی اعصابی  
 گھبراہٹ۔ بیکواس۔ بے تعلق۔ غم آلود۔ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا۔ دم میں پھٹنے رہنا۔ اصرار۔ غلط  
 دے بنیاد خیالات۔ بیداری پر آداسی۔ حسد۔ مشبہ۔ زہر آلود احساس۔ سستی۔ سر جکانا۔ دایں  
 طرف پھرنے سے۔ سر میں سخت درد۔ پھٹنا جائے۔ ناک تک اثر ہو۔ دائیں طرف کٹی جائے۔ کان تک جائے۔  
 آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ زکام رکھا ہو۔ کھانسنے کے ساتھ رطوبت خارج ہو۔ خون بھی آئے۔ ذایقہ مرج کی مانند چرپرا  
 رہے۔ حلق میں سخت درد ہو۔ کان تک جائے۔ کڑے کا کالر کھلا رکھنے کی خواہش ہو۔ حلق میں گرم گرم  
 گولا سا معلوم دے۔ نکلنے میں تکلیف ہو۔ غلطی ہو۔ ناک میں سے آجائے۔ دوران حمل میں قبض رہے۔ بواہیر  
 ہو۔ کھانسی سے۔ ہانسی سے۔ درد کپڑا آٹا رہنے کے لئے پتھری (ایگرکس ایڈم) چہرہ سرخ گرمی میں  
 دھندلا سا۔ چہرے میں درد منہ میں چھالے۔ گاڑھا گاڑھا ٹھوک بہت خارج ہو۔ زبان دانتوں سے کٹ جائے  
 بولنے میں بہت غلطیاں ہوں۔ منہ یا ناک کے سامنے کچھ بھی برداشت نہ ہو۔ سیاہ رنگ کا خون حیض ہوا



کم مقدار میں اخراج ہو۔ سونے کے لئے لیٹنے سے دم گھٹے۔ لمبے لمبے سانس لے۔ گویا کہ ہوا کا بھوکا ہے۔ گلے میں گھر گھر اہٹ والی اور دم گھٹنے والی کھانسی لے گردن ہملائے سے اور تھوک خارج ہونے سے۔ دل کمزور ہو۔ گویا الٹ گیا ہے۔ یا بڑھ گیا ہے۔ جلد سرخ پھٹی ہوئی۔ سیاہ دھبوں والی۔ گھٹنے ٹھنڈے ہوں۔ پیروں میں ٹھنڈا پسینہ آئے۔ خوفناک خواب دکھائی دیں۔ سانپ وغیرہ نظر آئیں۔ گرمی چند یا پر پسینہ لگے۔ پر سوتے ہوئے۔ سرخ بیباہ۔ اسن کی بدبو والا۔ پیاس ہو۔ پانی پینے سے ڈر لگے۔ ایسی کئی شہریں میں دریا کھنچ مقعد سے ناف کی طرف درو جائے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال ۸ سے ۱۰ تک مدت اثر تین ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ آرسینک کلکیر یا کارب۔ تار بوئج۔ ہیرپرف۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفور۔ زینک۔ آئیوڈائنڈ۔

ادویات متعلقہ۔ کاشکم۔ سیپیا۔ زینک۔

فاو اثر۔ آرسینک۔ مرکبوس۔ گرمی۔ الکول۔ سالٹ

مخالف ادویہ۔ امونیا کارب۔ ڈلکامارا۔ نائٹرک ایسڈ۔ سیپیا۔

LYCOPodium

لائیکوپوڈیم

امراض و تاثرات

اعضائے انضمام

پرورش جگر جلد

اعضائے پیشاب

وائیں سے بائیں جانب گلا چھاتی

جانے والی تکالیف خضیات الرعم دسلے

دماغ

پھیپھڑے

اشتداد مرض

کپڑوں کے دباؤ سے

گرمی سے } جانگنے پر } آندھی میں

کھانے سے۔ شکم پری کی حد تک۔ کستور پھلی

یا صدف۔ بدھضی سے۔

۴ بجے شام سے ۸ بجے رات تک

اخطاط مرض

گرم مشروبات سے

کھانے وغیرہ سے



نامکمل پستان میں درد زخمی سے محسوس ہوں بکاتھ (بائین)، پھوٹا دایئیں، سکیپولائیں، لیبلہ سا گردن سخت  
 ماتھ بے حس۔ ماتھوں پیروں میں تشنگ۔ سوتے ہوئے انگلیوں میں۔ انگلیوں پر چپ دالپینہ۔ درد سے ٹانگوں  
 کے اوپر جھٹکا لگے۔ گھیا پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آگیا۔ پھر سو جائے۔ دایئیں ایٹری میں۔ پیروں میں جلن والا  
 پسینہ۔ خشکی ہتھیلیوں میں۔ نلوں میں۔ جلد میں۔ رطوبت توں میں۔ پستان کی گھنٹی پر۔ منقحہ میں پھوٹتے  
 ہوئے پھوٹے۔ آرام سوتے ہوئے پھوٹے۔ چھپکا یا پتی۔ چھالے دار سوزش ماتھ ہوا پھوٹا دالپینہ  
 سے پیلے رگ ٹوٹ جانا۔ بیض تیز دکھانے کے وقت شام کو۔ سردی۔ نم تپسی۔ سر میں جلن میں حد سے  
 ایک پیر میں دکھانسی سے۔ لرزہ۔ بعد میں تپ۔ پہلی نیند کے بعد۔ جلن سکیپولائیں۔ پیروں میں پسینہ۔  
 پیاز کی سی بو والا۔

مقدار خوراک و طاقت ۴ سے ۶ تک۔

مدت اثر۔ پانچ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ کلکیریا کارب۔ آیوڈین۔ کالی کارب۔ لیکیس۔ پاشٹلا۔ فاسفورس  
 ادویات متعلقہ۔ کلر بوتج۔ سلیشیا  
 فاؤرہر۔ کیمفر۔ کاسٹم۔ پاشٹلا۔  
 مخالف ادویہ۔ نکس۔ موسک۔

پارہ MERCURIUS

امشداد مرض

رات کو۔ رات کی ہوا سے

پینے سے

دائیں کروٹ لیٹنے سے

گرمی سے اگر آگ سے یا ہست کی گرمی سے

ہوا کے جھونکے۔ خصوصاً سر کو

تبدیلی خند صابرا لہو مطلق یا ہست طوبیج سے

سردی لگ جانے سے

سردی اور گرمی سے

مرکوریس

امراض و تاثرات

خون

بغداد جھتی

بفعل

محالوں کے اندر کل طرف

(Buccal)

سیلوری یعنی متھوک پیدا کر نیوا غدد

حلق کے غدد و ٹونسٹل یعنی گلے کے غدد

لمفٹکس رطوبت پیدا کر نیوالے غدد

جگر۔ گردے۔

میوکس۔ لعاب پیدا کرنے والے غدد

اعضا کے متناسل



مسام دار پیتھ

جوڑ

ہڈیاں

جلد

پیر تر ہونے سے۔ آگ روشن ہونے سے

اختطاط تکلیف

معتدل آب و ہوا میں

**علامات** بہت سی علامات مختلف قسم کی ہوں۔ غیر یقینی علامات۔ کپکپی۔ کمزوری۔ پسینہ۔ سوزش۔ سرخی۔ نیلگوں انجماد۔ مسلسل اخراج۔ نمی۔ آواز اناہ اخراج۔ پتلا۔ لیسدار۔ جلن پیدا کرنے والا۔ تلخ۔ غلیظ یا گاڑھا۔ سبزی مائل زرد۔ پیکا۔ خون آلود۔ زخم لعا یا بھلی کا۔ نزلہ۔ غدد وکی سرگرمی مثلی۔ ایک ہی جگہ تکلیف۔ آتشک۔ ہر ایک چیز بہت چھوٹی معلوم ہو۔ خنازیر۔ عجلت پسندی۔ بکھر پٹ زبردست رجحان و قتل عمد کا، آہرہ خطرے کا احساس۔ فراموشی۔ سر کے گرد ایک ٹی سی کا احساس۔ درد رنج ہو۔ زبان میں لکنت ہو۔ سردی کے ساتھ دھنوں میں بھی درد ہو۔ جس کی ٹیس کان تک جاتی ہو۔ آنکھیں کھچی جاتی ہوں۔ روشنی سے ڈر گئے۔ دلپ کی روشنی میں دھنوں میں گرمی پہنچنے سے ستانی کم دے۔ سردی اوپر چڑھتی معلوم ہو۔ یا آنکھ پر۔ دکام۔ جلن دار۔ پیپ جیسا اخراج ہو۔ موسم خزاں میں۔ ناک بھاری۔ سرخ۔ تر۔ گندے تھکنے۔ چہرہ زرد ہو۔ اسے بھرا ہوا۔ آنکھوں کے نیچے۔ حلق میں۔ رخساروں پر سوزش ہو۔ جڑے میں درد۔ مسوڑوں سے خون جاتا ہو۔ ہونٹ پھٹے ہوں۔ دانت ڈھیلے۔ کھوکھلا۔ سیاہ۔ درد کرتا ہو۔ دگر می یا سردی سے درات کو۔ تھوک بہت بہے۔ سوئے ہوئے۔ زرد رنگ کا۔ خون آلود۔ عضو تناسل میں سوزش ہو یا اگلی کھال میں۔ خون آئے۔ سوزاک ہو۔ ابتدائے حیض میں ہی ہیوش ہو جائے پیشاب سے گاڑھی سفید رطوبت خارج ہوتی ہو۔ کھانسی ہو۔ دودھ دفعہ۔ خشک۔ رات کو سبزی مائل زرد بلغم بدن میں۔ دائیں چھاتی کے نیچے تکلیف ہو۔ پستان۔ درد دائیں کے نیچے۔ کمر میں ٹیس اٹھے۔ حیض کی بجائے پستان میں دودھ۔ دودھ خراب ہو۔ جاگ پڑے۔ دل کا نپ کر۔ عضو کا نہیں۔ انگلیاں بے حس ہوں گردن سخت ہو۔ پیروں میں صبح کے وقت ٹھنڈا پسینہ آئے۔ ایڑیاں ٹھنڈی رہیں۔ جلد زرد ہو۔ نرم ہو۔ درد کمرے۔ مرطوب ہو۔ کھرنڈ دار پھنسیاں ہوں۔ زخم ہوں۔ بے قاعدہ۔ کم گرمے۔ خون آلود۔ گوشت کٹا ہوا۔ حرام گوشت۔ سیرقان۔ خسرو۔ رات کو ہڈیوں میں درد۔ گرم یا سطح کے نیچے۔ غلبہ حرارت۔ سرور چھاتی پر۔ بے چینی۔ ذرا سی محنت سے۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ یا گرمی چڑھ جائے۔ باری باری سے سردی اور گرمی لگے۔ سردی ٹھنکی ہوئی معلوم دے۔ نزلہ اور بخار۔ اخراج دب جائے سے۔ بہ آسانی ویکار



پسینہ مگر آرام نہ دے۔ درد ہو۔ چکنا چکنا۔ گندا جرش۔ پکے زرد رنگ کے دھتے ڈالنے والا سر پچاتی  
 پردات کے وقت۔ موندیں چھلے۔ دھاتوں کا سا ذائقہ۔ جوڑی پھولی ہوئی۔ ٹرائے دار زبان تالو  
 میں کھلج۔ بڑھے ہوئے ٹونسلز۔ حلق میں خراش۔ جگر میں درد۔ قبض۔ پاخانہ تکلیف سے کم خون آلود  
 سبز جھاگ دار سفید راکھ جیسا۔ جلن سے۔ مرد سے یا سردی سے پیشاب بہت آئے۔ پانی کم پئے  
 بار بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے۔ جلن ہو۔

مقدار خوراک ۲ سے ۳ تک۔

مدت اثر۔ دو ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ آرمیٹ۔ بیڈیاگا۔ سیلاڈونا۔ سیپ سلف۔ سیپیا۔ سلفر  
 ادویات متعلقہ۔ کالی آیوڈائیڈ

قادر اثر۔ نائٹک ایسڈ۔ کاربووٹیج۔ آرمیٹ۔ سیپ سلف۔ سلفر تھیوجا  
 مخالف ادویہ۔ لیکسیس۔ سیلیٹیا۔

نمک طعام

NATRUM MUR

نیٹریم میور

استعداد مرض

امراض و تاثرات

وقت  
 ۹ بجے سے ۱۱ بجے صبح تک  
 طلوع آفتاب کے ساتھ  
 معین پر  
 ایام حیض کے بعد  
 لائیدن چھوڑ کر دو سڑن دیکھ چاٹا  
 سورج کی گرمی سے  
 گرمی سے  
 موسم گرمی میں  
 مرطوب ہوا سے  
 محبت سے  
 فاعلی کام کرنے سے  
 آنکھ پر زور دینے سے  
 جذبات کی تندگی سے

نظام انتظام  
 دماغ  
 پرورش  
 خون  
 عضلات  
 من  
 دل  
 جھلی (میکس)  
 غدود  
 طحال (تلی)  
 جگر  
 جلد



ہمدردی سے۔

ایام شباب میں

کوئین کے استعمال سے

مزمن موسمی بخاریا لیریا پرانے سے

چاندی کے کھار (Silver Salts) سے

انخطاط مرض

کھلی ہوا سے

ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے

پسینہ آجانے سے

آرام کرنے سے

صبح کا کھانا کھانے سے پہلے

گہرا سانس لینے سے

**علامات**۔ مریض دبا پتلا ہو۔ پیاس زیادہ ہو غذا کی کمی ہے۔ سوکھا۔ اوپر سے نیچے کو دل گردن  
یا پیٹ۔ خون کی کمی خشکی جلد پر اور رُمنہ میں جلق میں۔ مقعد میں۔ خستہ الرحم میں۔ انگلیوں میں۔ کیچی جلدی  
سے تنک کر جائے۔ جلدی سردی لگ جائے۔ اعصابی (Brethism) خرابی گھاڑا۔  
سفید شفاف۔ چرم مرہٹ والا۔ ٹھیک وقت پر۔ ناقابل تشفی۔ جلدی غصہ آئے۔ تسلی بخشی دینے  
سے۔ ٹمکیں۔ علیحدگی پسند۔ صحت ناپسند کرے۔ مراق۔ خوب روئے۔ زور زور سے اظہار پنج کرے  
خیالات پر اگندہ رہیں۔ ایک بات کا بہت خیال رہے۔ نیند نہ آئے۔ انتقام کی خواہش پیدا ہو۔ فکر خوف  
ڈاکوؤں کے خواب۔ سر جھکائے۔ گویا گرجا رہا ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر۔ سرد درد گویا کہ تھوڑے پر رہے  
ہیں۔ بھاری ہو۔ سر جھوٹا جا رہا ہو۔ دیوانہ کن۔ آنکھوں کے اوپر یا چند پا پر۔ جاگنے پر۔ قدرے جیتی  
یا نظر میں خرابی۔ پڑھنے سے۔ حرکت سے۔ خواہ آنکھوں کی حرکت کیوں نہ ہو۔ آئے آنکھ دبانے سے۔  
بال جھڑتے ہوں۔ آنکھیں پاس کو کھینچی جاتی ہوں۔ جدھر درد ہو اور صبر کی آنکھ سے آنسو بہیں۔  
چھینک لینے پر۔ کھانسنے پر۔ آنکھیں بند ہو جائیں۔ دھندلی۔ چیز حرکت کرتی دکھائی دے۔  
انفاظ مل جائیں۔ چیز ادھی دکھائی دے۔ پھر سر میں درد ہونے لگے۔ ناک کی ہوٹی۔ غلے الصبح  
چھینکس آئیں۔ کپٹی۔ ناک بے۔ کبھی خشک زکام ہو۔ ناک میں چھوٹے چھوٹے زخم پڑ جائیں۔ چہرہ غدد



کچھ کے رنگ کا چکنا۔ ہونٹوں کے گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ بابا لوں کی جڑیں موتی کے  
 دانوں جیسی۔ پچلی جڑے میں پھرک دکھانے سے سردی اور گرمی۔ کھنگارے سے بڑی بلغم نکلتے۔  
 تلخ ذائقہ والی۔ زبان میلی۔ کنارے پر موتی جیسے۔ یا لکیریں سی۔ ذائقہ اور خوشبو نہ معلوم  
 دے۔ اوولوا یعنی کو ایک طرف کو لٹکا ہوا۔ گلا ایک جگہ خشک ہو۔ یا زخم ہو۔ وہاں سے دھسک سی  
 اٹھے اور کھانسی ہو۔ پیاس۔ بہت پانی پیئے۔ بھوک بہت لگے۔ مگر پھر بھی سوکھتا ہی جائے۔  
 بھوک نہ لگے۔ منک کی خواہش ہو۔ روٹی اچھی نہ لگے۔ جلتی جلتی ڈکاریں آئیں۔ کھانے کے  
 بعد منہ میں پانی بھر بھر کر آئے۔ ایسی گیسٹرم میں ٹروپ معدے کے متعلق تھکرات (Anxiety)  
 پیٹ تننا ہوا۔ چڈھے (Prostate) خشک سخت بکڑے بکڑے ہو۔ کہنوالا پاخانہ۔  
 مقعد میں جلن۔ چمکدار آنکھوں میں لپٹا ہوا تیسرے دن آئے ہر آنے دست۔ پیشاب میں سرخ  
 ذرات۔ مباشرت پر درد۔ ناگوار۔ بعد میں کمر میں درد۔ ٹانگوں میں کمزوری۔ طبیعت گرمی گرمی جائے۔ وبا  
 ہو اسوزاک کمزور کرنے والا سیلان الرحم بجائے ماہواری کے۔ کھانسی۔ ایسی گیسٹرم سے دھسک  
 اٹھ کر دمبیا دھڑکن کے ساتھ۔ سردی سے سانس لینے کی نالی میں تزلزلہ۔ پسینہ دب جانے سے  
 دل کی دھڑکن سارے جسم کو ہلا دے۔ باری باری سر میں اور دل میں دھڑکن ہو۔ پھر پھڑکے کمزوری  
 دجوش سے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے۔ یا حرکت سے۔ گردن کے عضلات میں درد۔ کمر میں درد۔ علی الصبح  
 د کھانسی سے بے چت لیٹنے سے۔ دباؤ سے۔ انگلیوں کی نوکیں پھٹی ہوئیں۔ گھٹنے پکڑے سے جائیں  
 نیندیں سسکیاں بھڑنا۔ بیداری پر کمزوری کا احساس۔ جلد چکنی۔ خشک سخت۔ میلی۔ غیر  
 تندرست۔ زرد پھٹی ہوئی۔ بریشک (Herretio) پھنسیاں دلچک سے ٹھنڈے ہاتھوں  
 میں پیروں میں۔ دل میں۔ صبح کے وقت پیاس کے ساتھ۔ پسینے ٹھنڈے۔ کم۔ بالوں کے سرے  
 پر۔ ناک پر۔ چہرے پر۔ کھانا کھاتے ہوئے۔ (کیو میلا)  
 مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال ۱۲ سے ۳۰ تک یا اوس سے بھی اونچی طاقت کی  
 مدت اثر۔ چار ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ ایپس۔ آر جیٹم ناٹھرکیم۔ انیشیا۔ سیپیا  
 ادویات متعلقہ۔ پاشلا۔  
 فادر ہر۔ آر سنیکم۔ فاسفورس۔ ڈلکامارا۔



## شورے کا تیزاب

NITRIC ACID

## نائٹریک ایسڈ

## امراض و تاثرات

ذرائع  
اخراج  
کے کنار

غدد  
پر اسٹیٹ

تھوک پیدا کرنے والے غدد (سلسلہ)

خون

جلد

ہڈیاں

تلی دار اعضاء (Tubular Organs)

استد اور مرض  
چھوٹے سے۔ دھماکے سے  
ذرائع  
گھاڑی کے پیوں کی آواز سے  
(شور سے)

حرکت سے۔ پارے کے ہتھال سے  
کھنڈ سے۔ کھنڈی ہوا سے  
رات کو بیداری سے

تبدیلی موسم سے

صدہ سے

دماغی محنت سے

اخطا ط مرض

سبک حرکت سے

معتدل موسم سے

مستقل دباؤ سے

گھاڑی میں سفر کرنے سے

علامات سب اکل مردہ محسوس کرے۔ پیکلی آئے۔ تیز جس ہو۔ زخمی۔ پھانس سی لگی ہوئی۔ ناسوں  
جیسی کھرجن یا جلن۔ اخراج چرم اسٹ کرنے والے۔ رقیق اور گندے۔ سرخی پیدا کرنے یا  
بال اڑنے والے۔ پیس (ناک کی ایک بیماری جس میں بو نہیں آتی) پیروں میں یا رات کو گندے پیسے  
اخراج خون بہ آسانی۔ چمکدایا خون آلود پانی سا۔ سرخ۔ سوزش یا پھٹے ہوئے کنارے۔  
سخت ہڈیوں کے ریزے سے۔ سیاہ۔ چکنی لعابدار جھلی۔ چاروں طرف بند سا بندھا ہوا یا  
بوجھ سا لگتا ہوا معلوم دے۔ دو کھن یا سختی۔ دردوں میں۔ جوڑوں کا چٹخنا۔ گندمی رنگ  
کے مریض۔ حقارت و نفرت آمیز عادات۔ الحاد پسند۔ غصہ میں کانپنے لگے۔ جھگڑا۔ الو۔ سرسامی۔  
روحوں سے بات چیت کرتا ہوا معلوم دے۔ غیر زبانوں میں بات چیت کرے۔ گھبراہٹ ظاہر کرے



باتیں بھول جائے۔ سر میں کچلے جانے جیسا معدلہ لڑپنی کے دباؤ سے۔ کھوپری میں زخم چند یا میں ہول کے جھونکے  
 کا سا احساس۔ آنکھوں پر گرم گرم تپنے کا سا احساس۔ بہرہ پن دشور سے۔ ناک سرخ۔ نوک پر خاک  
 سی لگی رہنا۔ ہتھی ہوئی سخت تکلیف۔ ہڈی گل جانا۔ زکام سانس جھوٹا آنا چہرہ زرد رنگ ہو گویا بیماری  
 میں مبتلا رہتا ہے۔ ہونٹوں پر سے چھلکے اتریں۔ پھٹے ہوئے۔ پٹنے ہوئے۔ گھائیوں میں کھلی۔ دانت  
 ڈھیلے ہوں۔ مسوڑھے پھولے ہوئے زخمی۔ اندر خون بہتا ہوا۔ ترپٹی ہوئی۔ میلی زبان۔ دقلورک ایسڈ سولڈٹم  
 رال بہت بچے تالوں زخم۔ گویا خلق میں کچھ اٹکا ہوا ہے۔ چربی جلی چیزوں کی خواہش۔ پاخانہ نرم ہونے پر  
 بھی مقعد کو چیز تار ہوا خارج ہو۔ دیر تک تکلیف جاری رہے۔ بوا سیریز تکلیف۔ پیشاب گھوڑے  
 جیسا سخت بدبودار ہو ٹھنڈا کبھی کم کبھی زیادہ۔ گردے سے مثانے کی طرف تشخ۔ پیشاب کی نالی میں  
 گویا کسی نے گرم تار چلا دیا۔ گردے میں وبا کی اثر۔ اگلی کھال میں خارش۔ جلن۔ زخم کی نلی سے خون آلود پانی  
 کا اخراج۔ کمزور بے قاعدہ حوض۔ چھاتی توڑنے والی کھانسی۔ تالو سے اٹھے۔ کمزور درد کرے ٹھنڈ  
 سے بلغم لیسدار۔ پیپ جیسی۔ چھاتی پر گرمی۔ دھڑکن۔ خوف۔ اگلیوں کی گائٹھوں پر سوزش۔ منے۔ ہاتھوں  
 کی مٹھے پر۔ گتے کمزور۔ جلد خشک ہو۔ پٹھی ہوئی۔ ہر ایک گھائی میں بوائی۔ پنڈلی کی ہڈی پر تانبے کے رنگ کے  
 دھبے۔ کپڑے اتارنے کے بعد خارش۔ ناسوری زخم تیز۔ کھردراؤ اور گوشت والا۔ یا پیپ کی کیل دار  
 دیر میں بھرنے والا گلاؤ۔ کھودنے والی پیپ۔ بھگندہ۔ ناسور۔ آتشک۔ ٹوٹی ہوئی بوائیاں۔ ہڈیوں میں درد  
 یا زخم۔ تپ فوق میں بغض ہر چھاتی ٹرپ پر گرتی ہو۔ دندانے دار یا نرم سے دینی سی گریا۔ تھیو جا۔  
 اور (Condylomata) - سخ جیسی سردی تلوقوں میں۔ پینہ بہ آسانی۔ بعد از سردی  
 لک جائے۔ بہت کمزور کرنے والا۔ اور پینہ لانیو لاشیاب صبح کے وقت۔ بغلوں میں پیروں میں۔

مقدار خود پاک و طاقت زیر استعمال ۶۰ درجے کی یا زیادہ

مدت اثر۔ چار ہفتے

ممد و معاون ادویات۔ آرسنیکم۔ آرم ٹرافولیم۔ کیلے ڈیم۔ کلکیر یا کارب۔ لائکو پوڈیم۔ تھیو جا

ادویات متعلقہ۔ آرسنیکم۔ کالی کارب۔ کریوزوڈیم۔ مرکریس۔

فاو اثر

مخالف ادویہ۔ لیکیس۔



NUX VOMICA

## نکس و امیکا

## امراض و تاثرات

دماغ اور ریڑھ کی ہڈی

(Cerebro Spinal Axis)

اعصاب

معدہ  
اعضائے انضمام جگر  
آنتیں

اعضائے تنفس

گندمی رنگ والے مرد

## اشتداد مرض

علی الصبح

کھلے سواپیں دھشک  
سردی سے  
سہولے جھونکے سے نشست سے

آندھی سے  
کیڑا او تر جانے سے

قہوہ پینے سے  
مٹھائیاں کھانے سے  
امیرانہ زندگی سے  
عیشانی و اوباشی سے  
بکثرت زنا سے  
بکثرت پھسل لینے سے

نشست کمینہ عادات سے بھیا خوری سے

محنت سے  
تنگ آجانے سے  
دماغی

پیند خراب ہوتے رہنے سے

خفگی سے  
شور سے  
نہایت معمولی معمولی بدلو سے  
روشنی سے

وجوہات سے

چھو جانے سے  
دباؤ پڑنے سے  
کیڑوں کے دکر پہ

## افادہ مرض

بکثرت اخراج سے

آنکھ لگ جانے سے (کالی بایکارب)



سر پٹنے سے۔ آرام کرنے سے  
گرم مشروبات۔ دودھ سے مرطوب ہوا  
علامات تیز و تشدد آمیز حرکات۔ اکثر درے سے آگے۔ بیانا قابل کردیں۔ اینٹھن ہو۔  
جھٹکے سے لگیں۔ برقی چمک کی طرح اٹھنے والے درد۔ اعصابی درد نیوریلجیا، خراش کی سی تکلیف  
پیٹ میں۔ خلش میں وغیرہ وغیرہ۔ اندرونی کھجلی۔ گلے میں۔ حلقوم میں وغیرہ۔ سردی لگ جائے  
مثلی ہو۔ چالاک۔ غصہ و راور بے صبر۔ درد برداشت نہ کر سکے۔ دیوانہ سا ہو جائے۔ چلائے  
بہت سرگرم ہو۔ جلدی گھبرا جائے والا اور جوش میں آجائے والا۔ اونگھنا۔ انتقام پسند۔ جلد  
ناراض ہو جانا۔ وہمی۔ اداس۔ افلاس کا خوف۔ تشدد پسند۔ خود کشی پر آمادہ۔ جذبات کا غلام۔ سر  
چکنا۔ خالی پیٹ۔ چند یا پر تیز جس۔ پیشانی پر سوزش۔ آنکھوں سے پانی بہنا۔ تکلیف والی طرف۔  
سرخ آنکھیں۔ متھنے زخمی سناک رکی ہوئی مگر پانی نہیں۔ ایک طرف چھینکیں۔ بہت تیز۔ اچھی طرح نہ  
آئے (بائیں) متھنے میں چوٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوں۔ کمر کا ہونٹ میں کھلی ہوا میں بے۔ رات کو  
خشک۔ قوت شامہ (سو گھٹنے کی) تیز ہو۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہو۔ زردی نائل۔ بائیں طرف کا مونہہ  
لٹکا ہوا۔ جڑا بند ہو جائے۔ سخت ہو جائے۔ دانت کٹکٹائے۔ ذالقیہ تلخ۔ ترش صبح کے وقت  
خراب تالو میں کھجلی۔ حلق میں کھجلی۔ کھرجن۔ سچکی بہت تیز مثلی والی۔ کھانسنے اور بلغم نکلنے کی کوشش  
سے ڈکاریں ترش۔ دل جلانے والی۔ مونہہ میں پانی بھر بھر آئے۔ جی تھلائے۔ صرف تھے کر لے  
سے بہت تیز تھے پت آلود کڑوی ترش۔ خوراک معدے میں بھاری بوجھ کی طرح چڑی ہے  
صفراوی درد۔ کمر میں چھاتی میں کٹے کرنے سے۔ گویا کمر میں بیٹی سی بندھی ہے۔ کپڑوں سے  
بدبھنی۔ جگر چھوٹنے سے درد۔ بڑھا ہوا۔ پتھری کی وجہ سے درد تو بچ۔ آسترٹیوں میں جو کھن  
دکھانے سے یا قدم قدم چلنے سے۔ بچوں کے فوٹے بڑھ جانے۔ پیٹ پھول کر درد تو بچ  
ہونا۔ بیقرار رہی۔ ٹھیر ٹھیر کر۔ پاخانہ پھرنے کی بے سود کوشش۔ پاخانہ آجانے سے آرام  
پاخانے کے لئے بہت زور لگاتا پڑے۔ مقعد میں گوز آتا آتا تک جاسکے۔ محسوس ہو۔ گویا اور پاخانہ  
آگیا۔ مروٹہ۔ دائمی قبض۔ بوا سیر کھجلی۔ ٹھنڈے غسل سے۔ جلق۔ سرط۔ انزال جیض بکثرت  
یش از وقت۔ دیر تک یا رک رک کر۔ سیاہ گھیلیوں دار خون کا اخراج۔ تکلیف اور اینٹھن تمام  
جسم میں پھیلی ہوئی۔ کھانسی بہت تیز اور تکلیف دہ۔ کھانسا کھانسا گر پڑے۔ کالی کھانسی گردن  
میں سختی اور درد۔ دائیں، کندھے کے نیچے درد۔ کمر کا درد۔ گویا کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ کمر وٹ لینے



کے لئے اٹھنا پڑے۔ نہایت تیز لمبیگو (درومکر) ریڑھ کی ہڈی کی طرف چلنے والا پیر کی انگلیوں سے ران کی طرف آنے والا کے پاقانہ آنے کے بعد پنڈلیوں اور تلوؤں میں سخت مروٹیا پائے۔ فیل پا پیر پٹھے ہوئے۔ یرقان۔ جمبھائیاں آنا۔ شام کو غنودگی کثرت خیالات کے باعث بے خوابی بہت جلد سویرے کو کھل جائے پھر نیند نہ آئے۔ اگر سو بھی جائے تو جاگنے پر طبیعت بہت افسردہ سی رہے۔ خوفناک خواب دیکھ کر بڑبڑانا۔ یہ آسانی سردی لگ جائے کپڑا نہ اتار سکے حرکت سے خواہ گرمی ہی کیوں نہ ہو ترش بودار پینے۔  
مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال۔ اسے ۳۰ تک یا ناید  
مرد اثر۔ ۲ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ براونیا کیومیلا۔ کوئم۔ کالی کارب۔ فاسفورس پشلا  
سیمپا۔ سلفر

ادویہ متعلقہ۔ اگنیشیا۔ لائیگو پوڈیم  
مخالف ادویہ۔ ایسک ایسڈ۔ کاسٹم۔ اگنیشیا۔ نکس موسک۔ زرنم

## PHOSPHORUS

## فاسفورس

## امراض و اثرات

اشتداد مرض >	خلا
بائیں کروٹ	پھیپھڑے
تکلیف دہ پہلو پر	دل
چٹ	خون
جذبات میں سہجان	خون کی نالیاں
معمولی سی	شریانیں
بات چیت سے۔ چھوٹے سے	معدے کی
وجہ سے	انتڑیوں کی
بڑے۔ روشنی سے	نعالیدار جھیلیاں
ہاتھوں کو پانی لگنے سے	پھیپھڑوں کی (پچھلے حصے)
کھلی ہوئیں۔	گرم



نک سے۔ شباب میں  
اچانک تبدیلی سے  
موسم  
آندھی۔ سردی سے  
طوفان باراں

صبح و شام  
دماغی تکان

انخطاط مرض

کھانے سے  
خوراک  
سولنے سے  
پانی  
سردی سے  
مُنہ کو  
ماش سے (منفطایسی اثر سے)  
بیٹھ جانے سے

دماغ  
اعصاب  
(Cord)

اوپر کے جڑے کی ہڈی  
پندلی کی ہڈی  
ریڑھ کی ہڈی  
جگر

**علامات۔** روز افزون کمزوری۔ جس کا انجام کسی سخت یا نہایت تیز بیماری میں ہو۔ ڈانٹولا، بار بار ہونیوالی نکالیف۔ سردی۔ کھانسی (کروپ)، اخراج خون وغیرہ چمڑے والے۔ ناسور یا زخم سے خون بہہ نکلنا۔ سٹراؤ۔ دل یا پیپھیٹروں کے امراض کے اثرات۔ یلندہ بالا نشانہ زووجس۔ نازک تپ ذق کار حجان۔ کمزوری کے حملے۔ جوڑوں میں د ماحت سے۔ خالی خالی ہونے کا احساس۔ چھاتی میں معدے میں۔ حواسات نہایت تیز حد سے زیادہ تھکان۔ تنناؤ چھاتی میں (بائیں) کھانسی وغیرہ میں۔ دھتے جن میں درد یا جن ہو۔ اندرونی فلج۔ گلے میں۔ متعبد میں۔ اندرونی خارش۔ دھسک۔ دھڑکن۔ کہیں کہیں بے حس۔ تبدیلی موسم کا تیز احساس۔ مجبیتی۔ لیکن جلد جوش میں آجائے۔ یا بہ آسانی ناراض ہو جائے۔ متفکر۔ تھائی میں۔ یا طوفان سے دمے بھر میں چکر آئے۔ بہت سی علامات سمیت۔ بہتا پھر نہیلا۔ جاگنے کے بعد۔ گھومتا ہوا۔ کے پاخانہ پھرنے کے بعد۔ سر بھاری رہے۔ ایک آنکھ کے اوپر درو کرے۔ بھوک لگے۔ بچوں کو دہیں کروٹ لیٹنے سے۔ کے سردی سے۔ کنپلیاں جلتی ہوں۔ ماتھا ٹھنڈا ہو۔ چند یا میں تڑپن ہو۔ سر میں پھیپاس ہو۔ گینج کے نشان ہوں۔ آنکھوں سے پانی بے۔ آندھی میں لہسارت چمکار سے سرخ ستر سیاہ۔ کے سائے میں تنگ نظری۔ کانوں میں گونج یا تھر تھر ہٹ۔ انسانی آواز کی طرف سے



بہرہ پن۔ کان میں درد۔ ناک پھر کنا۔ زکام ہے۔ رُکی ہو۔ سوزش ہو۔ زخم ہو۔ خلا ہو۔ نکسیر ہے  
 نوجوان کو بعد میں نمونیا کھانسی کے چھینکیں آئیں۔ بو سے۔ سردی ناک سے نچنے کو آرتی  
 ہوئی معلوم دے۔ سونگھنے کی طاقت تیز ہو۔ ناک اور مونہ پر زردی۔ تبدیلی پذیر مریضوں کا  
 ساچرہ۔ آنکھوں کے گرد گڑھے۔ نیلے حلقے۔ دانت بے جس۔ سوڑے زخمی۔ مرکزی دانتوں کے  
 پیچھے۔ تالویں خارش۔ تلخ ذائقہ اور ڈکاریں۔ حلق میں روئی جیسی لگتی ہوئی معلوم دے۔ ٹھنڈے  
 مشروبات پینے کی خواہش ہو جن سے تکلیف بڑھے۔ تھوڑی دیر میں تپ ہو جائیے۔ مونہ  
 میں پانی بھر بھر آئے۔ بھوک خوب تیز ہو۔ رات کو دورے سے پہلے۔ ناک کی خواہش ہو۔ جب  
 دیا جائے تو انکار کر دے۔ بعد میں جلن دے کھانے سے۔ کوڑی کے اوپر دباؤ۔ معدہ خالی  
 کھوکھسی محسوس ہو۔ گویا نیچے کو نکا جا رہا ہے۔ جذبات۔ کپکپی۔ پھر پھر ہٹ یا گڑ گڑاہٹ  
 آرام پڑنے کے لئے پیٹ کو ملے۔ پاخانہ پکے ہوئے سا گودانہ کی مانند۔ دانت دار۔ کمزور۔ سخت۔  
 دست آمیز۔ بھورا۔ نیلگون۔ پتلا۔ اخراج میں تکلیف نہ ہو۔ گھبراہٹ ہو۔ بے ارادہ خارج ہو جائے  
 ہٹ کمزوری ہو جائے۔ متعہ کھلی ہوئی معلوم دے۔ کالج نکل آئے۔ پشیم ہو۔ پیشاب کر کے کمزوری  
 محسوس کرے۔ ذرات آئیں۔ کبھی کبھی ایلیمین آئے۔ جماع کے لئے تیقاری۔ مگر نامردی جیض دیر  
 تک جاری رہیں۔ جیض کی بجائے سیلان الرحم جلن دار۔ سانس کے لئے اضطراب۔ ذرا سی  
 حرکت سے دم گھٹا جائے۔ رُک رُک کر سانس آئے۔ دکھانسی۔ حلقوم خارش۔ زخمی۔ روئیں دار  
 بولنے میں تکلیف۔ آواز۔ دھیمی۔ گلا پڑا ہوا۔ شام کو۔ کروب۔ برا نکائیش۔ کھانسی سخت۔  
 جھرجھری کی سی آواز کرنے والی۔ خشک۔ پُر از تکلیف۔ دھسک آٹھے۔ کھنکارنا پڑے۔ سخت کمزوری  
 پیدا کرے۔ ہوا خارج ہو۔ ہو کی نالی میں جلن۔ کپکپی۔ تبدیلی موسم۔ اجنبیوں کے سامنے۔ جھننے  
 یا گائے سے۔ بلغم آسانی سے خارج ہو۔ نمکین۔ رنگ آلود۔ جھاگدار۔ یا ٹھنڈا۔ نمونیا (دائیں)  
 پھیپھڑے کا نچلا حصہ۔ درجہ دوم۔ مع غنودگی چھاتی بھری ہوئی۔ بھاری بھاری۔ چبک (دائیں)  
 جانب اوپر۔ گلے میں تکلیف یا دائیں جانب۔ بازو میں۔ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف گڑ گڑاہٹ  
 ٹھنڈے مشروبات سے۔ دل میں درد دائیں جانب۔ بازو۔ ذرا سی بات پر پست دم مگر کن ہو۔ خنازیر  
 کے دوران میں۔ کمزور۔ چربی دار۔ بائیں جانب درد۔ پستان پر پھوڑا۔  
 تشنج۔ جلن۔ ریڑھ کی ہڈی میں بے پنی۔ گرتی سے۔ بائیں کندھے سے آگے کو درد آئے۔ بائیں  
 کندھے میں پھاڑنے کا سادرد۔ رات کے وقت۔ کمر کے ارد گرد جلن دار دھبے۔ ہاتھ کی انگلیاں



بے حس۔ اور پیر کی بھی۔ ہتیلیوں میں۔ کوہوں میں اور پھر اوپر مکر میں فلج کی سی چپک ٹخنے ٹوٹے  
سے ہائیں پیروں میں پسینہ رک جائے۔ لڑکھڑاہٹ۔ یہ آسانی لڑکھ جائے پیر سرخ جیسے سرد  
پیروں کی انگلیوں میں اینٹھن۔ سرخ لہو جیسے دھبے۔ رقیق۔ بدبودار۔ خون آلود پیر کا اخراج۔  
پیر پر زرد دھبے۔ یرقان۔ حماقت کے بعد کھال میں جلن۔ بے خوابی۔ آنکھ بند نہ رہیں۔ اندر  
گرمی سے۔ دن میں غنودگی۔ نصف شب سے پہلے بے خوابی۔ آتشزدگی کے خواب۔ سر یا پھیپھڑوں  
میں انجماد۔ سردی گھٹنوں میں۔ بستر میں۔ گرم کمرے میں سردی۔ کمر میں جلانے والی گرمی۔ کسی  
جگہ مقامی۔ کمر میں۔ تپ دق کی سی۔ پسینہ۔ علی الصبح چپ چپا۔ کچھ آرام نہ آئے۔ چھارے تکلیف  
مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال ۳۰ سے ۴۰ تک بہت کم طاقت کی لووانہ دینی چاہئے نہ دیر تک جاری  
رکھنی چاہئے۔ خصوصاً تپ دق کے مریضوں کو + مدت اثر ۵۔ ۷ ہفتے۔  
مدد و معاون ادویات۔ آرسنک۔ کلکیریا کارب۔ سیپا۔ کالی کارب۔ لائیکو پوڈیم۔  
سینگویریا۔ سیپیا۔ سلسفر

ادویہ متعلقہ۔ کاسٹم۔ کونیم۔ سلیشیا  
فاوڑسیر۔ کوفیہ۔ نکس و امیکا  
مخالف ادویہ۔ کاسٹم۔

PHOSPHOBIO ACID

فاسفورک ایسڈ

اشتداد مرض د

رقیق طوٹوں کے ضائع ہونے سے  
کثرت جلع سے  
کمزوری  
لکناں سے  
بخار سے  
سرخ سے۔ جگ ہونے سے  
دماغی صدمے سے  
جذبات  
بہتر کئے سے  
ناکام محبت سے۔ گھر کی یاد سے  
موکے جھونکے سے۔ سوئی سے

امراض و تاثرات

من۔ اعصاب  
اعضاء ناسل  
اعصاب احساس (سینسوری)  
ریڑھ  
عضلات  
ہڈیاں



گاتے سے باتوں سے

## انخطاط مرض

گرمی سے تھوڑی سی نیند سے

اجابت سے

علامات۔ کمزوری یا ناطاقتی۔ کثرت اخراج سے۔ دھیمپان۔ جس کروٹ لیٹا ہوا دھر ہی درد جائے خراش کی سی تکلیف۔ بڑھتے ہوئے سے درد (Formication) بالوں کی جڑوں میں۔ ریڑھ کی ہڈی کے برابر۔ اعضا میں۔ جوڑ ڈھیلے محسوس ہوں۔ خاموش بے توجہ۔ لاپرواہ۔ کند ذہن۔ کابل۔ دست یا پسینوں کی رغبت۔ گرفت کمزور۔ خیالات جمع نہ کر سکے۔ الفاظ ڈھونڈنا رہے۔ حافظہ کمزور۔ نا اُمیدی۔ بات کرنے کو جی نہ کرے۔ ہلکا سا سر سام۔ جلدی سے عقدہ آجائے چند یا پر کچلنے والا بوجھ معلوم دے۔ بال جلدی سفید ہو جائیں۔ بال جھڑیں۔ بے چمک۔ گرٹھے میں اتری ہوئی آنکھیں جن کے گرد نیلے حلقے ہوں۔ دباؤ سے باہر نکلی جائیں۔ زرد۔ بیمار سا چہرہ۔ جیسپر اندوں کی سفیدی جم کر خشک ہوئی سی معلوم دے۔ سوڑھوں میں سے خون ہے۔ زبان جھاگدار۔ رسوں کی خواہش۔ معدے میں تڑپی۔ بہ افراط بے درد میلے سفید۔ پتلے یا لمبے لمبے دست۔ کمزوری کم۔ دودھ کے رنگ کا پیشاب بار بار آئے۔ بستر خراب ہو جائے۔ سردی لگ جائے۔ چھاتی کو۔ ہادینے والی کھانسی۔ ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری۔ فالج زدہ کی سی۔ بازوؤں کا اگلا حصہ بھاری۔ رات کو ہڈیوں میں درد۔ گویا کوئی چھیل رہا ہے۔ افسردہ۔ جھریوں دار جلد۔ دن میں غنودگی۔ لیکن رات کو بیداری۔ سردی چہرے یا پیٹ کے ایک طرف۔ ریڑھ کی ہڈی کے برابر۔ جلن۔ کمر کے نیچے گردن کے حصے پر گرمی لگے۔ پسینہ آئے۔ بہت پسینہ۔ رات کو ہلکے بے تکلیف بخار کے نتیجے کے طور پر +

مقدار خوراک و طاقت استعمال

مدت اثر۔ مہینے۔

مدد و معاون ادویات۔ چائنا

ادویہ متعلقہ۔ جیس۔





PO DOPHYLUM

## پودو فائلم

## امراض و تاثرات

جگر } ڈوڈونیم  
انتریاں }

مقعد

دائیں جانب } خصیتہ الرحم  
شانہ (سکیپولا)  
حلق }

## اشتداد مرض

علی الصبح کھانے سے  
موسم گرما میں دانت نکالنے کے دنوں میں

پینے سے حرکت سے

پارے کے استعمال سے

## انخطاط مرض

جگر کو آہستہ آہستہ پھینکی دینے سے

پیٹ کے بل لیٹنے سے

علامات - جی متلانا - جلنا گڑھنا - سر اور ہر اُدھار دانا - آنکھیں نیم دار - سانس خراب - زبان جلی  
ہونی سی - کھردری - مسوڑھے کاٹے - دانت کٹکٹے - ذائقہ تلخ - منہ میں ہمیشہ کچھ بکھرا ہوا  
سا معلوم دے - جگر میں درد - جلن - کمزور پیٹ خالی - ڈوبا سا جائے پیٹ میں درد کا  
سا احساس - پیٹ ملنے سے آرام دے - انتریاں ہیں گڑ گڑا ہٹ ہو کر بغیر تکلیف کے  
پدرنگ اور بہت سا پاخانہ بڑے زور سے خارج ہو - موسم گرما کے دست بیفید دست  
گندے پانی جیسے جھاگ دار کھانے سے ذرے نکلیں - کمزوری پیدا کریں - ہیضہ کبھی دست  
کبھی کھنی اور تکلیف مثلاً سر درد وغیرہ - زرد - سخت - کھڑیا کے رنگ کا پاخانہ مقعد میں جلن - کھلاج کمزوری  
پاخانے سے پہلے کانچ نکل آئے - بوا سیر تیز - بدبودار - خصیتہ الرحم میں بے حسی آمیز درد - دائیں طرف  
کو جائے - دانتا گون تک جائے - پاخانہ پھرتے ہوئے - اعضائے تناسل کے لئے خطرہ - یرقان -  
چہرے اور آنکھوں میں - سوتے ہوئے کراہنا اور گڑا کرنا -

مقدار خوراک و طاقت استعمال - بڑے بچے سے ۶ درجہ تک ۲۰ اور ۱۰۰ بچوں کے دستوں میں علامت مفید ہوتا ہے  
مدت اثر -

ممد و معاون ادویات - کلکریا کارب - نیٹر م میور - سلفر  
ادویہ متعلقہ - ایلو - چائنا - مرکبوس +



PULASTILLA

## پاسٹلا

علامات و تاثرات

من  
دریدیں

زبان

معدہ

امتریاں

زنانہ اعضائے تناسل

اعضائے پیشاب

اعضائے تنفس

ایک طرف

دل (دایاں حصہ)

اشتداد مرض

گرمی ہو - کمرہ

کپڑے - بستر

پیرھنے سے

اخراج دب جانے سے

شام کو آرام سے

حرکت شروع کرنے سے

لیٹ جانے سے - ایک کروٹ دیاں

امیرانہ خوراک

بہت دیر بعد

کھانے سے کھی چربی وغیرہ - برف

اندھے

شباب - ایام حمل

حیض سے

فولاد کے استعمال سے - کونین کے استعمال سے

انخطاط مرض

کھنڈ سے - تازہ - گھلی ہوئیں

کپڑا اتار جانے سے

کھڑے ہونے سے

آہستہ آہستہ حرکت سے

خوب رویئے سے

علامات - تبدیلی پذیر - ادلتی بدلتی علامات - ایک خاص حد تک بڑھ کر یکایک کم ہو جائیں اور پھر وہیں پہنچ جائیں - پیاس نہ ہو - سانس پورا پورا نہ آئے اور سردی لگے - ہانسنے



کی یا حیض کی خرابی۔ اخراج دب جانا۔ کان بہنا۔ حیض سیلان الرحم۔ دودھ وغیرہ وغیرہ۔ اخراج  
 خون چرم اہٹ۔ خون کی کمی۔ اخراج پہ افراتہ۔ نرم۔ گاڑھا۔ زردی یا بل سبز تلخ لعاب۔  
 جھٹکے سے لگیں۔ ایسی تکلیف جیسے زخم کو چیرا پھاڑا جاتا ہو۔ بے جستی۔ مانفہ۔ پیر کی یا جس طرف بیٹھے  
 ہو۔ زرد رو۔ بٹھنڈی۔ گوری۔ نرم دل۔ جِلْم الطبع۔ پُر جذبات۔ جلد رونے والی بہت  
 مار بیٹھنے والی۔ جلنے کر دھننے والی۔ جلد ناراض ہو جانے والی۔ ہمدردی کی خواہشمند۔ سر جھکا کر نہ  
 لیٹ سکے۔ چند یا میں سرد درد شروع ہو۔ کنپٹیوں میں درد۔ دکھانی سے تالو پر بہت پسینہ آئے  
 آنکھیں آنسوؤں سے پری۔ یا ڈھکی ہوئی سی معلوم دیں۔ آندھی سے۔ پلکیں چکیں سردی کا اثر۔  
 آنکھیں دکھیں۔ سوزاک کا اثر۔ انجھناری یا گوماری۔ اندھے پن کے محلے۔ حیض سے رات کو  
 کان میں درد۔ برا اخراج۔ ناک کے سامنے بدبو۔ زکام۔ لیٹنے سے ناک ٹرک جائے۔ زرد چہرہ۔  
 ہونٹ چلے۔ نیچے کا ہونٹ نیچے میں سے پھٹ جائے۔ سانس میں بدبو۔ دانت کا درد۔  
 گویا کوئی دانت کھینچ رہا ہو۔ دے سردی سے۔ ذالیقہ خراب۔ صبح بلکے وقت خون آلود۔ چکنا چپ چپا  
 منہ یا خشک بے پیاس۔ زبان جلی سی محسوس ہو۔ کھانے کے بعد ذالیقہ منہ میں قائم رہے۔ پانی یا  
 چکناٹی ناپسند ہو۔ زرخشی کی خواہش جو موافق نہ آئے۔ یکایک نفرت ہو جائے۔ دکھانے سے چھاتی  
 پر جلن۔ جی متلائے کوڑی میں کالے جانے کی سی تکلیف۔ نبض کی سی تڑپ۔ بھاری یا بگڑا ہوا  
 معدہ۔ پیٹ۔ پتھر جیسا سخت۔ درد کرے۔ بے جس ہو۔ چوڑو میں درد۔ پاخانہ۔ تبدیل پذیر۔  
 سبز آنوں۔ آدھی رات کے بعد ہفراوی۔ بواسیر۔ لیٹنے سے۔ پیشاب غیر اراداً لیٹنے پر خارج  
 ہو جائے۔ بعد میں لو آئے۔ مثانے میں بھاری دباؤ سا یا تشنج۔ رات کو پیشاب خطا ہو۔ جلن  
 بائیں طرف نیچے کو۔ پروسیٹ بٹھے ہوئے۔ سوزاک۔ خون آلود اخراج۔ حیض سا محسوس ہو۔ حیض  
 سیاہ۔ بدیر۔ شباب میں۔ کم۔ دہانے سے۔ بے قاعدہ۔ جلن والا۔ غائب۔ آیام حیض میں  
 تکلیف۔ وضع حمل کے سے کمزور درد۔ بعد میں درد سیلان الرحم۔ دودھ جیسا۔ چرم اہٹ۔ ہوا کی  
 بھوک سی محسوس ہو۔ د بائیں طرف۔ لیٹنے سے۔ گویا پیٹ میں۔ اگر گرمی ہو۔ کھانسی صبح کو و صلی  
 شام کو خشک۔ کوڑی میں دھسک اٹھ کر بیٹھا پڑے۔ بلغم کاڑھی۔ جھاگدار میٹھی نمکیں۔ چھاتی  
 میں تکلیف گویا کہ بوجھ رکھا ہے۔ دھڑکن۔ پستان۔ کواڑی کے دودھ۔ زرخشی سی۔ درد کرنے والی  
 گھٹلی۔ دائیں جانب۔ دودھ کم۔ جوڑوں میں سوزش۔ پیر کی پشت میں۔ کٹنی بے جس ہو۔ نچلے اعضا  
 میں۔ درد نیچے کو جائے۔ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ مانگیں بھاری ہوں۔ مانگوں میں سردی۔



سیرول میں بدلہ دار پسینہ - غدود میں سوزش - دریل پی پے درد (Vericose) گرم ہونے پر جلد  
میں خارش - خسرہ - دن میں غنودگی - لیٹے ہوئے سر پر ہاتھ رکھے - بینہ اچلتی رہے - خواب آنے  
رہیں - صبح کو یہ نشان یا تھکا ہوا سا پیدا ہو - سردی لگے - مگر گرمی سے نفرت ہو - گرم کمرے میں  
درو ہو - رات کو لیٹنے سے - ایک ہاتھ ٹھنڈا ہو - کچھ حصے پر پسینہ آئے +  
طاقت استعمال مقدار خوراک - ۳ سے ۳۰ تک -  
مدت اثر - ایک ہفتہ -

ممد و معاون ادویات - آرستک - برالونیا - کالی بائیکارب - کالی سلف - لائیو کوڈیم سیلیا  
سلف - سیلیا - سیٹیم - سلفیورک ایسڈ - زنک  
ادویہ متعلقہ - لیس - سی سیوگا - گریفائٹس - میبامیل - کالی بائیکارب - نیشرم سلف -  
مخالف ادویہ - نکس موسک -

RHUS TOX

رہس ٹاکس

امراض یا تاثرات

جلد } اعضائے تناسل  
چہرہ کھوپری  
خون

سیلولر (Cellular)

(Ligaments)

(Fibrous)

لعابدار جھکیاں -

(Peyer)

(Parotid)

(Cord)

عرق النسا (Sciatic)

غدود

اعصاب

اشتداد مرض

مرطوب ٹھنڈی ہوا سے  
نہاتے دہوتے ہوئے  
کھل جانے سے  
ٹھنڈا ہوا کا جھوکا لگ جائے  
پسینوں میں کھل جانے

سے ہاتھ وغیرہ

حرکت شروع کرنے سے

آرام سے

سوج آنے سے بہت محنت سے

بعد نصف شب

اسخطا ط مرض

حرکت جاری رہنے سے



بائیں جانب یا بائیں سے دائیں کو جانوالی  
تکالیف

کپڑے لیٹنے سے غسل سے  
گرمی سے اگر گرمی پہنچائی جائے۔

کھانے سے۔ تکسیر سے

پیٹ پکڑنے سے

علامات۔ دبائی خارش جوٹس میں لائے والے۔ تپ محرقہ سادی بافلج کے اثرات۔ رات  
کو درد گولی کی طرح نکل جانے والا۔ چیک والا۔ یا پھٹانے والا۔ کسی حالت میں  
بھی آرام نہ پاسکے۔ زخم یا خراش جیسی تکلیف۔ اگر آؤ گوشت کٹا ہوا یا ڈھیلا سا محسوس  
ہو۔ اکھڑا ہوا سا جان پڑے۔ عضلات میں تشنج۔ چیونٹیاں سی ریگیں۔ بے حسی۔ کپکپی۔ جلن۔ سوزش  
اور سرخی۔ اخراج چرملے والا۔ زنگ کے رنگ کا گوشت دھوئے ہوئے پانی جیسا یا  
گدلا سا۔ جس سے پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں۔ تنفک۔ بیدل یا اشرہ۔ آہستہ آہستہ جواب دے  
ہلکا ہلکا سرسام۔ سر گھومے۔ بعد ازاں سر میں درد ہو۔ دماغ پھٹا جائے۔ یا ڈھیلا سا محسوس ددھماکے  
سے۔ مانھا گویا کسی بورڈ سے دیا جا رہا ہے۔ گدی میں لگڑاؤ اور زرد داہی پو لیٹنے سے۔ آنکھوں کے پیچھے  
درد۔ حرکت سے پردہ چشم سخت چپکنا ہوا خشک۔ مضبوطی سے بند ہو جائے۔ آنسو بکثرت گرم  
رکڑک ہیں۔ روشنی سے ڈر گئے۔ ناک کی نوک سرخ تیز سر۔ پانی بے تکسیر رات کو۔ ناک کی ہڈی میں  
سخت درد۔ چہرے میں درد۔ بائیں رخسار پر سرخ دھبے۔ سو جا اور اگر اچھا چہرہ۔ خشک۔ پھٹے ہوئے  
ہونٹ۔ ہونٹوں پر پھنسیاں (ہیریگز)۔ میلا۔ خون آلود تھوک سوتے ہوئے ہے۔ دانت ڈھیلا محسوس  
ہوں۔ زبان کی نوک پر سرخ شلٹ۔ ترچھے رخ میل۔ یا ایک طرف میلی۔ درمیان میں سرخ اور خشک  
ذائقہ تانے کا سا یا خشک گھاس کا سا۔ صبح کے وقت گلے میں بائیں جانب خراش۔ قد و دین سوزش  
گرم مشروبات کی خواہش ہو خواہ ان سے دکھانسی میں۔ سردی میں وغیرہ۔ کھانتے کھانتے  
ہو جائے۔ پیٹھ پر چت لیٹنے سے تپ ہو جائے (Fecal) پیٹ چھونے سے درد ہو۔ پیٹ میں گولا  
سا معلوم ہوے۔ دست پتلے۔ جھاگ دار۔ خون آلود۔ بدبودار۔ اینٹوں کی سرخی کے زنگ کے  
چپکنے والے چمکدار۔ بے ارادہ خارج ہو جائیں۔ یا مروڑ سے آئیں۔ دے بنے سے۔ بوا سیر د اٹھانے  
سے۔ اعضائے تناسل میں ورم خصوصاً آگے کی جگہ میں۔ خارش۔ سوزش۔ کھانسی خشک  
گلا میٹھا ہو۔ پھارنے اور تکلیف دینے والی۔ خون کا سا ذائقہ۔ پیٹ میں کایک بھول جانا  
یعنی (Oedema) دھڑکن۔ حرکت سے۔ دل تھکا سا محسوس ہو۔ (Hyperaeraphy) درد



بازو میں نیچے کی طرف جاسے۔ گردہ سخت ہو۔ شانوں کے درمیان درد نکلتے سے۔ گردہ کے مار  
سکڑی جائے یا ٹوٹی جائے۔ خوب دبائے سے۔ پھرنے سے یا پیچھے جھکنے سے۔ لمبگی یعنی  
کر کے گردہ۔ رانوں تک جائے۔ بے حسی۔ اعضا میں کانٹے سے چھس۔ بازو خود بخود حرکت کریں  
دوایاں، کمینوں میں فلج کا سا درد۔ ہاتھوں کی پشت پر (Phagades) ہتیلیاں خشک گرم  
پھٹی ہوئی۔ دکھتی ہوئی۔ ناتھ دھونے سے جلن ہو۔ ران کی طرف درد جائے۔ پاخانہ پھرنے سے  
سائیکا ٹانگ کی بیرونی نسیں درد۔ ٹانگ بے جان یا کڑی کی سی معلوم ہو۔ پنڈلیوں میں انہیں  
ہو۔ زخم ہوں۔ جن سے خون آلود پانی بہے۔ غارش ہو۔ جلد سخت ہوئی۔ خشک گرم۔ کھلج ہو  
جلن ہو۔ لاگرمی سے۔ ٹھنڈی ہو اسے درد ہو۔ چھوٹی چھوٹی پھپھوے دار یا کھڑدار  
پھنسیاں۔ ایکڑیمیا کی سی۔ تریا چھپا کی یعنی تپتی جیسے داغ۔ اعضاے تناسل پر۔  
پیش کے ساتھ باری سے۔ بانوں میں سے پیپ ہے۔ رہس کا نہر چڑھ جائے۔ نان بایوں کی غارش۔  
زخموں سے پانی بہے۔ خواب سخت محنت کے۔ کت و خون کے۔ ٹھکا ہوا یا گھبرا ہوا سا بیدار ہو نہیں  
تیز کا پستی ہوئی۔ بے قاعدہ۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ ذرا سا کپڑا کھل جانے سے  
بازو میں درد کھانسنے سے لرزہ گیا سرد پانی پڑنا ہے یا رگوں میں دوڑنا ہے۔ کھانسی سے پہلے  
باری باری سے گرمی لگے۔ کسی ایک حصے میں گرمی اور سرسامی پسینہ۔ غلیظ فیس۔ بے خوابی کیسا  
مقدار خوراک و طاقت استعمال ۳۰ سے ۴۰ تک اور ۲۰ یا اس سے زیادہ سی واکے ٹھیکہ یا پودے۔  
زہریلے اثرات دور کرنے کے لئے مفید ہے + مدت اثر ۲- ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ برائیونیا۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹک۔ لائیکوپوڈیم میگنیشیا کارب  
میڈورائنم۔ فاسفورس۔ فائوولیک۔ پلسٹا۔ پلسٹا۔ پلسٹا۔  
ادویہ متعلقہ۔ آہن کا۔ برائیونیا۔ ڈکامارا۔

گندھک

SULPHUR

سلفر

اشتداد مرض >

اخراج دب جانے سے

غسل سے۔ دودھ سے

امراض و تاثرات

رگوں میں

دورہ خون

محرابوں میں

پیش میں



اعضائے پرورش  
لعبدار جھلیاں } میوکس  
سیرس

مقعد - چھاتی

جلد - تنوں میں

چندیا - تلوے

جوڑ - غدود

گرمی سے } کوشش سے  
بستر میں }  
اونی گپڑوں سے وغیرہ وغیرہ  
موسمی تبدیلیوں سے  
بولنے سے

السنجے قبل دوپہر

وقت مقررہ پر آغاز پیری میں

پورے چاند پر دسائنا، سلیکٹ

انخطاط مرض

کھلی ہوا میں

گرم سینک سے

پینے سے - شک گرمی سے

علامات - کبرے - لاغر - وایم المریض - غلیظ - میلے کھیلے ہوئے بھوک  
اچھی - بچوں کا سوکھیا - سورا (Paura) - ہنخیراں یا خنازیر - بائی تے درد و عمل کی کمی - لینزش  
پھر خشک ہونے میں دیر - ہر تکلیف کا پرانی پڑ جانا - کنارے سرخ - یا کوئی واحد حصہ مثلاً ہونٹ  
کان - ٹخنے وغیرہ (ایلو) متفاحی جلیں یا انجماد - تلوے - چندیا - ہڈیاں پڑ درد مقامات - خارشل  
خاص مقامات میں - اخراج سے خارشل - بدبودار چمچنے والے - یا خون کی دھاریوں والے اخراج  
کمزوری - بیہوشی کے دورے - خالی خالی احساس ضرورت سے زیادہ پُر احساس - بے چینی -  
غنودگی - اوپر چڑھنے والی تکالیف - گرمی - حرارت - کپکپی - چکر وغیرہ - دھیمے سبست  
بھوکے ہمیشہ تنگ ہوئے سے - پُر امید خواب دیکھنے والے - بشاش - ہندسہ پرست - بے نشی  
مزاج - زور و رنج - کمینہ خیالات - راز جو - جلدی سے جوش میں آجانے والے - خبیثی - زندگی سے بیزار  
ما تھا چکرائے - چند یا میں تڑپ - بھاری - زخمی سی - گدی سے چند یا تک - درد - سردی -  
دباؤ - گویا پی سی بندھی ہوئی ہے - دماغ کی گہرائی میں درد - اتوار کے دن سرد - سرگرم - پیر ٹھنڈے  
چند یا پر پستہ - بال خشک اور ٹھنڈے - آنکھیں جلتی ہوئی - بکائے کی سی تکلیف - گویا ریت بھری  
ہے - چٹلیاں پھٹی پڑیں - تھر تھراتی ہوں - روشنی کے گرد حلقہ نظر آئے - گویا دھواں اُڑ



اڑ رہا ہے۔ روشنی سے خوف۔ آنکھیں دکھیں۔ کان میں بتے ہوئے پانی کی شرشر۔ ناک رکی ہوئی کبھی  
 ایک مٹھنا۔ کبھی دوسرا۔ بوند بوند ٹپکے۔ سوزش ہو۔ سرخ ہو۔ دھند سے نزلہ۔ زکام۔  
 نکسیر کا پھوٹنا۔ رات کو یا دائیں جانب لیٹنے سے۔ بوکے لئے تیز جس۔ قیاسی ہو۔ ماتھے کی  
 رگوں میں سوزش۔ بوڑھا نظر آئے۔ چہرے پر دلغ۔ خشک۔ لگت آمیز زبان۔ سرخ کنارے اور  
 نوک۔ دانتوں کے کیلے فکی گٹھن دانت کٹکٹائے۔ مونہ میں زخم۔ گلے میں سوزش سی یا دھسک اٹھتی رہے  
 بیرونی مٹھنی۔ ڈکاریں۔ مٹھے اندر جیسی دکھانے سے پانی زیادہ پیچھے کھائے کم گوشت سے  
 نفرت۔ یکا یک بھوک بھڑک اٹھے۔ کمزور ہو۔ دانے قبل دوپہر کوڑی میں پیٹ دکھتا  
 ہو۔ دبانے سے بھاری ہو۔ چبک مارے۔ پیچھے کو بیٹھا جائے۔ مقعد کی طرف۔ بچوں کے پیٹ  
 میں درد تو بچ۔ مقعد میں درد۔ خارش۔ حاجت بنی رہے۔ یواسیر کی رغبت۔ درد کے ڈر سے پافانہ  
 روکے رکھے۔ دست۔ جلد جلد۔ علی الصبح (دکھیں) تیدیلی پذیر۔ بودار۔ بے درد۔ پتلے  
 بھورے بھورے بھاگ دار۔ دودھ سے قبض سے اوستے بدلتے جلن۔ خارش پیشاب کی نالی میں  
 جلدی جلدی یا رات کو پیشاب آئے۔ بستر خراب ہو جائے۔ فوطے لٹک جائیں۔ رحم میں کاٹنے کی سی  
 تکلیف۔ جیغ میں جلن۔ خارش بھر مگاہ میں۔ پیٹھ سے۔ پرسوت کا بخار۔ جھن بدلو اور جلن دار  
 چرم رانے والا بدبودار جھن۔ دم گھٹے۔ ہوا کی بھوک۔ بے قاعدہ سانس۔ کھانسی  
 تیز۔ دو تین مرتبہ کھانا پڑے۔ گہری۔ گلابیٹھا ہوا۔ صبح کے وقت۔ چھاتی میں بلغم گھر گھر لے گئی  
 انبجہ قبل دوپہر معلوم ہو۔ بند سا بندھا ہوا معلوم دے۔ یا بوجھ سا رکھا ہوا۔ سرخ یا بھورے  
 بھورے دلغ۔ درد یا بیکل پستان سے پیچھے کو۔ ہونیہ بدل بیت بڑا معلوم دے۔ دھڑکن۔ لیٹنے  
 سے پستان کی گھنڈی چٹھی ہوئی۔ پستان میں تیز جلن۔ گردن کمزور۔ گردن پر پھوڑے۔ کندھے  
 بھاری۔ کندھوں کے درمیان درد۔ کمر کے گرد۔ درد معدے کی طرف جائے۔ جھبک کر  
 چلے۔ ماتھوں سے بوجھ سمجھائے۔ جب کہ بیٹھا ہو۔ پافانیکے وقت تکلیف۔ بایاں بازو بے جس  
 ہو۔ لیٹے ہوئے پتیلی پھٹی ہوئی۔ کھال اترے۔ اکڑیا۔ مسے ہنٹیلوں پر۔ انگلیاں (دائیں)  
 بے جس۔ بایں ران رگ دیم شرنک میں تناؤ۔ بایں پنڈلی میں انیٹھن یعنی بانٹے۔ تلوے  
 جلیں۔ بستر سے پاؤں باہر نکال لے۔ رات کو یا بسترے میں ہی ٹھنڈے رہیں۔  
 خشک رہیں۔ ایک عضو میں جھٹکے لگیں۔ سونے کے لئے لیٹنے پر۔ جلد خشک۔ کھردری  
 جھڑیاں دار۔ کھردرے سے اتریں۔ خارش۔ رات کو بیت تیز۔ پھوٹ پڑے۔ گھاؤ



پک جائیں۔ اچھے نہ ہوتے ہوں۔ جلن ہو۔ جب کھجائے جائیں ہوا میں۔ آندھی میں۔ دھونے سے زیادہ تکلیف دیں۔ پھوڑے پھنسی دیگر تکلیفات کے ساتھ باری باری۔ مثلاً دمے وغیرہ سے پھوڑے پھنسیوں کی فصل۔ خارش۔ ریشگنے والی تپتی یعنی تپپا کی۔ اکڑیا۔ پھنسیاں۔ بکی جیسی نیند بدن میں غنودگی۔ رات کو بیداری۔ نیند میں فرحت نہ ہو۔ سوتے سوتے گائے۔ کمر میں اوپر کو سردی چڑھے۔ گرمی۔ پیر بہت گرم۔ سرخ رہیں۔ کندھوں کے درمیان پھر گن۔ پسینہ ہاتھ یا پیروں (یا بالکل) میں مقدار خوراک۔ طاقت استعمال۔ شرمع میں ۱۲ درجے کی مناسب ہے۔ عزم میں امراض میں ۱۲۰۰ اور اس سے زائد بھی دی جاسکتی ہے۔ زیادہ طاقت کی دوا علیہ طبع نہ دینی چاہئے۔ مقدار خوراک ۵۔

ممد و معاون ادویات۔ ایکونائٹ۔ ایلو۔ آر۔ سنکم۔ بیڈیا گام۔ سیلا ڈونا۔ کلکیر یا کارب۔ مرکبوس۔ پلسٹلا۔ سورائٹم۔ پارو۔ ہیس۔ آکس۔ سیپیا۔ سلفر آئڈ۔

ادویہ متعلقہ سورائٹم۔ سفلیٹم

فاو اثر۔ مرکبوس۔ پلسٹلا۔ سیلیٹا۔

مخالف ادویہ۔ نکس۔ موسک۔ رینکولس۔ بلب۔

SEPIA

اشتداد مرض >

ہوا۔ شمالی آندھی  
سردی سے } مرطوب۔ برفانی  
کثرت تجماع سے

حیف سے

ایام حمل میں۔ نقاط سے

صبح اور شام

پہلی نیند کے بعد

اسخراط مرض کے

جہز بات میں آہیجان سے

گرم سے۔ بخند سے۔ بخند سے۔ بخند سے

سیپیا -

علامات و تاثرات

نظام انضمام

رگوں میں  
دورہ خون  
مستورات کی تکلیف

اعصاب

جلد



**علامات**۔ ڈھیل ڈھالی مستورات کے لئے۔ گداز و فریب بدن۔ آسانی سے دھرن  
 مل جانے کی رغبت (Uterine reflexes) علامات کمر میں ٹھیس جائیں۔ درد اور کوجائے  
 ۱۔ متعین۔ رحم میں۔ پیچھے کی طرف۔ سر میں (دائیں جانب) نلوں میں وغیرہ کیپکی پیدا کرے۔ گولا  
 سا معلوم دے۔ یا اندر یعنی طور پر پھرتا ہوا۔ اوپر کواٹھتا ہوا۔ کمزوری اور خالی ہونے کا  
 احساس۔ کوڑی میں چھاتی ہیں۔ مکر کے گرد۔ کونوں پر۔ گھٹنوں میں وغیرہ۔ اخراج دودھ۔ یا خون کے  
 رنگ کے۔ ذرا سی بات سے متفکر یا خوف زدہ۔ صحت میں رہنا ناپسند کرے۔ مگر تھائی سے ڈرے  
 افسردہ محبت۔ حافظہ کمزور۔ غمگین۔ چڑچڑی۔ کبھی لا پرواہ یا اوداس۔ خواہش مباشرت۔ سردرد۔  
 بائیں آنکھ کے اوپر کبھی کن پٹی کے ایک جانب کبھی دوسری جانب ۱۔ اسی پہلو بٹھنے سے۔ چند یا پر  
 بھاری پن۔ گولی سی لگے۔ پھٹا جائے۔ آدھے سی کا درد۔ سر کواگے پیچھے جھٹکے دے۔ آنکھیں  
 مچی جائیں۔ سرخ۔ کھانج ہو۔ نکلی پڑے۔ بھٹکے سے اڑتے ہوئے۔ چنگاریاں سی جھڑتی ہوئی  
 دکھائی دیں۔ پھر بصارت ماری جائے۔ ہر طرح کی بونا پسند ہو۔ ناک پر آریا کا وہ کی مانند بھوری سی  
 لکیر ہو (MENS) جڑ میں دبائے جانے کا سادہ ہو۔ چوبے یا کھرنڈ لگیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ  
 حلقے۔ چہرے کا رنگ بدلتا ہوا۔ نیچے کا ہونٹ سوجا اور پھٹا ہوا۔ منہ میں جلن کا احساس صبح  
 کے وقت کھانسنے کھانسنے کر بلم نکالنی پڑے۔ ذائقہ منیر یا مچھلی کا سا۔ یا تلخ۔ ترش۔ سردی لگیں  
 چڑھتی ہوئی۔ بھاری بھاری ڈکاریں۔ جھاگداری بلم۔ خوراک کے خیال یا خوشبو سے جی متلائے  
 صبح کو تھوٹے ہو جائے۔ صرف ٹھوس خوراک یا دودھ سا نکلے۔ سخت بھوک لگے۔ ترش چیزوں کی خواہش  
 ہو۔ کوڑی کی جگہ ڈوبی جانے غشی سی طاری ہو۔ کھانے سے آرام نہ پڑے۔ گولا سا معلوم  
 دے۔ منائے میں اینٹھن سی ہو۔ ۱۔ جھٹکے سے رحم نکلا جائے۔ یا نیچے کو دبائے والا بھاری  
 بوجھ سا محسوس ہو۔ ہاتھوں سے دباے یا مانگوں کو قینچی کی طرح اوپر نیچے رکھے۔ گھڑا سا پیٹ  
 ہو۔ دست۔ سریش جیسی آنوں خارج ہو۔ دست۔ آباے ہوئے دودھ سے۔ متعین سکڑی  
 ہوئی سی۔ بے طاقت کئی دن تک حاجت نہ ہو۔ دائمی قبض۔ گویا متعین میں ڈاٹ سی لگ گئی  
 ہے۔ بوا سیر۔ یا ہر نکلنے والے سے۔ چپکنے والی۔ ایام حمل کے دوران میں متعین رطوبت رہنا  
 پیشاب آہستہ آہستہ۔ پیلے جلن ہو کر شروع میں پشیاں فضا ہو جائے۔ ۱۔ کھانسنے سے  
 چھینکنے سے وغیرہ وغیرہ۔ گاڑھا۔ غلیظ پیشاب۔ چپکنے والا۔ سرخ۔ ریت کے ذرات  
 یا سفید۔ حیض مند۔ آغاز شباب میں۔ رحم میں جلن یا درد کمزوری ویچھے جانے یا نیچے



گرے جانے کا احساس اور دبا کر بیٹھنے کی ضرورت شہر نگاہ کے بوں میں سوزش۔ پھوڑا میلان رحم  
 بڑی بڑی کھلیاں سی خارج ہوں۔ بدبودار سوزا کی مادہ۔ معدے سے کھانسی اٹھے۔ دھوا  
 حرارت کی تبدیلی۔ خراب بلغم خارج ہو۔ دورہ خون بے قاعدہ۔ ٹھیرا ہوا سا معلوم دے۔ دھڑکن  
 نمایاں۔ کن پٹیوں کی طرف چڑھتا ہوا۔ نبض سی جلتی ہوئی معلوم دے۔ رات کو زور۔ خون کی نالیوں میں  
 خون کی کثرت۔ گلار کا ہوا سا محسوس ہو۔ دو دو کرے۔ کمر کے گرد۔ دباوے کی خواہش ہو۔ ہاتھ سرخ  
 کھٹنے یا ایڑی ٹھنڈی۔ جلد پر دھڑکن بھٹی ہوئی۔ کھڑکی۔ سخت۔ دباوے یاں۔ چھوٹی چھوٹی سفید  
 پھنسیاں۔ دلوہ کھلج پھوڑا کھنٹی پر موٹا کھنڈ۔ چھوٹے جوڑوں پر زخم۔ سوتے سوتے زور سے بولے  
 یاں کروٹ لیٹنے سے خواب۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ سردی خاص خاص مقامات پر۔ چندیا  
 پر۔ کندھوں کے درمیان۔ پیروں میں۔ بستر میں۔ یکایک کمزوری کا دورہ۔ فکر زدہ۔ گرم سرخ  
 چہرہ۔ ہاتھ گرم۔ پیر ٹھنڈے یا اس کے برعکس پسینہ بہ آسانی۔ لرزے سے۔ اعضائے تناسل پر۔  
 کمر میں۔ ریڑھ کے ڈنڈے پر۔ بے قاعدہ بخار۔

مقدار خوراک یا طاقت استعمال ۱۲۔ ۳۰۔ اور ۴۰ بہت کم درجے کی دوا بار بار نہ دینی چاہئے  
 نمزد اکثر جو ۱۴ دن میں دو مرتبہ دینے کی سفارش کرتے ہیں۔ مقدار خوراک ۶۔ ۷ ہفتے۔  
 مدد و معاون ادویات۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ سوراٹنیم۔ پلسٹلا۔ سلفر۔  
 سولہ یہ متعلقہ۔ کاسٹم۔ جلیس۔ بلیم۔ یک۔ نیٹرم میور۔ پلسٹلا۔  
 مخالف۔ لیکس۔

سلیشیا

SILICA

اشتداد مرض

ہوا۔ جھونکے

سردی سے  
 تبدیلیوں  
 کھن جانے سے  
 نہانے سے  
 پسینے زکھر سے  
 پیروں کے

سلیکا

امراض و تاثرات

پیرورس کن۔ بچوں کے لئے

ریشہ جات (Elastic) دسے

(Gelular) خاندان دار

اعصاب عود

(Eutachiar) یوسٹیشن

لیاں (Tour Ducta) آنسو کی نالیوں

(Vistalae) پھولا



ہڈیاں - مری ہڈی (Cartilage)

لعابدار جھلی

جلد

عصبی جوش

اساس } روشنی بشور

دھماکہ - ریڑھ کی ہڈی

چاندنی کی تبدیلی - رات

اسخراط مرض

گرم } گرم کپڑے پہننے سے - سر کو  
سو جانے سے

سنت بيشاب

علامات - نہایت ذکاوت - شور کو درد کو یا ستری کو اٹکھٹی سے پٹے رہنا چاہے۔  
 تیز درد - یکجائی کہوں میں - سبق میں - رگم میں وغیرہ - تشنج - جلدی تھک جانے کا رجحان - بافر لپٹنے  
 پیپ پر جانا - آہستہ آہستہ - نامکمل عمل - بعد میں سخت ہو جائے ہر ایک چوٹ پک جائے  
 دیر تک پکتے رہیں - فیچولا پھوٹا مردار گوشت - غوراک کی کمی - دیر میں نشوونما - دیر میں چلنا سیکھے  
 غدود میں سوزش مرض - سوجھیا - اعضا سوجائیں - سویرے کے وقت (Oedema) سوجن  
 دماغی تیزی جسمانی سستی - ہمت کی کمی - بھٹی چال - رنجیدہ اور صندی - اوپر چڑھنے والے  
 اثرات - سخت جگر - کن پٹیوں میں درد - دباؤ سے - سردی کے بعد بے بھری - چند یا پر تڑپ -  
 پیٹ پھولا ہوا - کھوپری پر گومرے - آنکھوں میں سوزش - متاثر بہرہ - زکام - زبان پڑھنے میں  
 بال سا معلوم دے - حلق میں تلخ ذائقہ - دانتوں کی جڑوں میں پھوڑے - گرم خوراک سے نفرت  
 پیٹ بڑا - سخت اور گرم - ٹانگیں تپتی - متعہ میں کاٹے جانے کی سی تکلیف - تشنج - غوطوں میں درد  
 - مباشرت - پاخانہ دب جائے - - حوض میں غوطوں میں پانی اتر آئے - رحم کی نلی میں کاٹے جانے  
 کا سادرو اوپر کی طرف - پیشاب کرنے سے - سیلان الرحم بہ افراط - رک رک کر شرمگاہ میں خارش  
 تے ہلاڈلنے والے - کھانسی سانس روکنے والی - ٹھنڈے مشروبات سے - یلتم بہ افراط -  
 چھاتی میں غرغر کرے - پستان کی گھنٹی میں درد - پستان میں گانٹھ - ایکزیری غدود میں سوزش -  
 انگلیوں کی لوک میں درد - خشکی - ٹخنے کمزور - پیروں میں پسینہ - بدبودار - خارش کرنے والا -  
 چرم اٹنے والا - جوتے خراب کرنے والا - دبا ہوا - پیر کی محراب میں درد - بد شکل - اندر نکلنے والے  
 ناخن - خوفناک خواب - آنکھ لگتے ہی جاگ پڑے - سردی - بستر میں محنت سے - تکلیف دہ



جھٹھے میں۔ تیخ جیسی سردی۔ جب دق۔ بکثرت پسینے۔ اوپر کے جھٹھے میں۔ سر پر متاثر جھٹھے  
میں۔ رات کو۔ بہ آسانی۔ بدبودار۔ چرم لانے والے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۴ سے ۵۰۰ تک نیز ۲۰ یا اس سے زیادہ۔  
مدت اثر۔ ۴ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ فلورک الیڈ۔ فاسفورس۔ تھیوجا۔

ادویہ متعلقہ۔ کلکیر یا کاربیمپ۔ کالی فاس۔

بعد میں دی جائے۔ کلکیر یا کاربیمپ۔

مخالف ادویہ۔ مرکبوس۔ ٹیکس موسک۔

THUJA

تھیوجا

اشتداد مرض

سرد و مرطوب

گرمی بستر کی

۳ بجے صبح۔ سالانہ

وقت مقررہ پر۔ بڑھتے چاند

ایام حیض میں

پیشاب کرتے وقت۔ سوزاک سے

چھپک کے ٹیکے سے

چاء سے۔ پیاز سے

انخطاط مرض

آنڈھی یا ہوا سے

گرمی سے } سر پینے سے

کھل کر اخراج ہونے سے

چھینکوں سے

امراض و تاثرات

اعضائے تناسل و پیشانی

لعابدار جھیلیاں } انٹریوں کی

من۔ اعصاب

کن پٹی

غدد۔ جلد

بائیں جانب۔ خضیتہ الرحم



حرکت سے ٹانگ پر ٹانگ پہنچی کی طرح رکھنے سے  
چھوٹے سے۔

علامات۔ ٹھکاسو اور ڈھیلا ڈھالا۔ سخت نقابت و کمزوری۔ جلدی جلدی سوکھتا جائے  
نرم۔ وافر گرم گوشت۔ سے۔ سیاہ۔ دبے ہوئے۔ بلندی ساخت جسم۔ تیز ترش یا مٹھے جیسی  
بدبو آئے۔ چکنے پاخانے سے۔ جلد سے یا پسینے سے بوند بوند کر کے پیشاب آئے۔ جلن کے ساتھ۔  
تکلیف کبھی کمین ہو کبھی کہیں۔ گرمی سے۔ بانی کے درد۔ جھٹکے سے لگیں۔ ریڑھ کی ہڈی سے کٹے  
حصہ بے جان سا ہو جائے۔ وہی شکلیں دکھائی دیں۔ پھر کوئی خیال دل میں بیٹھ جائے۔ یوفائی  
کا۔ اندر کسی زندہ چیز کا احساس۔ پہلو میں کسی زبردست طاقت کے ہاتھ میں ہونے کا خیال۔  
جلد باز اور منتظر۔ ذرا ذرا سی بات پر۔ خیال مجتمع نہ کر سکے۔ اعضا کی کمزوری و نولیتھینا۔ سر میں  
چکر۔ جیسے ہنڈولے میں چکر آتے ہیں۔ بھارتا ہوا۔ گویا سر کی بائیں طرف کوئی میخ گاڑا ہو۔ عصبی درد  
دنور بلجیا، خشک پٹھے ہوئے بال۔ آنکھیں خون جیسی سرخ۔ آنسو بھرے ہوں۔ کھلی بریں۔ چہرہ  
موم کے رنگ کا۔ چمکدار۔ آنکھوں کے نیچے سیاہی۔ دانت مسوڑوں کے پاس سے جھرتے ہوں۔  
دسردی سے۔ ٹنگنے میں آواز آئے یا ڈکاریں آئیں۔ ترش اور چکنائی دار ڈکاریں۔ پیٹ میں گڑ بڑ۔  
پنچے کی آنتوں میں گولہوں میں۔ مشاںوں میں یا پیشاب کی نلی میں کٹنے والے مروڑ۔ انٹریوں میں گڑ گڑ  
کی آواز ہو۔ پتلا سینہ درست ہو جائے۔ گڑ گڑ کر کے پاخانہ خارج ہو۔ یا پھر پھٹ کی آواز ہو۔ صبح  
کی خوراک کے بعد پاخانہ سخت۔ سیاہ گھیلیاں۔ اور پانی زور سے خارج ہو۔ پچکاری کے مانند  
ہوا کے ساتھ۔ جلدی جلدی۔ متعہ میں رطوبت۔ پیشاب جلن سے۔ بوند بوند کر کے۔ بدبو دار۔  
بکثرت۔ دیر تک بیٹھا رہنا پڑے۔ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی نالی میں درد۔ اعضا کے  
تناسل بدبو دار۔ فوطوں میں درد۔ آلت تناسل اور حشفہ کی سوجن۔ سوزاک۔  
بائیں نالی میں جینا بھارتا ہوا درد۔ شرمگاہ میں خارش۔ تیز جس۔ سانس جلدی جلدی خشک سے  
آئے۔ دمہ۔ دن میں بلفم بہ آسانی خارج ہو لیٹے ہوئے۔ پتیر جیسا بلفم۔ پر فکر دھڑکن مکر میں تڑپن  
گردوں پر دباؤ۔ لیے عضلات میں بے جستی۔ جوڑوں کا چٹخنا۔ انگلیوں میں بے جستی۔ رات کو جاگنے  
پر (نیرم میور) ہاتھوں یا پیروں کی انگلیوں کی نوک میں سوزش یا رینگنے کا سا احساس۔ کولے  
بیکار ہو جائیں۔ اعضا فلیج زدہ سے محسوس ہوں۔ گھٹنوں میں بے چینی۔ تلووں میں درد۔ پیروں  
میں بدبو دار اور چرم پستہ۔ جلد بھوری۔ دھبے دار۔ میلی۔ بال دار۔ پٹھیاں خارش



جلن تیز۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے پر۔ نیلگون سفید زخم۔ کمر پر خونی پھوٹے۔ ناخن نرم پھٹے ہوئے  
 گلنے والے بدننگ۔ مڑے ہوئے۔ بایں پہلو پر لیٹنے سے نیند نہ آئے۔ مردوں کے خواب آئیں ملا دینے  
 والا لرزہ۔ مجبایوں سمیت۔ پیشاب سے گرمی سے آرام نہ پڑے۔ چھاتی میں گرمی چڑھے۔ ماتھوں پر  
 جیسے سرد نیکیس یا کھانسی۔ ننگے حصّہ جسم پر پسینہ۔ ڈھکے ہوئے حصّوں میں خشک گرمی۔ ماتھ  
 ٹھنڈے ۷ دھوئے سے۔ اعضائے تناسل پر بکثرت پسینہ آئے۔ ۷ اجباب کی موجودگی  
 میں۔ بدبودار۔ داغ دینے والا۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ سرنگر سے ۳۰ درجہ تک یا زیادہ۔ مقامی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے  
 مدت اثر تین ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ مرکبوریس۔ نیٹرم میور۔ نائٹریک ایسڈ۔ پائٹلا۔ سیبائنا  
 سلیشیا۔ سلفر۔  
 ادویہ متعلقہ۔ مرکبوریس۔ نائٹریک ایسڈ۔ سیبائنا۔

VERATRIM ALB

وریم ایلب

امراض و تاثرات

پیٹ

اعصاب دل

خون کی نالیاں

چند یا خون

نظام تنفس۔ نظام انضام

استد و مرض ۷

محنت سے۔ پینے سے

سرد مشروبات سے

درد میں۔ خوف سے

بھیک جانے سے۔ سردی سے

انخطاط مرض ۷

گرم اشیاء سے۔ ادھر ادھر پھرنے سے

کپڑا اوڑھنے سے۔ لیٹنے سے

علامات شدید مرض مثلاً ہضم بیکمزور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئیں۔ بہوشی یا مردنی  
 اچانک بہ افراط اخراج۔ اینٹھن چھاتی میں۔ انٹریوں میں۔ ماتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں  
 سختی کے ساتھ۔ بڑھتی ہوئی کمزوری اور سوکھا تیز میاریوں میں مثلاً کھانسی میں۔ بخاریں۔ ہڈیاں



ابتدائی تشدد کے ساتھ۔ درد کے دوران میں۔ بکواس شہوت انگیز باتیں۔ دعائیں مانگے۔ گائیاں  
 دے۔ ہو ہو کرے۔ باری باری سے تیز خط۔ دیوانہ پن۔ تناسف۔ خاموش بیٹھا رہے۔ مایہو لیا۔  
 بے قابو کر دینے والا سردرد۔ بال پھٹنے لگیں۔ درد کریں۔ چہرے پر اٹھنے ہوئے زردی اور مدنی چھا  
 جائے۔ رنگ نیلا پڑ جائے۔ ناک بھوں چڑھے ہوئے۔ غور وہ ساد کھائی دے۔ بایاں رخسار سرخ  
 گویا جلا ہوا چباتے چباتے جڑے میں تشنج۔ دانتوں میں بھاری پن۔ جلانے والی پیاس۔ برف کے پانی  
 کی خواہش۔ یا ترش مشروبات کی۔ تھے کر دے یا ڈکاریں آویں۔ بہت زیادہ تھے آویں۔ دست  
 ہوں۔ سخت جی متلائے۔ درد قویٰ بخ گویا کوئی کاٹتا ہو۔ بازوؤں میں تشنج۔ بڑی تیزی سے  
 گرتا جائے۔ بیضہ۔ کوڑی میں درد۔ پتلے سبز۔ بے بو۔ بے رنگ (چاولوں کی پیچ جیسے) دست۔  
 مریضہ کو مباشرت کی بیٹیاب کن خواہش۔ ہوا بہت گرم معلوم دے۔ گلے میں دھسک۔ پھیپھڑوں میں  
 جالے تیز کھانسی مزین تک جاری رہے۔ جی مالش کرے۔ ٹھنڈے مشروبات سے۔ دل پر کلنے  
 کا سا احساس۔ کمزور۔ نظر آنے والی دھڑکن۔ دھیمی دھیمی جلن۔ بازوؤں میں۔ دائیں سے بائیں کو پٹیلو  
 میں مروڑ۔ پاخانہ پھرتے ہوئے داپیکا۔ سیک سی C، کندھوں کے درمیان مروڑ۔  
 حرکت سے۔ جلد جلی ہی محسوس ہو۔ رات کو کپکپاتے ہوئے بیدار ہو۔ نبض سوت جیسی باریک۔ عام  
 سردی۔ تنج جیسی۔ چند یا پر۔ ناک پر۔ منہ میں۔ پانی بھر بھرتا۔ اعضا میں۔ پسینے۔ لہو ٹھنڈا ہوتا  
 معلوم دے۔ اندرونی گرمی مع سردی (جھریاں) جلد پر۔ بخار جس میں صرف باہر ٹھنڈا معلوم دے۔  
 مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ اسے بہت کم۔ دستور میں نمبر۔  
 مدت اثر۔ دو ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ آرسنک۔ کاربوویج۔

جست	ZINCUM	زنکم
اشتداد مرض		امراض و تاثرات
مردنی		کنپٹی
اخراج کا دب جانا		ریڑھ کی ہڈی
شور۔ لمس۔ شراب		آنکھ کے ارد گرد کا حصہ
		دماغ اور
		اعصاب



ناک کی جڑ

خون

اندرونی

گرمی پہنچنے سے

انحطاط مرض

حرکت سے۔ خوب دبانے سے

گرم کھلی ہو میں

کھلے اخراج سے

علامات۔ دماغ پریشان۔ خوب چستی یا پست حوصلگی۔ چیزیں اتار کر پھینک نہ سکے۔ اخراج وغیرہ بڑھتے جائیں۔ بڑھتی ہوئی کمزوری لے کھائے سے۔ بے چینی سمیت۔ تنہا اثرات۔ کوئی ایک حصہ سو جائے۔ دوسرے کی جس تیز ہو جائے۔ جلد پر چوٹی مٹیاں رہنے کا سا احساس مفلکتہ میں درد۔ سہارا در گوشت کے درمیان ملکہ طرف سے دوسری طرف ترچھے جانے والے درد۔ غیر ارادی فعل۔ کپکپی جھٹکے سے لگیں۔ رات کو۔ تشنچ۔ درد گولی کی مانند نکلتا ہے۔ فالج نیچے کی طرف جائے۔ درد کے مارے ہڈیاں بیکارسی ہو جائیں جسم سے خون کا اخراج چڑچڑا۔ تنگ کرنے سے روعے آسانی چونک پڑے۔ جوش میں آجائے۔ یا نشت چڑھ جائے۔ گڑ بڑ کر دے۔ سوال کو بار بار دہرانے کے بعد جواب دے۔ دماغ میں دھند سی معلوم دے۔ چلائے حرکت کرائے جانے سے بینہ میں۔ درد سے۔ وغیرہ وغیرہ۔ سر میں سخت چکر آئیں۔ بدحواس ہو جائے۔ سر درد۔ کم و بیش ہونے والا۔ چند یا پر ناک کی جڑ میں دباؤ محسوس ہو۔ یا آنکھوں میں۔ نظر کم آنے لگے۔ گرمی سے لے سخت دبانے سے کینٹیوں میں بھاری پن اور درد۔ درد کاٹنے سے۔ گڈی کھچی جائے۔ مکر کی طرف نیچے کو بٹکا سا پڑے۔ ٹانگیں کمزور ہو جائیں۔ گڈی میں گرمی معلوم ہو۔ سونے کے لئے لیٹنے پر سر میں خنجر سے ہوں۔ سر اور ہرادر ہر مارے۔ دانت پیسے۔ دماغ پر فالج۔ بالوں میں درد۔ چند یا کے بال کھڑے ہو جائیں۔ آنکھیں کھج کر ملتی ہوئی سی معلوم دیں۔ بھینٹ گاپن۔ کھاتے ہوئے آنسو ہیں۔ ناک پر سوزش۔ زردی۔ نیلا پن۔ چہرہ مصیبت زدہ سا۔ ہونٹ چپکیں۔ ذائقہ تلخ۔ بے تحاشہ بھوک۔ جگر میں یا ناف میں ڈھیلا پن معلوم ہو اچھارہ۔ اجابت کے وقت مقعد میں خارش۔ بواسیر کی تکلیف نیچے کو کھینچنے لگے گرمی دپٹنے پھرنے سے زخم پڑ جائیں۔ پیشاب بڑے زور کا لگے۔ مگر صرف خاص حالت میں بیٹھنے سے ہی پیشاب آئے مثلاً آگے یا پیچھے جھکنے سے۔ عضو پر عضو چڑھانے سے وغیرہ۔ پیشاب کے بعد خون خارج ہو۔ گردے کے ارد گرد دباؤ اور کاٹے جانے کا سادرد۔ عضو پکڑنے کو مجبور ہو۔ ہر مرتبہ کھانسنے پر جوش شہوت۔ خواہش جلق۔ ایام حیض میں۔ حیض بکثرت۔ لو قہروں والا۔ یا کس نلے میں سخت درد۔ چھیدنے کا سا







# طب ہومیوپیتھی پرستند معرکہ الاراقصانہ

## جو ہومیوپیتھک کلج لاہور کے نصاب تعلیم میں شامل ہے

فلسفہ ہومیوپیتھی یعنی ہیوس  
صدی کا آرگینن (بالتصور)

دطبع سوئم مصنف ڈاکٹر کے سی متیشی صاحب پرنسپل ہومیوپیتھک  
میڈیکل کلج لاہور۔ یہ ایک نئی تصنیف ہے جو طبی دنیا کی  
نئی تھیوریوں، نئی ایجادوں، نئی اختراعات کا مجموعہ ہے

ہومیوپیتھک تشخیص و تجویز و  
یعنی چالیس ادویات کا کل

دطبع سوئم، مصنف ڈاکٹر کے سی متیشی صاحب پرنسپل ہومیوپیتھک  
میڈیکل کلج لاہور۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ معرکہ الاراقصانہ ہے  
جس میں ہومیوپیتھک طریق سے دوا تشخیص و تجویز کرینکا

نہایت سہل مگر یقینی طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور عام متعل عالیشان ادویات کے خواص و افعال کی غموہیات  
و خصوصیات ظاہری و باطنی کیفیات و تاثرات کا محقق مگر مکمل مفید و مؤثر اور سلیس و باحاورہ بیان درج ہے  
یہ نہایت مفید کتاب ہر ایک ہومیوپیتھک پرکشنرز کی میز پر موجود رہنی چاہئے قیمت دو روپے

ہیومن فزیالوجی (بالتصور)

دطبع سوئم، مصنف ڈاکٹر ہرالدین بی۔ ایچ ایم پرنسپل ہومیوپیتھک  
میڈیکل کلج لاہور۔ یہ کتاب علم الاعضاء کے انسانی پر ایک

مشرح و مستند و عام فہم کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر ڈاکٹر و طبیب کے لئے ضروری ہے قیمت چار روپے  
رہنمائے ہومیوپیتھی یعنی گھر کا ڈاکٹر

دطبع دوئم، یہ کتاب علم و عمل علم طب پر وہ معرکہ الاراقصانہ  
تصنیف ہے جس میں نفیس زبان، نفیس اسلوب، مدنی

پانی، عمل، برہم، بنید، حرارت، جسم، دوا، جلد، پیشاب، احتیاط، اعضاء، مآخراک، اعضاء، تشخیص  
علامات، و علاج الامراض، نہایت وضاحت کیا تو درج ہے۔ لکھائی چھپائی عمدہ قیمت تین روپے  
مفصل فہرست طبکیں

مکمل کاپتد۔۔۔ ہومیوپیتھک کلج لاہور



ستار کا پتہ: ریڈاکٹر ٹیلی فون قائم شدہ ۱۹۰۸ء  
 شمالی ہندوستان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہوسیا ہتھک دو خانہ  
 ہتھک ہوسیا ہتھک ہال مال لاہور

یہ کارخانہ فروپا یو نیور ہوسیا ہتھک استاد موسیٰ علی زمان علی جناب ڈاکٹر کے سی ہتھک  
 صاحب پرنسپل ہوسیا ہتھک کالج و ہسپتال لاہور کی زیر نگرانی و زیر ملکیت مدت مدید سے جاری ہے جس کی  
 سرپرستی و ایان ریاست۔ لیڈران قوم ساکنان انگریزی ہومل، اسٹلے عہدیداران گورنمنٹ، مشہور و معروف  
 ڈاکٹر ان، وید۔ اور حکیم صاحبان، روسائے ہند، منتظمین ہسپتال، کارخانہ دار، سیلج اور کنبہ دار  
 اصحاب گفہ شدہ ۲۴ سال سے متواتر فرما رہے ہیں +

### ہماری خصوصیات

اپنی عمارت خدا کے فضل اور ہمارے سرپرستوں کی مہربانی سے سول سٹیشن میں ہال روڈ کے جانب  
 شمالی سبیل سرشاری لال بلڈنگس موجودہ کلشی میں سب سے قریب ہال روڈ پر ہال کی اپنی ایک عالیشان  
 آپ ٹوڈیٹ عمارت میں جو جدید طرز تعمیر کرانی گئی ہے واقعہ ہے جس میں ہوا اور صفائی کا خاص لحاظ رکھا گیا  
 فارسی۔ جس میں قاریسی کے لئے علیحدہ عمارت تعمیر کی گئی ہے جس میں عرق نکالنے کے پریس، سٹوف  
 بنائے گئے مشین، اور ٹکیہ بنانے کی مشین اور دوسری مشینیں لگائی گئی ہیں +

لیبوریٹری۔ ہماری لیبوریٹری میں تمام ضروری جدید آلات موجود ہیں۔  
 ادویات۔ ہمارے ہال تمام مال براہ راست ممالک امریکہ و جرمنی و انگلینڈ سے منگوا یا جاتا ہے اور  
 تمام ادویات ایک ماسٹر دوا ساز کی زیر نگرانی طیار کی جاتی ہیں جو ممالک غیر کی ادویات کی نسبت زیادہ  
 معتبر تازہ دوا اثر اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے ہر طرح قابل قدر اور اطمینان بخش ہیں۔  
 شرح۔ عام ادویات کا باج پیسے فی ڈالام ہے۔ اور کٹو نمبر میڈیز کا آٹھ آنے فی پونڈ۔

ہم نے اپنے ہال کے ہر شعبہ میں حال ہی میں ہر ضروری اصلاح و اضافہ کیا ہے۔ ہمارا دعوے  
 ہے کہ ہمارا مال شمالی ہندوستان میں اپنی مثال آپ ہے اور طب ہوسیا ہتھک کے متعلق ہر شے  
 کے حصول کے لئے ایک آپ ٹوڈیٹ کارخانہ ہے ہم درخواست کریں گے کہ بیشتر اس کے کہ آپ  
 کوئی مال دوسری جگہ سے خرید فرماویں۔ ہمارے ہال کا ضرور معاہدہ کریں اور ہمیں ایک آزمائشی  
 فرمائش کا ضرور موقع دیں +

مفضل حالات کے لئے فرست کارخانہ طلب فرماویں۔

منیجر



تارکاپنتہ بڑا ڈاکٹر جیٹھی لاہور

تفایم شدہ ۱۹۰۶ء


ٹیلیفون :- ۱۱۱

# ہومیو پیتھک کالج

۹ سال روڈ  
لاہور

جس کے ساتھ ایک اپ ٹوڈیٹ ہسپتال، فارمیسی، لیبوریٹری، لائبریری، باغیچہ اور دیتا، اور اوٹ ڈوروسٹیشنری شامل ہے۔ اپنی جدید طرز کی عالیشان عمارت امرکنی صحت بخش مقام دیکھئے۔

دو سال ڈیپلوٹیا  
اور بی ایچ ایم  
ایم ایچ سی ایس  
ہیں بیکچر بذریعہ  
مادلس اور  
دیئے



برقی روشنی  
کوہن ایک و  
ایل ایچ ایم  
ایٹھائیس اور  
کے عطائے جاتے  
چارٹس  
جادو کی لائین  
جاتے ہیں اور تشفی و تجویز دوا بذریعہ

ڈاکٹر بوگر کے عجیب و غریب ریمپرٹری کارڈ  
اور  
باڈی ریفلیکس ڈائگنوسٹ

دیگرہ بیش قیمت جدید طبی آلات کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، جو ہماری ایک خصوصیت ہے  
طبابت پیشہ اصحاب کے لئے خاص رعایت  
انٹرنس یا زیادہ قابلیت رکھنے والے مرد و عورت طالب علم داخل ہو سکتے ہیں۔  
مفصل حالات کے لئے دوائے کے ٹکٹ بھیج کر رسپکشن طلب کریں۔  
”رجسٹرار“



مارکا پتہ بڑا اکثر ہینٹی لائو قائم شدہ ۱۹۰۶ء

ٹیلیفون ۷۱

# ہومیوپیتھک کالج ہسپتال

کے ساتھ ایک ایڈڈ ففارمیسی، بریٹری، باغیچہ دیویات اور اوٹ ڈو رفسنسری مل ہے

ایک ماہر علاج کے زیر اہتمام ہے اور بیش قیمت جدید برقی و طبی جدید آلات سے مزین ہے

”الکٹروجن، برقی سیٹیاں، الٹرا واولٹ ریز، واولٹ ریز وغیرہ“

”ڈاکٹر لوگر کے عجیب و غریب تشخیصی کارڈ“

”اور باڈی فیلکس ڈایک نو سنر وغیرہ“

جن کی مدد سے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ امراض مزمنہ کی صحیح تشخیص اور خود بخود تشخیص و تھیراپی حاصل ہے

”قابل عمل جراحی امراض کا بلا اپریشن علاج“

مثلاً ناسور، بھگنہ، خنازیر، امراض ہڈی، بواسیر وغیرہ

امراض مزمنہ کا علاج ہماری خصوصیت ہے

مثلاً امراض گردہ و مثانہ، پیچیدہ و اعصاب و جلد وغیرہ۔

امراض بچکان، جو کمزور و نحیف ہوں، جنکی نشوونما پورے طور پر نہ ہوئی ہو، دانست خراب ہوں، گلے پھٹے ہوں، غدودیں پھولی ہو، دل، اور جہنمائی و داغی طور پر کمزور اور تھکے ہوں۔

اپنی عالیشان جدید طرز کی عمارت امریکی ڈسٹ مقام بھلی کی روشنی، پتھر، انیس ریڈیٹس و علاج معمولی۔

سیمنٹ ٹرسٹ

دو آنے کے ٹکٹ بھیج کر پراسیکٹس طلب کریں +

(ہسپتال کے اندر داخل ہونے کے لیے)